

**Vladimir BALAN**

**Monica PÎRVAN**

# **MATEMATICI AVANSATE PENTRU INGINERI**

**Probleme date la  
Concursul Științific Studențesc “Traian Lalescu”  
începând cu anul 2002**

**Ediție actualizată în format electronic**

VLADIMIR BALAN

MONICA PÎRVAN

## **Matematici Avansate pentru Ingineri**

Probleme date la Concursul Științific Studențesc

Traian Lalescu, Matematică \* 2002-2019

= București 2019 =

**Referenți științifici:**

Prof.univ.dr. Andrei Halanay

Prof.univ.dr. **Vasile Iftode**

# Cuprins

Prefață . . . . .	vii
<b>Enunțuri anul I [Algebră liniară, geometrie analitică și analiză matematică]</b>	1
Enunțuri - faza locală (universitară) . . . . .	1
Faza locală - an I - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	1
Faza locală - an I - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	2
Faza locală - an I - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	3
Faza locală - an I - profilele electric și mecanic(baraj) (2004-2005) . . . . .	4
Faza locală - an I - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	5
Faza locală - an I - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	6
Faza locală - an I - profil mecanic (2007-2008) . . . . .	6
Faza locală - an I - profil electric (2008-2009) . . . . .	7
Faza locală - an I - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	8
Faza locală - an I - profil electric (2009-2010) . . . . .	9
Faza locală - an I - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	10
Faza locală - an I - profil electric (2010-2011) . . . . .	10
Faza locală - an I - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	11
Faza locală - an I - profil electric (2011-2012) . . . . .	12
Faza locală - an I - profil mecanic (2011-2012) . . . . .	13
Faza locală - an I - profil electric (2012-2013) . . . . .	14
Faza locală - an I - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	15
Faza locală - an I - profil electric (2013-2014) . . . . .	16
Faza locală - an I - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	17
Faza locală - an I - profil electric (2014-2015) . . . . .	18
Faza locală - an I - profil mecanic (2014-2015) . . . . .	18
Faza locală - an I - profil electric (2015-2016) . . . . .	19
Faza locală - an I - profil mecanic (2015-2016) . . . . .	20
Faza locală - an I - profil electric (2016-2017) . . . . .	21
Faza locală - an I - profil mecanic (2016-2017) . . . . .	22
Faza locală - an I - profil electric (2017-2018) . . . . .	22
Faza locală - an I - profil mecanic (2017-2018) . . . . .	23
Faza locală - an I - profil electric (2018-2019) . . . . .	24
Faza locală - an I - profil mecanic (2018-2019) . . . . .	25
Faza locală - an I - profil electric (2019-2020) . . . . .	26
Enunțuri - faza interuniversitară . . . . .	26
Faza interuniv. - an I - profil electric (2002-2003) . . . . .	26
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	27

Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	28
Faza interuniv. - an I - profil electric (2004-2005) . . . . .	30
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	31
Faza interuniv. - an I - profil electric (2005-2006) . . . . .	32
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	33
<b>Enunțuri - faza națională anul I . . . . .</b>	<b>35</b>
Faza națională - an I - profil cercetare (2007-2008) . . . . .	35
Faza națională - an I - profil electric (2007-2008) . . . . .	35
Faza națională - an I - profil mecanic (2007-2008) . . . . .	36
Faza națională - an I - profil cercetare (2008-2009) . . . . .	37
Faza națională - an I - profil electric (2008-2009) . . . . .	38
Faza națională - an I - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	38
Faza națională - an I - profil cercetare (2009-2010) . . . . .	39
Faza națională - an I - profil electric (2009-2010) . . . . .	40
Faza națională - an I - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	41
Faza națională - an I - profil electric (2010-2011) . . . . .	42
Faza națională - an I - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	42
Faza națională - an I - profil teoretic (2011-2012) . . . . .	44
Faza națională - an I - profil electric (2011-2012) . . . . .	44
Faza națională - an I - profil mecanic (2011-2012) . . . . .	45
Faza națională - an I - profil teoretic (2012-2013) . . . . .	46
Faza națională - an I - profil electric (2012-2013) . . . . .	46
Faza națională - an I - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	46
Faza națională - an I - profil teoretic (2013-2014) . . . . .	47
Faza națională - an I - profil electric (2013-2014) . . . . .	48
Faza națională - an I - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	48
Faza națională - an I - profil teoretic (2014-2015) . . . . .	49
Faza națională - an I - profil electric (2014-2015) . . . . .	50
Faza națională - an I - profil mecanic (2014-2015) . . . . .	50
Faza națională - an I - profil teoretic (2015-2016) . . . . .	51
Faza națională - an I - profil electric (2015-2016) . . . . .	52
Faza națională - an I - profil mecanic (2015-2016) . . . . .	52
Faza națională - an I - profil teoretic (2016-2017) . . . . .	53
Faza națională - an I - profil electric (2016-2017) . . . . .	54
Faza națională - an I - profil mecanic (2016-2017) . . . . .	54
Faza națională - an I - profil teoretic (2017-2018) . . . . .	55
Faza națională - an I - profil electric (2017-2018) . . . . .	56
Faza națională - an I - profil mecanic (2017-2018) . . . . .	57
Faza națională - an I - profil teoretic (2018-2019) . . . . .	57
Faza națională - an I - profil electric (2018-2019) . . . . .	58
Faza națională - an I - profil mecanic (2018-2019) . . . . .	59
<b>Enunțuri anul II [Matematici avansate] . . . . .</b>	<b>60</b>
Enunțuri - faza universitară (locală) . . . . .	60
Faza locală - an II - profil mecanic (2001-2002) . . . . .	61
Faza locală - an II - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	61
Faza locală - an II - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	62
Faza locală - an II - profil electric (2004-2005) . . . . .	63

Faza locală - an II - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	63
Faza locală - an II - profil electric (2005-2006) . . . . .	64
Faza locală - an II - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	64
Faza locală - an II - profil electric (2006-2007) . . . . .	65
Faza locală - an II - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	65
Faza locală - an II - profilele electric și mecanic (2007-2008) . . . . .	66
Faza locală - an II - profil electric (2008-2009) . . . . .	67
Faza locală - an II - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	67
Faza locală - an II - profil electric (2009-2010) . . . . .	68
Faza locală - an II - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	68
Faza locală - an II - profil electric (2010-2011) . . . . .	69
Faza locală - an II - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	69
Faza locală - an II - profilele electric și mecanic (2011-2012) . . . . .	70
Faza locală - an II - profil electric (2012-2013) . . . . .	71
Faza locală - an II - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	71
Faza locală - an II - profil electric (2013-2014) . . . . .	72
Faza locală - an II - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	72
Faza locală - an II - profil electric (2014-2015) . . . . .	73
Faza locală - an II - profil mecanic (2014-2015) . . . . .	73
Faza locală - an II - profil electric (2015-2016) . . . . .	74
Faza locală - an II - profil mecanic (2015-2016) . . . . .	74
Faza locală - an I - profil electric matematici speciale (2016-2017) . . . . .	75
Faza locală - an II - profil electric matematici speciale (2016-2017) . . . . .	75
Faza locală - an II - profil ne-electric matematici speciale (2016-2017) . . . . .	76
Faza locală - anii I și II - profil electric matematici speciale (2017-2018) . . . . .	76
Faza locală - an II - profil ne-electric matematici speciale (2017-2018) . . . . .	77
Faza locală - anii I și II - profil electric matematici speciale (2018-2019) . . . . .	77
Faza locală - an II - profil ne-electric matematici speciale (2018-2019) . . . . .	78
Faza locală - an II - profil ne-electric matematici speciale (2019-2020) . . . . .	78
Enunțuri - faza interuniversitară . . . . .	79
Faza interuniv. - an II - profil electric (2002-2003) . . . . .	79
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	81
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	81
Faza interuniv. - an II - profil electric (2004-2005) . . . . .	82
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	82
Faza interuniv. - an II - profil electric (2005-2006) . . . . .	83
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	83
Faza interuniv. - an II - profil electric (2006-2007) . . . . .	84
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	84
Enunțuri - faza națională anul II . . . . .	84
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2007-2008) . . . . .	84
Faza națională - an II - profil electric (2008-2009) . . . . .	85
Faza națională - an II - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	86
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2009-2010) . . . . .	87
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2010-2011) . . . . .	87
Faza națională - an II - profil inginerie (2011-2012) . . . . .	88
Faza națională - an II - profil inginerie (2012-2013) . . . . .	88

Faza națională - an II - profil inginerie (2013-2014) . . . . .	89
Faza națională - an II - profil inginerie (2014-2015) . . . . .	89
Faza națională - an II - profil inginerie (2015-2016) . . . . .	90
Faza națională - an I - profil matematici speciale (2016-2017) . . . . .	90
Faza națională - an II - profil inginerie (2016-2017) . . . . .	91
Faza națională - an I - profil matematici speciale (2017-2018) . . . . .	91
Faza națională - an II - profil inginerie (2017-2018) . . . . .	92
Faza națională - an I - profil matematici speciale (2018-2019) . . . . .	93
Faza națională - an II - profil inginerie (2018-2019) . . . . .	93
<b>Rezolvări anul I [Algebră liniară, geometrie analitică și analiză matematică]</b>	<b>95</b>
Rezolvări - faza locală (universitară) . . . . .	95
Faza locală - an I - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	95
Faza locală - an I - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	99
Faza locală - an I - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	103
Faza locală - an I - profilele electric și mecanic(baraj) (2004-2005) . . . . .	109
Faza locală - an I - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	113
Faza locală - an I - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	116
Faza locală - an I - profil mecanic (2007-2008) . . . . .	118
Faza locală - an I - profil electric (2008-2009) . . . . .	121
Faza locală - an I - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	123
Faza locală - an I - profil electric (2009-2010) . . . . .	126
Faza locală - an I - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	130
Faza locală - an I - profil electric (2010-2011) . . . . .	134
Faza locală - an I - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	136
Faza locală - an I - profil electric (2011-2012) . . . . .	139
Faza locală - an I - profil mecanic (2011-2012) . . . . .	143
Faza locală - an I - profil electric (2012-2013) . . . . .	145
Faza locală - an I - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	146
Faza locală - an I - profil electric (2013-2014) . . . . .	149
Faza locală - an I - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	152
Faza locală - an I - profil electric (2014-2015) . . . . .	155
Faza locală - an I - profil mecanic (2014-2015) . . . . .	156
Faza locală - an I - profil electric (2015-2016) . . . . .	156
Faza locală - an I - profil mecanic (2015-2016) . . . . .	158
Rezolvări - faza interuniversitară . . . . .	158
Faza interuniv. - an I - profil electric (2002-2003) . . . . .	158
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	161
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	167
Faza interuniv. - an I - profil electric (2004-2005) . . . . .	172
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	175
Faza interuniv. - an I - profil electric (2005-2006) . . . . .	179
Faza interuniv. - an I - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	182
Rezolvări - faza națională . . . . .	185
Faza națională - an I - profil cercetare (2007-2008) . . . . .	185
Faza națională - an I - profil electric (2007-2008) . . . . .	188
Faza națională - an I - profil mecanic (2007-2008) . . . . .	190

Faza națională - an I - profil electric (2008-2009) . . . . .	192
Faza națională - an I - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	195
Faza națională - an I - profil electric (2009-2010) . . . . .	197
Faza națională - an I - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	199
Faza națională - an I - profil electric (2010-2011) . . . . .	201
Faza națională - an I - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	202
Faza națională - an I - profil electric (2011-2012) . . . . .	205
Faza națională - an I - profil mecanic (2011-2012) . . . . .	207
Faza națională - an I - profil teoretic (2012-2013) . . . . .	209
Faza națională - an I - profil electric (2012-2013) . . . . .	210
Faza națională - an I - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	211
Faza națională - an I - profil teoretic (2013-2014) . . . . .	214
Faza națională - an I - profil electric (2013-2014) . . . . .	214
Faza națională - an I - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	216
<b>Rezolvări anul II [Matematici avansate] . . . . .</b>	<b>219</b>
Rezolvări - faza locală (universitară) . . . . .	219
Faza locală - an II - profil mecanic (2001-2002) . . . . .	219
Faza locală - an II - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	221
Faza locală - an II - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	225
Faza locală - an II - profil electric (2004-2005) . . . . .	229
Faza locală - an II - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	231
Faza locală - an II - profil electric (2005-2006) . . . . .	233
Faza locală - an II - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	235
Faza locală - an II - profil electric (2006-2007) . . . . .	237
Faza locală - an II - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	240
Faza locală - an II - profilele mecanic și electric (2007-2008) . . . . .	243
Faza locală - an II - profil electric (2008-2009) . . . . .	246
Faza locală - an II - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	249
Faza locală - an II - profil electric (2009-2010) . . . . .	251
Faza locală - an II - profil mecanic (2009-2010) . . . . .	254
Faza locală - an II - profil electric (2010-2011) . . . . .	255
Faza locală - an II - profil mecanic (2010-2011) . . . . .	257
Faza locală - an II - profilele electric și mecanic (2011-2012) . . . . .	259
Faza locală - an II - profil electric (2012-2013) . . . . .	260
Faza locală - an II - profil mecanic (2012-2013) . . . . .	261
Faza locală - an II - profil electric (2013-2014) . . . . .	262
Faza locală - an II - profil mecanic (2013-2014) . . . . .	263
Faza locală - an II - profil mecanic (2019-2020) . . . . .	264
Rezolvări - faza interuniversitară . . . . .	266
Faza interuniv. - an II - profil electric (2002-2003) . . . . .	266
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2002-2003) . . . . .	268
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2003-2004) . . . . .	272
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2004-2005) . . . . .	275
Faza interuniv. - an II - profil electric (2005-2006) . . . . .	277
Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2005-2006) . . . . .	281
Faza interuniv. - an II - profil electric (2006-2007) . . . . .	283

Faza interuniv. - an II - profil mecanic (2006-2007) . . . . .	286
Rezolvări - faza națională . . . . .	287
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2007-2008) . . . . .	287
Faza națională - an II - profil electric (2008-2009) . . . . .	290
Faza națională - an II - profil mecanic (2008-2009) . . . . .	291
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2009-2010) . . . . .	294
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2010-2011) . . . . .	296
Faza națională - an II - profilele electric și mecanic (2011-2012) . . . . .	298
Faza națională - an II - profil inginerie (2012-2013) . . . . .	299
Faza națională - an II - profil inginerie (2013-2014) . . . . .	300
<b>Index . . . . .</b>	<b>302</b>

# Prefață

## Memento: Matematicianul Traian Lalescu

Reputatul matematician român Traian Lalescu, personalitate marcantă a științei românești (12 iulie 1882 - 15 iunie 1929), a fost unul dintre fondatorii teoriei ecuațiilor integrale și a publicat în 1910 monografia de excepție "Introducere în teoria ecuațiilor integrale", primul tratat din lume de acest tip, devenit clasic în literatura de specialitate. În lucrările sale științifice, Traian Lalescu a adus contribuții esențiale în diverse ramuri ale matematicii, cum ar fi: ecuațiile funcționale, seriile trigonometrice, fizica matematică, geometria, mecanica, algebra, istoria matematicii.



Ca student al Facultății de Științe - Matematică din Bucuresti, Traian Lalescu i-a avut ca profesori pe renumiții matematicieni Gheorghe Țițeica, Anton Davidoglu, Spiru Haret, Nicolae Coculescu și Emil Pangrati. Mai târziu, aflat cu bursă de studii în Franța, își ia doctoratul la Sorbona în 1908, cu excepționala sa teză "Sur l'équation de Volterra" asupra ecuațiilor integrale, iar apoi își diversifică studiile, obținând și diploma de inginer de la Școala Superioară de Electricitate din Paris.

Reîntors în țară, Traian Lalescu a devenit conferențiar și apoi profesor la Universitatea din București, iar din 1920 a organizat și condus Școala Politehnică din Timișoara, devenind apoi primul rector al acestei instituții.

Traian Lalescu a scris lucrari de valoare în domeniul ecuațiilor integrale și al seriilor trigonometrice, a ținut cursuri și conferinte prin care a facut cunoscute Teoria relativității și Calculul Tensorial - preocupări foarte noi pe atunci, și a ținut cursuri de Teoria electromagnetismului. În 1921, sub îndrumarea sa, a apărut primul număr al cunoscutei Reviste matematice din Timișoara, în anul 1924 a scris manualul "Calculul algebric", iar între 1920 și 1927 a scris cele patru volume intitulate "Tratat de geometrie analitică".

Traian Lalescu a fost întemeietorul Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, profesor universitar, deputat de Caransebeș și Membru al Academiei Romane.

Privitor la alte preocupări care conturează profilul de excepție al personalității sale, este binecunoscut faptul că Traian Lalescu desena frumos, cânta la violoncel și traducea din limba italiană; era bun prieten cu pictorii Nicolae Tonitza, Gheorghe Zamfiro-Poli-Dall și sculptorul Cornel Medrea, și a avut o înrăurire puternică în evoluția marelui pictor Cornelius Baba. De asemenea, Traian Lalescu a fost primul președinte al Clubului Universitar București (astăzi Sportul Studentesc), proaspăt înființat în februarie 1916, susținând mai apoi (după 1920) proaspăt înființata Societatea Sportivă Politehnica din Timișoara.

Academicianul Gr.C. Moisil - părintele informaticii românești, îl considera pe Traian Lalescu unul din cei mai de seamă matematicieni pe care i-a avut țara noastră, unul din făuritorii școlii matematice din Romania. Alte aprecieri notabile ale personalităților vremii asupra lui Traian Lalescu: "înțeligența foarte vie a lui Lalescu îi îngăduia să atingă imediat miezul unei probleme; de aceea textele lui au acea spontaneitate care le face deosebit de atrăgătoare" (Emile Picard); "un adevărat animator care știa să pună în evidență valoarea părților cele mai interesante ale științei matematice, care atrăgea, cu farmecul și căldura expunerii sale pe studenți" (Gheorghe Țițeica); "Lalescu a cutreierat multe domenii ale matematicii..., a simțit nevoie de a se face util în educația matematică școlară, universitară și politehnică, de a-i valorifica și continua pe cei care au pus bazele învățământului românesc" (Solomon Marcus).

Astăzi, cinci licee din România (în Brănești, București, Hunedoara, Orșova și Reșița), precum și șase străzi (în Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Oradea, Timișoara, Reșița și Crevedia) se mândresc să poarte numele lui Traian Lalescu.

Familia matematicianului a înființat fundația omonimă, care promovează proiecte educaționale, stimulând potențialul științific și creativ al tinerilor în diverse domenii de activitate prin acordare de burse și premii, prin inițierea și sprijinirea concursurilor și a altor competiții culturale și științifice, prin susținerea de cursuri, training-uri și stagii de formare.

Drept omagiu adus marelui matematician Traian Lalescu, există - începând cu anul 1985, concursul interjudețean anual de matematică pentru elevii de gimnaziu și liceu din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. În mediul universitar, există în prezent un concurs de matematică în București (extins în ultimii ani la nivel național) și un concurs de mecanică teoretică (acoperind trei județe din Banat), ambele concursuri purtând numele "Traian Lalescu", și fiind adresate studenților din anii I-II.

Numele omului de știință Traian Lalescu se alătură personalităților importante ale României care au contribuit în mod esențial la dezvoltarea școlii naționale de matematică și a cercetării.

### **Concursul studențesc de matematică "Traian Lalescu"**

Concursul Studențesc de matematică "Traian Lalescu" are loc anual în Universitatea Politehnica din București, începând cu 1996. Dorit inițial ca o reluare a fostei Olimpiade Studențești - întreruptă în 1989, acest concurs a primit după anul 2000 o nouă formă, urmărind nu atât verificarea noțiunilor matematice abstractive, ci aprofundarea noțiunilor din programa obligatorie de matematică aplicată în tehnică, accentul punându-se mai în special pe dezvoltarea logicii și a structurilor algoritmice.

Până în 2007, concursul s-a desfășurat independent, fiecare centru universitar organizând etapa sa locală, cu excepția centrului universitar București, unde au existat două etape: una locală și una interuniversitară (organizată între trei universități tehnice: Univ. Politehnica, Univ. Tehnică de Construcții și Academia Tehnică Militară). În anul 2007, echipa calificată în urma concursului interuniversitar a participat în Cipru la concursul international SEEMOUS, de unde s-a întors cu premii - eveniment notabil care a atras atenția asupra acestui concurs. Drept urmare, în 2008 s-a organizat pentru prima dată faza națională a concursului "Traian Lalescu" în București, unde studenții calificați la faza locală din Universitatea Politehnica

București au luat multiple premii, 8 dintre aceștia fiind selectați pentru lotul care a participat la concursul internațional studențesc de la Atena, aducând țării 2 medalii de aur, 4 de argint și 3 de bronz.

În Universitatea Politehnica București, ediția 2008 a concursului "Traian Lalescu", a avut patru secțiuni:

- Anul I, profil electric - unde participă studenții anului întâi de la facultățile: Automatică și Calculatoare, ETTI (Electronică și Telecomunicații și Tehnologia Informației), Energetică, Inginerie Electrică, FILS (Inginerie în Limbi Străine - grupele de calculatoare și de telecomunicații), FSA (Științe Aplicate);
- Anul II, profil electric - unde sunt în competiție studenții anului II de la aceleași facultăți cu profil electric menționate mai sus;
- Anul I, profil mecanic - unde participă studenții anului întâi de la facultățile: Transporturi, FIS (Inginerie Aerospațială), IMST (Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice), ISB (Ingineria Sistemelor Biotehnice), SIM (Știința și Ingineria Materialelor), FIMM (Inginerie mecanică și Mectronică), FILS (Inginerie în Limbi Străine - grupele cu profil mecanic);
- Anul II, profil mecanic - unde sunt în competiție studenții anului II de la aceleasi facultăți cu profil mecanic menționate mai sus.

### **Concursul Național de Matematică "Traian Lalescu".**

Concursul Național de Matematică "Traian Lalescu" este o inițiativă promovată în anul 2008 de un grup de cadre didactice din Universitatea Politehnica din București condus de Prof.Dr. Andrei Halanay. Acest concurs își propune următoarele obiective:

1. Promovarea calității în predarea matematicii și stimularea studenților pentru abordarea aprofundată a acestei discipline;
2. Încurajarea tinerilor cu aptitudini pentru cercetarea matematică și evidențierea universităților care depun eforturi pentru antrenarea studenților în cercetarea științifică din domeniul matematicii;
3. Cultivarea excelenței în studiul matematicii la nivel universitar și reluarea unei tradiții din anii 1970-1990;
4. Oferă un criteriu pentru clasificarea universităților din România;
5. Stabilirea unui criteriu de selecție pentru echipele care reprezintă România la concursurile internaționale pentru studenți (de exemplu Concursul de Matematică Sud-Est European, organizat anual de MASEE (Mathematical Society of South Eastern Europe) în Cipru sau Olimpiada Internațională de Matematică pentru Studenți).

În prezent secțiunile concursului național sunt:

- Secțiunea A - anul I și II, Facultăți de Matematică.
- Secțiunea B - anul I, profil electric, Facultăți Tehnice/Facultatea de Informatică.
- Secțiunea C - anul I, profil nelectric, Facultăți Tehnice.
- Secțiunea D - anul I și II, profil electric, Facultăți Tehnice.
- Secțiunea E - anul II, profil nelectric, Facultăți Tehnice.

În ultimii ani, Concursului "Traian Lalescu" a fost găzduită de următoarele instituții de învățământ superior: Universitatea Politehnica din București (2008, 2009 și 2018), Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iași (2010), Universitatea Maritimă din Constanța (2011, 2012 și 2017), Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia (2013), Universitatea de Vest din Timișoara (2014), Universitatea "Transilvania" din Brașov (2015) și Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (2016).

Programele analitice ale celor cinci secțiuni sunt următoarele:

#### **Programa secțiunii A.**

a) *STRUCTURI ALGEBRICE*. Legi de compozиie. Monoizi. Grupuri. Ordinul unui element într-un grup. Teorema lui Lagrange. Subgrup normal, grup factor, teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri. Grupuri ciclice. Grupuri de permutări. Inele, ideale, inel factor, teorema fundamentală de izomorfism pentru inele. Inele de matrice. Corpuri, caracteristica unui corp. Corpul fracțiilor unui domeniu de integritate.

b) *POLINOAME*. Inele de polinoame într-un număr finit de nedeterminate peste un inel comutativ. Funcții polinomiale. Rădăcini ale polinoamelor. Teorema lui Bezout. Relațiile lui Viete. Polinoame simetrice. Teorema fundamentală a polinoamelor simetrice, formulele lui Newton.

c) *ALGEBRĂ LINIARĂ*. Spații vectoriale. Subspații vectoriale. (In)dependență liniară, bază, dimensiune. Aplicații liniare, nucleu, imagine. Matrice, rang, determinanți, sisteme de ecuații liniare. Vectori și valori proprii. Teorie Jordan. Forme biliniare și forme pătratice. Spații vectoriale euclidiene, baze ortogonale și ortonormate, aplicații ortogonale.

d) *ANALIZĂ MATEMATICĂ*. Siruri și serii de numere complexe. Siruri și serii de funcții, serii de puteri. Convergență uniformă. Topologie generală: compacitate, conexiune, spații metrice, spații normate. Continuitate în  $\mathbb{R}$ , continuitate uniformă. Teorema de aproximare a lui Weierstrass. Calcul diferențial în  $\mathbb{R}$ . Teoremele clasice ale calculului diferențial. Integrala Riemann-Stieltjes. Teoremele clasice ale calculului integral. Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann. Integrale improprii, integrale cu parametru. Funcțiile Gama și Beta. Formula lui Stirling. Serii Fourier. Teorema de aproximare a lui Weierstrass, varianta trigonometrică.

e) *GEOMETRIE*. Geometrie afină. Spații affine. Repere affine și carteziene. Ecuațiile varietăților liniare. Aplicații affine. Grupul afin. Translații, omotetii, simetrii. Conice și cuadrice în spații affine. Clasificarea afină a hipercuadricelor. Geometrie euclidiană. Spații euclidiene. Varietați liniare perpendiculare. Izometrii. Conice și cuadrice în spații euclidiene. Clasificarea metrică a hipercuadricelor. Geometrie proiectivă. Spații proiective, subspații proiective, morfisme proiective. Teorema fundamentală a geometriei proiective. Clasificarea proiectivă a hipercuadricelor.

#### **Programa secțiunii B.**

##### **a) ANALIZĂ MATEMATICĂ.**

1. *Mulțimi de numere*. Mulțimea numerelor reale și elemente de topologie. Puncte de acumulare și puncte aderente. Vecinatați. Dreapta încheiată. Submulțimi numărabile și de putere continuului. Submulțimi dense. Inegalități remarcabile. 2. *Siruri și serii de numere*. Siruri definite prin recurență. Serii de numere. Criterii de convergență pentru serii cu termeni pozitivi și oarecare. 3. *Funcții continue*. Limite de funcții de una sau mai multe variabile. Puncte limită. Funcții elementare. Proprietatea Darboux. Continuitate uniformă. Funcții continue pe mulțimi compacte. 4. *Siruri și serii de funcții*. Convergență punctuală și uniformă. Transmiterea proprietăților de continuitate, derivabilitate și integrabilitate la limita sirului sau suma seriei. Serii de puteri. Dezvoltarea funcțiilor elementare în serii de puteri. Serii Fourier. Inegalitatea lui Bessel, formula lui Parseval. 5. *Calcul diferențial pentru funcții de una și de mai multe variabile*. Teoreme asupra funcțiilor derivabile pe intervale: Fermat, Darboux, Cauchy, Lagrange. Formula lui Taylor pentru funcții de o variabilă reală cu restul Lagrange. Derivate parțiale. Derivata după direcție. Derivarea funcțiilor compuse. Diferențiala funcțiilor de una și mai multe variabile. Formula lui Taylor pentru funcții de mai multe variabile. Extreme de funcții. 6. *Calcul integral*. Integrala Riemann. Integrale improprii și criterii de convergență. Integrale cu parametru. Continuitatea, derivabilitatea și integrabilitatea integralei cu parametru. Funcțiile Beta și Gama ale lui Euler.

**b) ALGEBRĂ.**

**1.** *Matrice și determinanți.* Determinanți. Transformări elementare. Matrice simetrice, antisimetrice, ortogonale. Calcul cu matrice de blocuri. Sisteme de ecuații liniare. **2.** Spații vectoriale. Subspații liniare. Subspațiu generat. Operații cu subspații. Bază și dimensiune. Matricea schimbării de baze. **3.** *Aplicații liniare.* Nucleu și imagine. Matricele unei aplicații liniare. Valori proprii și vectori proprii pentru endomorfisme și forma diagonală. Forma canonica Jordan (fără algoritm de calcul). Polinom caracteristic; teorema Cayley-Hamilton. Forme liniare, biliniare și pătratice. Forma canonica a unei forme pătratice. **4.** *Spații euclidiene și normate.* Produs scalar. Norma indușă. Distanța euclidiană. Ortogonalizare Gram-Schmidt. Determinanți Gram. Distanța de la un vector la un subspațiu. Complementul ortogonal al unui subspațiu. Operatori ortogonali. Metoda transformărilor ortogonale pentru forma canonica a unei forme pătratice. Spații normate. Norme matriceale, serii de puteri ale unei matrice.

**c) GEOMETRIE.**

**1.** *Geometrie vectorială.* Spațiu vectorial al vectorilor liberi. Vectori de poziție. Produse cu vectori: scalar, vectorial, mixt. Ecuații vectoriale pentru dreaptă, plan, cerc, sferă. **2.** *Geometrie analitică.* Coordonate în plan și spațiu. Dreapta în spațiu. Planul în spațiu. Perpendiculara comună a două drepte. Conice și cuadrice pe ecuații reduse. Reducerea la forma canonica a conicelor și cuadicelor.

**Programa secțiunii C.****a) ANALIZĂ MATEMATICĂ.**

**1.** *Mulțimi de numere.* Mulțimea numerelor reale și elemente de topologie. Inegalități remarcabile. **2.** *Șiruri și serii de numere.* Șiruri de numere. Șiruri definite prin recurențe. Serii de numere. Criterii de convergență pentru serii cu termeni pozitivi și oarecare. **3.** *Funcții continue.* Limite de funcții de una sau mai multe variabile. Puncte limită. Funcții elementare. Proprietatea Darboux. Continuitate uniformă. Funcții continue pe mulțimi compacte. **4.** *Șiruri și serii de funcții.* Convergență punctuală și uniformă. Transmiterea proprietăților de continuitate, derivabilitate și integrabilitate la limita șirului sau suma seriei. Serii de puteri. Dezvoltarea funcțiilor elementare în serii de puteri. **5.** *Calcul diferențial pentru funcții de una și de mai multe variabile.* Teoreme asupra funcțiilor derivabile pe intervale: Fermat, Darboux, Cauchy, Lagrange. Formula lui Taylor pentru funcții de o variabilă reală cu restul Lagrange. Derivate parțiale. Derivata după direcție. Derivarea funcțiilor compuse. Diferențiala funcțiilor de una și mai multe variabile. Formula lui Taylor pentru funcții de mai multe variabile. Extreme de funcții. **6.** *Calcul integral.* Integrala Riemann. Integrale improprii și criterii de convergență. Integrale cu parametru. Continuitatea, derivabilitatea și integrabilitatea integralei cu parametru. Funcțiile Beta și Gama ale lui Euler.

**b) ALGEBRĂ.**

**1.** *Matrice și determinanți.* Determinanți. Matrice simetrice, antisimetrice, ortogonale. Sisteme de ecuații liniare. **2.** Spații vectoriale. Subspații liniare. Subspațiu generat. Operații cu subspații. Bază și dimensiune. Matricea schimbării de baze. **3.** *Aplicații liniare.* Nucleu și imagine. Matricele unei aplicații liniare. Valori proprii și vectori proprii pentru endomorfisme și forma diagonală. Polinom caracteristic; teorema Cayley-Hamilton. Forme liniare, biliniare și pătratice. Forma canonica a unei forme pătratice. **4.** *Spații euclidiene și normate.* Produs scalar. Norma indușă. Distanța euclidiană. Ortogonalizare Gram-Schmidt. Complementul ortogonal al unui subspațiu. Metoda transformărilor ortogonale pentru forma canonica a unei forme pătratice. Spații normate.

**c) GEOMETRIE.**

**1.** *Geometrie vectorială.* Spațiu vectorial al vectorilor liberi. Vectori de poziție. Produse cu vectori: scalar, vectorial, mixt. Ecuații vectoriale pentru dreaptă, plan, cerc, sferă. **2.** *Geometrie analitică.* Coordonate în plan și spațiu. Dreapta în spațiu. Planul în spațiu.

Perpendiculara comună a două drepte. Conice și cuadrice. Reducerea la forma canonica a conicelor și cuadricelor.

#### **Programa secțiunii D.**

**MATEMATICI SPECIALE** 1. *Funcții complexe.* Funcții olomorfe. Condițiile Cauchy-Riemann. Serii Taylor. Serii Laurent. Funcții elementare. Formula integrală a lui Cauchy. Teoremele reziduurilor și semireziduurilor. Aplicații la calculul unor clase de integrale reale.  
2. *Transformate integrale.* Serii Fourier. Inegalitatea lui Bessel, formula lui Parseval. Transformata Fourier. Aplicații. Transformata Laplace. Aplicații.

#### **Programa secțiunii E.**

**MATEMATICI SPECIALE.** 1. *Funcții complexe.* Funcții olomorfe. Condițiile Cauchy-Riemann. Serii Taylor. Serii Laurent. Funcții elementare. Formula integrală a lui Cauchy. Teoremele reziduurilor și semireziduurilor. Aplicații la calculul unor clase de integrale reale.  
2. *Transformate integrale.* Serii Fourier. Inegalitatea lui Bessel, formula lui Parseval. Transformata Fourier. Aplicații. Transformata Laplace. Aplicații.

### **Culegerea de probleme**

Materialul inclus în această culegere conține enunțuri și rezolvări ale problemelor care s-au dat la concursul studențesc de matematică "Traian Lalescu" la fazele locală, interuniversitară și națională din anii 2002-2018.

Majoritatea covârșitoare a soluțiilor sunt realizate de autorii volumului, cu excepții minore - aici avându-se în vedere în special rezolvările sau baremele problemelor date la secțiunea cercetare, sau idei sugerate de colegi, căror autorii le sunt recunoscători.

Soluțiile propuse de autori pot servi nemijlocit în cadrul activității studenților din anii I-II ai Universității "Politehnica" București, la o bună asimilare a cursurilor cu profil matematic. Subliniem că, în timp, programa aferentă anilor de studii I-II a suferit modificări substanțiale. Prin urmare subiectele din anii 2002-2008 conțin rezolvări bazate pe noțiuni care nu se mai regăsesc în noile planuri de învățământ. Totuși, încurajăm studenții să abordeze și aceste probleme, ale căror rezolvări conțin deseori tehnici complementare deosebit de utile. Mulțumim în avans celor care doresc să contribuie la îmbunătățirea volumului prin observații, adăugiri, sau prin completarea enunțurilor care nu au putut fi procurate.

Adresăm pe această cale mulțumiri Doamnei Smaranda Lalescu - președintele Fundației Traian Lalescu - pentru susținerea constantă oferită de-a lungul timpului și pentru inițiativele care au dus la creșterea calității și prestigiului de care se bucură Concursul Traian Lalescu și implicit la creșterea rolului editiilor anterioare ale culegerii de probleme la o bună buna pregătire a participanților la edițiile concursului.

Totodată, mulțumim pentru îndrumări, materiale și idei de soluții profesorilor Andrei Halanay, Vasile Pop, Cristian Ghiu, Laura Matei, Dana Mihaela Petroșanu, Alexandru Negrescu, Mircea Olteanu, Marcel Roman, Octav Olteanu, Dumitru Opris, Valeriu Prepelită, Ligia Brânzănescu, Marinică Gavrilă, Constantin Drăgușin, Radu Urseanu, Adriana Balan și Antonela Toma.

## Enunțuri - anul I

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2002-2003

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x, y) = \begin{cases} x^2 e^{-y^2/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

- a) Studiați continuitatea lui  $f$  în punctele  $(0, y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .
- b) Studiați diferențiabilitatea Fréchet a lui  $f$  în  $(0, 0)$ .
- c) Calculați derivatele parțiale ale lui  $f$  și studiați continuitatea acestora.
- d) Fie  $g(x, y, z) = f(1, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ ,  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ .  
Să se calculeze produsul scalar  $\langle (\text{grad } g)(x, y, z), \bar{r} \rangle$  cu  $\bar{r} = (x, y, z)$ .

**II.** Se consideră seria de puteri  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$  unde  $x$  este real și  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se calculeze raza de convergență a seriei.
- b) Să se precizeze multimea de convergență a seriei pentru  $\beta = 0$  (discuție după  $\alpha \in \mathbb{R}$ ).
- c) Să se precizeze multimea de convergență a seriei pentru  $\alpha = 1$  (discuție după  $\beta \in \mathbb{R}$ ).
- d) Determinați forma funcției  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$  și precizați domeniul maxim de definiție.

**III.** Se consideră matricea  $A = \begin{pmatrix} -\cos t & \sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$ .

Fie  $T$  endomorfismul lui  $\mathbb{R}^3$  a căruia matrice în baza canonica este  $A$ .

- a) Să se găsească  $a$  astfel încât  $\text{Ker } T \neq \{0\}$ .
- b) Pentru  $t = \pi$  și  $a$  gasit la punctul a), să se determine  $\text{Ker } T$  și  $\text{Im } T$ .
- c) Pentru  $a = 1$  și  $t = \frac{\pi}{2}$  să se determine valorile proprii ale lui  $A$ .
- d) Să se studieze pentru ce valori  $a$  și  $t$ ,  $A$  este diagonalizabilă.
- e) Folosind eventual teorema Cayley-Hamilton să se calculeze, pentru  $a = 1$  și  $t = \frac{\pi}{2}$ , matricea  $(A + I_3)^{10}(A - I_3)^2 + A$ .

**IV.** Fie  $D \in \mathbb{R}^3$  o mulțime deschisă,  $(a, b, c) \subset D$ ,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^1$  cu

$$f(a, b, c) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) \neq 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) \neq 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) \neq 0.$$

Fie  $x = \varphi_1(y, z)$ ,  $y = \varphi_2(x, z)$ ,  $z = \varphi_3(x, y)$  funcțiile definite prin aplicarea teoremei funcțiilor implicate lui  $f$  relativ la  $(a, b, c)$ . Să se arate că

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(b, c) \cdot \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}(a, c) \cdot \frac{\partial \varphi_3}{\partial x}(a, b) = -1.$$

b) Fie  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, a, b) = x^7 + ax + b$ . Verificați aplicabilitatea teoremei funcțiilor implicate pentru  $F$  relativ la punctul  $(1, 1, -2)$  și deduceți că  $x = \varphi(a, b)$ .

c) Calculați  $\frac{\partial \varphi}{\partial a}$  și  $\frac{\partial \varphi}{\partial b}$  pentru  $\varphi$  definit la b).

d) Verificați că  $F(x, 1, -2) = 0$  are o unică rădăcină reală și precizați valoarea acesteia.

e) Folosind diferențiala a I-a calculați aproximativ o rădăcină a ecuației  $x^7 + 0.99x - 2.03 = 0$ .

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. La stabilirea punctajului final vor fi considerate cele mai bune 3 note din cele 4 acordate.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2003-2004

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \operatorname{arctg}(x + y)$ .

a) Scrieți formula Taylor cu rest de ordin 2 pentru  $f$  și demonstrați că are loc inegalitatea

$$|f(x, y) - x - y| \leq x^2 + y^2, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

b) Dezvoltați în serie Taylor centrată în  $x = 0$  funcția

$$g(x) = \int_0^x \left[ f(t, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, 0) \right] dt.$$

Precizați mulțimea punctelor de convergență din  $\mathbb{R}$ .

c) Estimați numărul de termeni necesari pentru calculul valorii aproximative cu două zecimale exacte pentru integrala  $\int_0^1 g(x) dx$  folosind seria de la punctul b).

**II.** Fie funcția  $z(x, y)$  definită implicit prin

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 4x + 2z + 1 = 0, \quad z \neq -1. \quad (1)$$

a) Demonstrați că  $-3 \leq z(x, y) \leq 1$ .

b) Aduceți cuadrica (1) la forma canonică; precizați tipul acesteia.

c) Determinați punctele în care se pot duce plane tangente la cuadrică, paralele cu planul

$$x + 2y - z = 0.$$

**III.** Fie  $f_k \in C^1(\mathbb{R})$ ,  $k = \overline{1, 4}$ , unde  $f_4(t) = 1, \forall t \in \mathbb{R}$ . Fie curba

$$\alpha(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t)), t \in \mathbb{R}.$$

a) i) Dacă  $f_4 \in L(\{f_1, f_2, f_3\})$ , atunci  $\alpha$  este conținută într-un plan ce nu trece prin origine. Reciproca este adevărată?

ii) Dacă  $\{f_1, f_2, f_3\}$  este o familie liniar dependentă și  $f_4 \in L(\{f_1, f_2, f_3\})$ , atunci  $\alpha$  este o porțiune de dreaptă.

b) Calculați lungimea arcului de curbă  $\alpha$  între punctele  $P(2, 1, \frac{1}{3})$  și  $Q(4, 4, \frac{8}{3})$ .

c) Să se arate că există un vector nenul  $\bar{a} = (l, m, n)$  care formează unghi constant cu  $\bar{a}'(t)$ .

**IV.** Fie  $f : C([0, 2\pi]) \rightarrow C([0, 2\pi])$ ,

$$[f(\varphi)](x) = \int_0^{2\pi} [1 + \sin(x - t)] \cdot \varphi(t) dt, \quad x \in [0, 2\pi].$$

a) Demonstrați că imaginea lui  $f$  este un subspațiu finit dimensional și să se găsească o bază a sa.

b) Aflați  $\text{Ker } f$ .

c) Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru  $f$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2004-2005

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\text{arctg} (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ .

b) Să se studieze diferențialitatea Fréchet a lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

c) Să se studieze continuitatea derivatelor partiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

d) Fie  $g(x) = \int_0^x \frac{\text{arctg} t^2}{t^2} dt$ . Folosind seria Taylor a funcției  $\text{arctg } x^2$  pe  $(-1, 1)$ , să se determine seria Taylor a lui  $g$  centrată în 0 și mulțimea de convergență a acesteia din  $\mathbb{R}$ .

e) Să se estimeze numărul de termeni necesari calculării lui  $g(1)$  cu 3 zecimale exacte.

**II.** Fie  $f(x, y, z) = x^n + y^n + z^n - 3xy + z^2 - 2z$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

a) Determinați  $n$  minim astfel încât funcția  $f$  să admită un unic punct de extrem local în domeniul  $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$ , specificând acest punct și natura sa.

b) Pentru  $n = 4$  determinați punctele staționare ale funcției  $z(x, y)$  obținută prin aplicarea teoremei funcțiilor implicate relativ la punctul  $(0, 0, 1)$ .

c) Studiați natura punctelor staționare obținute anterior.

**III.** Fie  $A = \frac{1}{2}(B + B^t)$ , unde  $B \in M_n(\mathbb{R})$ , iar  $B^t$  este transpusa matricei  $B$ .

a) Notăm cu  $T$  endomorfismul lui  $\mathbb{R}^n$  a căruia matrice în raport cu baza canonica a lui  $\mathbb{R}^n$  este  $A$  și cu  $Q$  funcția  $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $Q(x) = X^t \cdot A \cdot X$ , pentru  $X = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$ . Să se arate că toate valorile proprii ale lui  $T$  sunt reale și că  $Q(x) \geq 0$  dacă și numai dacă toate aceste valori proprii sunt pozitive.

În continuare vom considera  $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -5 \\ 1 & 8 & 1 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ .

b) Să se găsească o bază a lui  $\mathbb{R}^3$  formată din vectori proprii ai lui  $T$  și o matrice  $C$  astfel încât  $C^{-1} \cdot A \cdot C$  să fie diagonală.

c) Să se găsească o bază ortonormală a lui  $\mathbb{R}^3$  astfel încât matricea lui  $T$  să fie diagonală și o matrice ortogonală  $S$  astfel încât  ${}^t S \cdot A \cdot S$  să fie diagonală.

d) Să se găsească forma canonică a ecuației cuadricei  $\Sigma : X^t \cdot A \cdot X + A_1 \cdot X - 22 = 0$ , unde  $A_1 = (10, 4, -8)$  și să se precizeze tipul cuadricei.

**IV.** Fie  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \cos \theta + x_3 \sin \theta - 1, x_2 + 1, -x_1 \sin \theta + x_3 \cos \theta - 1)^t$ ,  $\theta \in (0, \frac{\pi}{4})$

a) Să se arate că  $\|f(x) - f(y)\|_2 = \|x - y\|_2$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$ , unde  $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ .

b) Să se găsească  $R \in M_3(\mathbb{R})$  și  $C \in \mathbb{R}^3$  astfel încât

$$f(x) = Rx + C, \quad x = (x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3.$$

c) Să se afle valorile proprii și vectorii proprii corespunzători pentru  $R$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profilele electric și mecanic(baraj), 2004-2005

**I.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 9 & 5 & 1 \\ -3 & 5 & 13 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 20 \end{pmatrix}$ .

a) Puteți găsi, fără a calcula polinomul caracteristic, o majorare pentru cea mai mare valoare proprie?

b) Operatorul liniar  $T$  asociat matricei  $A$  în baza canonica este autoadjunct? (Justificare).

c) Operatorul liniar  $T$  este pozitiv definit? (Justificare).

**II.** a) Determinați polinomul caracteristic și subspațiile proprii pentru operatorul

liniar  $T$  care are în baza canonica matricea  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ .

b) Cum arată această matrice dacă se știe că operatorul liniar  $T$  are valorile proprii  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 4$ ?

**III.** Scrieți formula prin care se calculează  $F'(y)$  dacă  $F(y) = \int_{a-y}^{a+y} \frac{\ln(1+x^2y^2)}{x^2} dx$ .

**IV.** Determinați elementele triedrului Frenet pentru curba  $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  în punctul  $A(1, 1, -2)$ .

**V.** Fie seria  $S(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{2n+2}$ . Exprimăți prin funcții cunoscute  $\int_1^x S(t) dt$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2005-2006

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-1/(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

- a) Studiați continuitatea funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .
- b) Calculați  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ .
- c) Calculați  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  și studiați continuitatea lor în  $(0, 0)$ . Studiați diferențiabilitatea funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .
- d) Folosind dezvoltarea Taylor în jurul lui 0 a lui  $e^x$ , calculați sub forma unei serii de puteri integrala  $\int_1^{\infty} \frac{e^{1/x^2}}{x^2} dx$

**II.** a) Dezvoltăți în serie Taylor în jurul lui 0 funcția  $f(x) = \operatorname{arctg}(x)$ .

b) Calculați suma  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ .

c) Determinați extremele locale pentru  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \cos x + y^2 - 2y + 5$ .

**III.** Fie matricea  $A \in M_3(\mathbb{R})$ ,  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  un vector propriu corespunzător valorii proprii  $\lambda_1 = 3$ , iar  $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  vectori proprii pentru  $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ .

- a) Arătați că  $\det A = 0$ .
- b) Arătați că  $A$  este diagonalizabilă.
- c) Arătați că  $A^3 = 3A^2$ .

**IV.** Fie punctele  $A(1, 1, 1)$ ,  $B(-1, -2, -1)$ ,  $C(u, v, 1 + uv)$ ,  $u, v \in \mathbb{R}$ .

- a) Calculați  $\overline{AB} \times \overline{AC}$ .
- b) Calculați aria triunghiului  $AOB$ .
- c) Demonstrați că  $C$  descrie o cuadrică și precizați tipul acesteia.
- d) Câte puncte  $C$  există astfel încât  $A, B, C$  să fie coliniare ?

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2006-2007

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} y^2 \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right) & , y \neq 0; \\ 0 & , y = 0. \end{cases}$

- a) Să se calculeze derivatele parțiale ale lui  $f$  în  $(a, 0)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
  - b) Să se studieze diferențiabilitatea Fréchet în  $(a, 0)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
  - c) Să se studieze continuitatea derivatelor parțiale ale lui  $f$  în  $(a, 0)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
- II.** a) Să se afle extretele funcției  $f : (0, \pi) \times (0, \pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z).$$

b) Să se calculeze suma  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n(n+1)}\right)}{\cos \frac{1}{n} \cdot \cos \frac{1}{n+1}}$ .

**III.** a) Fie  $M = (1, 1, 1)$ ,  $N = (1, 2, 2)$ ,  $P = (2, 3, 2)$ ,  $Q = (3, 2, 1)$ . Să se determine  $\overline{MN}$ ,  $\overline{MP}$  și  $\overline{MQ}$  și să se calculeze volumul tetraedului  $MNPQ$ .

b) Fie suprafața  $\Sigma$  de ecuație  $y + 2xz - 1 = 0$ . Să se scrie ecuația planului tangent la  $\Sigma$  în  $M = (-1, 3, 1)$  și să se studieze ce plane intersectate cu  $\Sigma$  formează hiperbole.

**IV.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se studieze pentru ce valori ale lui  $a \in \mathbb{R}$ ,  $A$  este diagonalizabilă.
- b) Pentru  $a = 1$  să se afle matricele  $C$  de trecere la bazele ortonormate orientate pozitiv formate din vectori proprii.
- c) Să se arate că matricele  $C$  de la punctul b) sunt ortogonale și să se afle unghiul  $\theta \in [0, 2\pi]$  pentru care  $C = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2007-2008

**I.** a) Să se dezvolte în serie de puteri, în jurul originii, funcția

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \arcsin x;$$

b) Să se deducă suma seriei  $\sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1}$ .

**II.** Fie  $P \subset \mathbb{R}^3$  planul de ecuație  $x + 2y + 2z = 0$  și aplicația  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  care asociază fiecărui punct  $M$ , punctul  $M' =$  proiecția ortogonală a lui  $M$  pe planul  $P$ .

- a) Să se arate că  $f$  este liniară și să se determine nucleul și imaginea lui  $f$ ;  
 b) Să se arate că  $f$  este diagonalizabilă;  
 c) Generalizare.

**III.** Se consideră funcția  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(x) = \{x\}$  (partea fracționară a lui  $x$ ).

- a) Să se arate că  $\varphi$  este periodică și să se calculeze  $I_n = \int_0^n \varphi(x) \cos 2\pi nx \, dx$ .  
 b) Fie  $f_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varphi(kx)}{2^k}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Să se arate că  $(f_n, n \geq 1)$  este un sir de funcții periodice, uniform convergent pe  $\mathbb{R}$ .  
 c) Să se arate că funcția  $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$  este continuă pe  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

**IV.** Fie  $A, B \in M_3(\mathbb{R})$  astfel încât  $AB = BA$ ,  $A^{2007} = I_3$  și  $B^{2008} = I_3$ .

- a) Să se determine valorile proprii comune ale matricilor  $A, B$ .  
 b) Să se arate că polinoamele  $P = X^{2007} - 1$ ,  $Q = (X + 1)^{2008} - 1$  sunt relativ prime.  
 c) Presupunem că există un vector coloană nenul  $x \in \mathbb{R}^3$  astfel încât  $(A + B + I_3) \cdot x = 0$ ; să se arate că  $(A + I_3)^n \cdot x = (-1)^n \cdot B^n \cdot x$ , pentru orice  $n \geq 1$ .  
 d) Folosind eventual b), c) să se arate că matricea  $A + B + I_3$  este inversabilă.

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza locală, anul I, profil electric, 2008-2009**

**I.** Fie  $A \in M_n(\mathbb{R})$  o matrice al cărei polinom caracteristic nu admite nicio rădăcină reală. Demonstrați că matricea  $A$  este inversabilă și că polinomul caracteristic al matricei  $A^{-1}$  nu admite rădăcini reale.

**II.** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

- a) Să se determine o matrice  $T \in M_3(\mathbb{R})$ , astfel încât  $T^{-1}AT$  să fie diagonală.  
 b) Să se determine o matrice  $C \in M_3(\mathbb{R})$ , astfel încât  $C^{2009} = A$ .

**III.** Fie sirul  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot a_n$ ,  $n \geq 1$ . Considerăm seria  $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} \cdot x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se găsească domeniul de convergență al seriei.  
 b) Să se calculeze  $S'(0)$ , unde  $S$  este suma seriei.

**IV.** a) Să se dezvolte în serie de puteri funcția  $f(x) = \arcsin(x)$ , determinând domeniul de convergență.

b) Să se calculeze suma seriei  $\sum_{n \geq 1} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^{2n} (2n+1)!}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2008-2009

**I.** Fie  $(a_n)_n$  un sir de numere reale cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $a_n \neq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Arătați că serile  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - \sin a_n|$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^3$  au aceeași natură (sunt simultan convergente sau divergente).

b) Să se arate că dacă seria  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^3$  este convergentă atunci seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin a_n$  au aceeași natură.

c) Studiați convergența simplă și convergența absolută a seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \left( \frac{n}{\sqrt{n^3 + 1}} \right).$$

**II.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

și  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\varphi(t) = (1-t, 1+t)$ .

a) Să se studieze continuitatea lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

b) Să se studieze variația funcției  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) = f(\varphi(t))$ .

c) Să se determine  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , astfel încât  $f(x, y) = h\left(\frac{x}{y}\right)$ , pentru orice  $y \neq 0$ .

**III.** Fie  $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$  și  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  un endomorfism pentru care  $T(e_2) = (2, 2, -2)$ , și al cărui nucleu este

$$\text{Ker } T = \{(\lambda + \mu, \lambda, \lambda - \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

a) Este zero valoare proprie pentru  $T$ ? Dacă da, determinați vectorii proprii corespunzători.

b) Să se arate că vectorii  $v = e_1 + e_2 + e_3$  și  $w = e_1 - e_3$  aparțin lui  $\text{Ker } T$ .

c) Să se exprime vectorii  $T(e_1)$ ,  $T(e_2)$  și  $T(e_3)$  în funcție de vectorii bazei  $E$ .

d) Să se determine matricea lui  $T$  în baza  $E$  și să se găsească subspațiile proprii ale lui  $T$ .

**IV.** Fie  $S$  spațiul vectorial real al sirurilor de numere reale. Fie

$$L = \left\{ (x_n)_n \in S \mid x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n - \frac{1}{6}x_{n-1}, n \geq 2 \right\}, \quad u = \left( \frac{1}{2^n} \right)_{n \geq 1}, \quad v = \left( \frac{1}{3^n} \right)_{n \geq 1}.$$

- a) Să se arate că  $L$  este subspațiu al lui  $S$ .  
 b) Să se arate că  $u$  și  $v$  aparțin lui  $L$ .  
 c) Dacă  $(z_n)_n \in L$ ,  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = 0$  să se arate că există  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , astfel încât

$$z_n = \alpha \frac{1}{2^n} + \beta \frac{1}{3^n}, \quad \forall n \geq 1.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
 Faza locală, anul I, profil electric, 2009-2010

**I.** Fie  $\{i, j, k\}$  o bază ortonormată în spațiul  $\mathbb{V}_3$ .

- a) Dacă vectorii  $a, b, c \in \mathbb{V}_3$  satisfac inegalitatea  $\|a\|^2 + \|b\|^2 + \|c\|^2 < 1$ , atunci vectorii  $i + a, j + b, k + c \in \mathbb{V}_3$  alcătuiesc o bază în  $\mathbb{V}_3$ .  
 b) Dacă vectorii  $a, b, c \in \mathbb{V}_3$  satisfac inegalitatea

$$\cos(a, i) + \cos(b, j) + \cos(c, k) > \frac{5}{2},$$

atunci familia  $\{a, b, c\}$  este o bază în  $\mathbb{V}_3$ .

**II.** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  astfel încât  $A$  are toate valorile proprii distințe. Să se arate că:  $AB = BA$  dacă și numai dacă există un polinom  $P \in \mathbb{C}[X]$  astfel încât  $B = P(A)$ .

**III.** Determinați raza de convergență  $R$ , a seriei  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , în următoarele cazuri:

- a)  $a_n$  este numărul divizorilor lui  $n$  ( $n \geq 1$ );  
 b)  $a_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ ,  $n \geq 1$ ;  
 c)  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ ,  $n \geq 1$ . În acest ultim caz calculați suma seriei  $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ ,

știind că

$$\sum_{n=0}^{\infty} y_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty} w_n, \quad w_n = \sum_{k=0}^n y_k z_{n-k}.$$

S-a notat  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  suma seriei  $\sum_{n \geq 0} y_n$ .

**IV.** Fie  $f_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{-\infty}^x t^{2n+1} e^{-t^2} dt$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- a) Deduceți o relație de recurență între  $f_n$  și  $f_{n-1}$ .  
 b) Calculați  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2009-2010

**I.** a) Discutați convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^{\alpha} \frac{1}{n}$ , unde  $\alpha$  este un parametru real.

b) Să se afle multimea de convergență din  $\mathbb{R}$  a seriei de puteri  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin \frac{1}{n}$ .

**II.** a) Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^2$  și  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x, y) = f(x^2 + y^2)$ . Calculați  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$  în funcție de derivatele lui  $f$ .

b) Studiați derivabilitatea funcției dată prin  $h(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}$  pentru  $(x, y) \neq (0, 0)$  și  $h(0, 0) = 0$ .

**III.** a) Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$ .

b) Arătați că  $\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1}$  și indicați un rezultat din care rezultă convergența uniformă pe  $[0, 1]$ ;

c) Dezvoltați în serie de puteri centrată în 0 funcția  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$  pentru  $|x| < 1$ .

d) Calculați integrala  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$ .

**IV.** Fie  $A$  o matrice  $3 \times 3$  cu elementele reale, astfel ca  $A^3 = A$ .

a) Arătați că singurele valori proprii sunt  $-1, 1$  sau  $0$ .

b) Arătați că o astfel de matrice poate fi totdeauna diagonalizată.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2010-2011

**I.** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . Definim  $[A, B] = AB - BA$ .

a) Dacă  $tr(A) = tr(A^2) = 0$ , atunci  $A^2 = O_2$  (unde  $tr(A)$  este urma matricei  $A$ ).

b) Dacă  $[A, B] = A$ , atunci  $A^2 = O_2$ .

c) Dacă  $[A, B]A = A[A, B]$ , atunci  $[A, B]^2 = O_2$ .

**II.** a) Să se determine triunghiul de arie maximă de perimetru  $2p$ .

b) Un punct critic pentru o funcție  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  este un punct în care se anulează toate derivatele parțiale de ordinul întâi.

i) Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  care are un unic punct critic  $x_0$ . Dacă  $x_0$  este punct de extrem local, atunci este și punct de extrem global pentru  $f$ .

ii) Fie  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  care are un unic punct critic  $(x_0, y_0)$  care este și punct de extrem local. Rezultă că  $(x_0, y_0)$  este punct de extrem global? (A se considera, de exemplu, funcția  $g(x, y) = e^{3x} + y^3 - 3e^x y$ ).

**III.** Fie  $E$  un spațiu vectorial cu dimensiunea  $2n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Dacă  $f : E \rightarrow E$  este o aplicație liniară, atunci afirmațiile următoare sunt echivalente:

i)  $\text{Ker } (f) = \text{Im } (f)$ .

ii)  $f^2 = 0$ ,  $f \neq 0$ ,  $\dim(\text{Im } (f)) = n$ .

b) Construiți o aplicație liniară cu proprietățile de mai sus.

**IV.** a) Să se arate că seria de puteri pentru funcția  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  este

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} x^{2n}.$$

b) Deduceți că

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

și studiați convergența uniformă pe intervalul  $[0, 1]$ .

c) Arătați că

$$\int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)},$$

demonstrând că integrarea termen cu termen este permisă.

d) Arătați că

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$$

demonstrând că integrarea termen cu termen este permisă.

e) Să se deducă relația

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2010-2011

**I.** a) Să se dezvolte în serie de puteri  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  funcțiile  $\frac{1}{1-x}$  și  $\ln \frac{1}{1-x}$  precizând multimea de convergență.

b) Să se descrie seriile de puteri pentru  $\ln \frac{1}{1-x} = x - \frac{x^2}{2} + \dots - \frac{x^n}{n}$  și pentru

$$\frac{1}{1-x} = 1 - x - x^2 - \dots - x^n, \quad n \geq 1.$$

c) Să se calculeze  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^{\infty} x^{k+n} \right)$ .

d) Să se calculeze  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \ln \frac{1}{1-x} - x - \frac{x^2}{2} + \dots - \frac{x^n}{n} \right)$ .

**II.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-x^2-y^2}}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Să se calculeze derivatele parțiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

b) Să se studieze derivabilitatea (diferențabilitatea) Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .

c) Să se scrie dezvoltarea Taylor în jurul lui  $0$  a funcției  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

**III.** Fie  $D \subset \mathbb{R}^2$  domeniul închis mărginit de axele  $Ox$ ,  $Oy$  și de dreapta de ecuație  $x + y + 3 = 0$ . Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y + 4$ .

a) Să se determine parametric frontiera lui  $D$ .

b) Să se studieze existența punctelor de extrem pentru  $f$  în interiorul lui  $D$ .

c) Să se studieze existența punctelor de extrem pentru  $f$  pe frontiera lui  $D$ .

**IV.** Fie  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \left(\begin{pmatrix} x_1+2x_2 \\ 2x_1+4x_2 \end{pmatrix}\right)$ .

a) Să se găsească  $\text{Ker } T$  și  $\text{Im } T$  (nucleul și imaginea lui  $T$ ) și să se calculeze dimensiunile lor indicând o bază pentru fiecare.

b) Să se scrie matricea  $A$  atașată lui  $T$  în baza  $B_1 = \{(0, 1), (1, 0)\}$ .

c) Să se arate că  $B_2 = \{(1, 2), (2, -1)\}$  este o bază a lui  $\mathbb{R}^2$  și să se scrie matricea de trecere de la  $B_1$  la  $B_2$ .

d) Să se scrie matricea lui  $T$  în raport cu  $B_2$ .

e) Să se calculeze valorile proprii corespunzători pentru  $A$ . Este  $A$  diagonalizabilă?

f) Să se găsească o formulă pentru  $A^n$  și să se calculeze  $\langle A^n \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right) \rangle$ , folosind produsul scalar din  $\mathbb{R}^2$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil electric, 2011-2012

**I.** Se consideră seria  $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n-1}}{(n+1)(1+x^{2n})}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se determine toate valorile lui  $x$  pentru care seria este convergentă.  
 b) Să se arate că  $\forall y \in (0, 1)$ , seria este uniform convergentă pe  $[0, y]$ .  
 c) Dacă  $f$  este suma seriei, arătați că există  $\int_0^1 f(x)dx$  și calculați  $\int_0^1 f(x)dx$ .

**II.** a) Fie  $a \in \mathbb{R}$  și  $\varphi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă, astfel încât  $x\varphi'(x) = a\varphi(x)$ ,  $\forall x > 0$ . Definim funcția  $\psi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\psi(x) = x^{-a}\varphi(x)$ ,  $\forall x > 0$ . Calculați  $\psi'$  și deduceți că există o constantă  $c \in \mathbb{R}$ , astfel încât  $\varphi(x) = cx^a$ ,  $\forall x > 0$ .

b) Fie mulțimea  $V(a) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f$  funcție derivabilă,  $xf'(x) = af(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}\}$  ( $a \in \mathbb{R}$ ). Definim două operații:

- pentru orice  $f, g \in V(a)$ ,  $f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ;
  - pentru orice  $f \in V(a)$  și orice  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha \cdot f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha f(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .
- i) Să se arate că  $V(a)$ , cu aceste două operații, este un spațiu vectorial real.  
 ii) Arătați că dacă  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ , atunci pentru orice  $f \in V(a)$ , avem  $f(0) = f'(0) = 0$ .  
 iii) Să se determine dimensiunile spațiilor  $V(2)$ ,  $V(1)$ ,  $V(\frac{1}{3})$ .

**III.** a) Să se determine toate matricele  $B \in M_2(\mathbb{R}) \setminus \{c \cdot I_2 \mid c \in \mathbb{R}\}$  care comută cu matricea  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ . Să se arate că  $B$  este diagonalizabilă și că are aceleași vectori proprii ca și  $A$ .

b) Aplicația liniară  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  satisfacă relația  $\text{Ker } (f) \oplus \text{Im } (f) = \mathbb{R}^n$ . Arătați că  $f$  este suma a două automorfisme pe spațiul  $\mathbb{R}^n$ .

**IV.** În  $\mathbb{R}^3$  se consideră dreptele

$$d_1 : x - y = 0, x + y - z = 0 \text{ și } d_2 : x - z = 0, x + y + z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- a) Să se discute după parametrul  $\lambda$  poziția relativă a celor două drepte.  
 b) Pentru  $\lambda = 1$  să se afle ecuațiile dreptei care se aprijină pe dreptele  $d_1$  și  $d_2$ , și este perpendiculară pe  $d_1$  și pe  $d_2$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza locală, anul I, profil mecanic, 2011-2012**

- I.** a) Să se calculeze  $\lim_{x \searrow 0} x^{1/x}$  și  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ .  
 b) Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}}, & \text{pentru } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{pentru } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

- i) Calculați  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ .  
 ii) Studiați derivabilitatea Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .  
 iii) Studiați continuitatea derivatelor parțiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

**II.** a) Să se dezvolte funcția  $f(x) = \ln(1 + x^2)$  în serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ .

b) Să se afle multimea de convergență a acestei serii și să se studieze convergența uniformă a acesteia.

c) Folosind rezultatul  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ , să se calculeze  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ .

d) Să se calculeze  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx$  folosind seria de la punctul a).

**III.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x-y}$ .

a) Să se determine extremele locale ale lui  $f$ .

b) Să se determine maximul lui  $f$  în multimea  $\{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ .

c) Să se arate că  $\frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$  pentru orice  $x \geq 0, y \geq 0$ .

**IV.** Fie multimea  $U = \left\{ \begin{pmatrix} 2\alpha \\ -\alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} \subset M_{3,1}(\mathbb{R})$  și matricea

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

a) Să se arate că  $U$  este un subspațiu vectorial al lui  $M_{3,1}(\mathbb{R})$ . Să se găsească o bază a lui  $U$  și să se precizeze dimensiunea lui  $U$ .

b) Să se calculeze valorile proprii și vectorii proprii ai lui  $A$ .

c) Să se arate că  $U$  este unul dintre subspațiile proprii ale lui  $A$  (adică  $U = \{X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \mid AX = \lambda X\}$ , unde  $\lambda$  este o valoare proprie a lui  $A$ ).

d) Să se arate că  $A$  este diagonalizabilă și să se diagonalizeze.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil electric, 2012-2013

**I.** Fie  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

a) Arătați că  $\det(A^2 + I_n) \geq 0$ .

b) Dacă  $A^3 = O_n$ , arătați că matricea  $B = \frac{1}{2}A^2 + A + I_n$  este inversabilă și calculați  $B^{-1}$ .

**II.** Să se determine toate transformările liniare  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  cu proprietatea  $\text{Im } (T) = \text{Ker } (T)$ . Studiați aceeași problemă pentru  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ .

**III.** Fie  $f_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{-\infty}^x t^{2n+1} \cdot e^{-t^2} dt$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

a) Găsiți relația de recurență între  $f_n$  și  $f_{n-1}$ .

b) Calculați  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

c) Calculați  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ .

**IV.** Fie funcția  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Studiați continuitatea funcției, existența derivatelor parțiale și diferențialibilitatea în origine.

b) Calculați integrala  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( f\left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}\right) \right)^{2k+1} dt, k \in \mathbb{N}.$

c) Studiați convergența punctuală și cea uniformă pentru sirul  $g_n(x) = \frac{1}{2n} f(x^2, n)$ , pentru  $x \in \mathbb{R}, n \geq 1$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2012-2013

**I.** a) Să se găsească mulțimea de convergență din  $\mathbb{R}$  a seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n}$ .

b) Să se determine  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\cos x)^n}{n}$ , precizând mulțimea acelor  $x \in \mathbb{R}$  pentru care  $f$  este definită.

c) Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ .

**II.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită astfel:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

a) Să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y); \frac{\partial f}{\partial y}(0, y)$ .

b) Să se studieze derivabilitatea Fréchet în  $(0, y)$ .

c) Să se studieze continuitatea derivatelor parțiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$  și în  $(0, y)$ ,  $y \neq 0$ .

**III.** Fie  $D$  triunghiul închis mărginit de  $Ox$ ,  $Oy$  și de dreapta  $x + y = \pi$ . Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = \cos x + \cos y - \cos(x + y).$$

a) Să se descrie parametric frontiera lui  $D$ .

b) Să se găsească punctele staționare ale lui  $f$  din  $D$  ( $D$  este închis !) și să se studieze dacă printre ele se află puncte de extrem local ale lui  $f$ .

c) Să se calculeze maximul și minimul lui  $f$  pe  $D$ .

**IV.** Se consideră familiile de vectori:

$$\mathcal{F} = \{u_1 = (2, 0, 1, 3), u_2 = (0, 1, 3, 2), u_3 = (1, 3, 2, 0), u_4 = (3, 2, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^4$$

$$\mathbf{B} = \{e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0), e_3 = (0, 0, 1, 0), e_4 = (0, 0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^4.$$

Notăm  $u_5 = u_1$ . Fie  $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  operatorul liniar care satisface condițiile

$$T(u_k) = u_{k+1}, \quad \forall k \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

- a) Construiți matricea  $A$  a operatorului  $T$  relativ la baza  $B$ .
- b) Arătați că  $F$  este bază în  $\mathbb{R}^4$  și aflați matricea lui  $T$  relativ la  $F$ .
- c) Aflați valorile proprii ale matricei  $A$  și determinați vectorii proprii.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2013-2014

**I.** Fie  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$  și  $I = I_3$ .

- 1. Verificați că:
  - a)  $A + I$  este nesingulară;
  - b)  $(I - A)(I + A)^{-1} = (I + A)^{-1}(I - A)$ ;
  - c) matricea  $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$  este ortogonală (adică  $Q^t = Q^{-1}$ ).
- 2. Determinați toate valorile proprii reale ale matricei  $Q$ , împreună cu vectorii proprii corespunzători.
- 3. Demonstrați proprietățile a), b), c) de la punctul 1 în cazul în care  $A$  este o matrice antisimetrică ( $A^t = -A$ ),  $3 \times 3$  oarecare.

- II.** a) Să se dezvolte funcția  $f(x) = \arcsin x$  în serie de puteri în jurul lui 0.  
b) Să se calculeze suma seriei

$$1 + \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1}.$$

**III.** Fie funcțiile  $f \in C^2(\mathbb{R})$  și  $v(x, y) = f(\frac{y}{x})$ . Presupunem că funcția  $f$  este armonică.

- a) Arătați că
- $$\frac{x^2 + y^2}{x^4} f''\left(\frac{y}{x}\right) + 2 \frac{y}{x^3} f'\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$
- b) Să se afle funcția  $f$  (se poate folosi substituția  $t = \frac{y}{x}$ ).

**IV.** Se consideră forma pătratică  $q(x) = x^t Ax$ , unde  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ , unde  $x$  este un vector coloană nenul din  $\mathbb{R}^3$ .

- a) Determinați transformarea ortogonală  $x = Qy$  prin care forma pătratică este redusă la forma canonica.

b) Determinați valorile extreme ale funcției  $g : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)^t\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{x^t Ax}{x^t x}$  și vectorii în care se ating aceste valori.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2013-2014

**I.** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

a) Să se calculeze  $A^n$ ,  $n \geq 2$ .

b) Să se calculeze  $e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!}$ .

c) Să se calculeze  $\langle Ax, Ax \rangle$ , cu  $x = (x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3$ , unde  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  este produsul scalar canonic pe  $\mathbb{R}^3$ .

d) Să se calculeze  $\|A\| = \sup\{\langle Ax, Ax \rangle^{1/2} \mid \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = 1\}$ .

e) Să se indice punctele de pe sfera unitate în care  $\|A\|$  este atinsă.

**II.** Fie ecuația  $z^4 - x^4 - y^4 = 0$ .

a) Să se găsească punctele în care se poate aplica teorema funcțiilor implice pentru a obține funcția  $z = z(x, y)$ .

b) Să se arate că funcția  $f$  astfel obținută verifică relația  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ .

c) Să se scrie polinomul Taylor de grad 2 al funcției  $z$  de la punctul a), relativ la punctul  $(1, 0)$ .

**III.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \frac{y^{2k}}{x^{2k-3}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

a) Să se calculeze suma seriei care definește funcția  $f$ .

b) Să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ .

c) Să se studieze derivabilitatea (diferențialitatea) Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .

**IV.** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

a) Să se calculeze  $A^2, A^3, A^4$ .

b) Pentru  $v = (0, 0, 0, 1)^t \in \mathbb{R}^4$  să se arate că vectorii  $v, Av, A^2v, A^3v$  sunt liniar independenti.

c) Fie  $V$  un spațiu vectorial real cu  $\dim V \geq 2$  și  $T : V \rightarrow V$  o aplicație liniară cu proprietățile  $T^p = 0$  și  $T^{p-1} \neq 0$  pentru un  $p \in \{2, 3, \dots, \dim V\}$ . Să se arate că dacă  $v \in V$  este un vector pentru care  $T^{p-1}v \neq 0$ , atunci familia de vectori  $\{v, Tv, T^2v, \dots, T^{p-1}v\}$  este liniar independentă.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2014-2015

**I.** Considerăm sirul  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ , cu  $a_n = \underbrace{\sin(\sin \dots (\sin 1) \dots)}_{n \text{ de sin}}$ .

- a) Scrieți polinomul Taylor de ordin 3, centrat în origine, pentru funcția  $f(x) = \sin x$ .
- b) Calculați  $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$ .
- c) Studiați convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ .

**II.** a) Dacă  $x \in (0, 1]$ , arătați că

$$x^{-x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n \ln^n x}{n!}.$$

b) Demonstrați că

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-n}.$$

**III.** Considerăm matricea  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ .

- a) Determinați matricea  $T \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  astfel încât  $T^{-1}AT$  să fie diagonală.
- b) Determinați matricea  $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  astfel încât  $C^{2015} = A$ .
- c) Fie  $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$  bază canonica a lui  $\mathbb{R}^3$ . Determinați o bază ortonormată  $\mathcal{B}_1 = \{f_1, f_2, f_3\}$  a lui  $\mathbb{R}^3$ , astfel încât aceasta să fie formată din vectori proprii ai matricei  $A$  care satisfac condițiile  $\langle f_1, e_1 \rangle > 0$ ,  $\langle f_2, e_2 \rangle = 0$  și  $\langle f_3, e_3 \rangle < 0$  (produsul scalar considerat este cel euclidian).

**IV.** a) Fie  $A, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $AD = DA$  și  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ , cu  $\lambda_i \neq \lambda_j$ , pentru  $i \neq j$ . Arătați că  $A$  este o matrice diagonală.

b) Fie  $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  două matrice simetrice, cel puțin una având valorile proprii diferite între ele. Arătați echivalența următoarelor afirmații:

- i)  $XY = YX$ ;
- ii) există o matrice ortogonală  $Z$  astfel încât  $Z^{-1}XZ$  și  $Z^{-1}YZ$  sunt amândouă matrice diagonale.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2014-2015

**I.** Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{y^{2n}}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0. \end{cases}$

- a) Să se calculeze suma seriei care definește pe  $f$  și să se precizeze domeniul de convergență.  
 b) Să se studieze derivabilitatea (diferențiabilitatea) Fréchet a lui  $f$  în  $(0, 0)$ .  
 c) Să se studieze continuitatea derivatelor parțiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

**II.** Fie ecuația  $x^2 + y^2 + z^2 - y \sin \frac{z}{y} = 1$

- a) Arătați că, relativ la  $(1, 0, 1)$ , teorema funcțiilor implicate permite definirea unei funcții  $z = z(x, y)$ .  
 b) Calculați  $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 1)$  și  $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1)$ .  
 c) Arătați că  $z$  verifică egalitatea

$$(x^2 - y^2 - z^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} = 2xz.$$

**III.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \frac{1 - \alpha(x + y)}{x^2 + y^2}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

- a) Discutați existența punctelor staționare ale funcției  $f$  (punctele în care  $df(x, y) = 0$ ).  
 b) Determinați natura punctelor de extrem local ale lui  $f$ , atunci când acestea există.

**IV.** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  (unde  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  este mulțimea matricelor pătrate de ordinul  $n$ ) și fie  $S(A, B) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AM = MB\}$ .

- a) Arătați că  $S(A, B)$  formează subspațiu vectorial în  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .  
 b) Pentru  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  și  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , determinați o bază în  $S(A, B)$ .  
 c) Determinați  $S(A, B)$  pentru  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  și  $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil electric, 2015-2016

**I.** Considerăm sirul  $(u_n)_{n \geq 1}$ , cu  $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg} t)^n dt$ , pentru orice număr natural nenul  $n$ .

- a) Studiați convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ .  
 b) Studiați convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^{\alpha}}$ , unde  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**II.** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  astfel încât  $AB = BA$ ,  $A^{2015} = I_3$  și  $B^{2016} = I_3$ .

- a) Să se determine valorile proprii comune matricelor  $A$  și  $B$ .  
 b) Presupunem că există un vector coloană nenul  $x \in \mathbb{R}^3$  astfel încât  $(A + B + I_3)x = 0$ . Să se arate că, pentru orice  $n \geq 1$ , avem  $(A + I_3)^n x = (-1)^n B^n x$ .

**III.** Fie  $I$  mulțimea tuturor numerelor reale  $x$  pentru care seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n) \cdot x^n$  este convergentă. Notăm cu  $f(x)$  suma acestei serii.

- a) Să se determine  $I$ .
- b) Considerăm sirul  $(a_n)_{n \geq 1}$ , dat de  $a_1 = -1$  și  $a_n = -\ln(1 - \frac{1}{n}) - \frac{1}{n}$ , pentru  $n \geq 2$ . Să se determine domeniul de definiție a funcției  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ .
- c) Să se găsească o relație între funcțiile  $f$  și  $g$ .
- d) Să se calculeze  $g(1)$  și  $g(-1)$ .

**IV.** Fie  $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^\infty(a, b)$  cu derivata  $g'(x) \neq 0$ , pentru orice  $x \in (a, b)$ . Să se determine valorile proprii și vectorii proprii pentru operatorul  $T : C^\infty(a, b) \rightarrow C^\infty(a, b)$ , cu  $T(f)(x) = \frac{f'(x)}{g'(x)}$ , pentru orice  $x \in (a, b)$ .

**V.** Fie  $V$  un spațiu vectorial de dimensiune  $n$  și  $f : V \rightarrow V$  o aplicație liniară. Arătați că următoarele afirmații sunt echivalente:

- a)  $\text{Im } f = \text{Im } f^2$ ;
- b)  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$ ;
- c)  $V = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$ .

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva, la alegere, 4 subiecte din cele 5.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2015-2016

**I.** a) Să se găsească domeniul  $D$  din  $\mathbb{R}^2$  pentru care seria  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{2n-1}}{x^{2n+1}}$  este convergentă și să se calculeze suma sa pe domeniul respectiv.

b) Să se studieze derivabilitatea (diferențabilitatea) Fréchet în  $(0, 0)$  a funcției  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

c) Să se studieze continuitatea în  $(0, 0)$  a derivatelor partiale de ordinul întâi ale funcției  $f$  de la punctul b).

**II.** Fie ecuația  $\ln\left(\frac{x^2 + y^2}{z^2}\right) + \operatorname{arctg}\frac{y}{z} = 0$ .

a) Să se verifice ipotezele teoremei funcțiilor implicate relativ la punctul  $(1, 0, 1)$  și să se deducă existența unei funcții  $z = z(x, y)$ .

b) Să se calculeze  $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$  și  $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0)$ .

c) Să se arate că funcția  $z$  astfel obținută verifică relația  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ .

**III.** Fie mulțimea  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$  și funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x$ .

- a) Să se afle punctele de extrem local din  $D$  ale funcției  $f$ .
- b) Să se descrie parametric frontieră mulțimii  $D$ .
- c) Să se calculeze maximul și minimul funcției  $f$  pe mulțimea  $D$ .

**IV.** Fie matricea  $T = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

a) Să se calculeze  $TT^t$  și  $(T + iT)(T - iT)^*$ , unde cu  $A^*$  am notat matricea  $\bar{A}^t$ , oricare ar fi  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ .

b) Să se determine  $t \in [0, 2\pi)$  pentru care matricea  $T + iT$  are valori proprii reale.

c) Pentru ce valori ale lui  $t \in [0, 2\pi)$ , matricea  $T$  este diagonalizabilă în  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ?

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil electric, 2016-2017

**I.** Fie  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir crescător de numere reale mai mari decât 1, cu  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ .

Pentru  $\alpha > 0$ , să se arate că:

a) seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(a_n + (-1)^n)^\alpha}$  este convergentă dacă și numai dacă seria

$$\sum_{n \geq 0} \left( \frac{(-1)^n}{a_n^\alpha} - \frac{(-1)^n}{(a_n + (-1)^n)^\alpha} \right)$$

este convergentă;

b) seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(a_n + (-1)^n)^\alpha}$  este convergentă dacă și numai dacă seria  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{a_n^{\alpha+1}}$  este convergentă.

**II.** Fie  $a, b$  doi vectori necoliniari din spațiul  $V_3$ . Se consideră aplicația liniară

$$\varphi : V_3 \rightarrow V_3, \quad \varphi(v) = \langle v, a \rangle b + \langle v, b \rangle a, \quad \forall v \in V_3.$$

a) Determinați matricea asociată lui  $\varphi$  în raport cu baza  $B = \{a, b, a \times b\}$ .

b) Determinați o bază  $B_1$  a lui  $V_3$ , astfel încât matricea asociată lui  $\varphi$  în raport cu baza  $B_1$  să fie diagonală. Care este matricea de trecere de la baza  $B$  la baza  $B_1$ ? (S-a notat cu  $V_3$  spațiul vectorilor liberi. Pentru  $u, v \in V_3$ , s-a notat cu  $\langle u, v \rangle$  produsul scalar al vectorilor  $u, v$ , și cu  $u \times v$  produsul vectorial al vectorilor  $u, v$ ).

**III.** Considerăm funcția  $f : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = k(x^3 + y^3) + \ln(x + y).$$

a) Găsiți toate valorile reale ale lui  $k$  pentru care  $f$  are cel puțin un punct de extrem local.

- b) Arătați că dacă  $x, y \in \mathbb{R}$ , cu  $x + y > 0$ , atunci  $4(x^3 + y^3) \geq (x + y)^3$ .  
c) Pentru valorile lui  $k$  determinate la punctul a), studiați dacă  $f$  are puncte de extrem global (folosind eventual inegalitatea de la punctul b)).

**IV.** Fie  $V = \mathbb{R}_n[X]$ . Considerăm  $T, S$  două endomorfisme ale spațiului vectorial  $V$  (peste corpul  $\mathbb{R}$ ), astfel încât  $V = \text{Ker } T + \text{Ker } S = \text{Im } T + \text{Im } S$ .

- a) Să se arate că cele două sume sunt directe.  
b) Rămâne rezultatul adevărat pentru spațiul vectorial  $V = \mathbb{R}[X]$ ?

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2016-2017

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \left( x^2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, y^2 \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

- a) Să se studieze derivabilitatea (diferențialitatea) Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .  
b) Să se studieze continuitatea în  $(0, 0)$  a funcției definite prin matricea Jacobi a lui  $f$ .  
c) Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\|f(x, x)\|_2}$ , unde  $\|\cdot\|_2$  este norma euclidiană (uzuală) din  $\mathbb{R}^2$ .

**II.** a) Găsiți o formulă de recurență pentru familia de integrale  $J_{k,m} = \int_0^1 x^k (\ln x)^m dx$ ,  $k, m \in \mathbb{N}$ .

- b) Să se calculeze  $J_{n,n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .  
c) Folosind dezvoltarea în serie de puteri centrată în 0 a funcției  $e^x$ , găsiți o dezvoltare a funcției  $x^{-x}$ ,  $x > 0$ , într-o serie de funcții.  
d) Să se exprime  $\int_0^1 x^{-x} dx$  sub forma unei serii numerice.

**III.** Fie ecuația  $z = x + y \operatorname{arctg} z$ .

- a) Să se verifice ipotezele teoremei funcțiilor implice relativ la punctul  $(0, 2, 0)$  și să se deducă existența unei funcții  $z = z(x, y)$ .  
b) Să se calculeze gradientul funcției  $z$  în punctul  $(0, 2)$ .  
c) Să se calculeze  $\frac{\partial z}{\partial x}$  și  $\frac{\partial z}{\partial y}$ . Să se arate că  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial x} \operatorname{arctg} z$ .

**IV.** Fie matricea  $\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a^2 + b^2 > 0$ .

- a) Să se determine spectrul matricei  $A$ .  
b) Să se arate că matricea  $A$  este diagonalizabilă și să se aducă la forma diagonală.  
c) Să se calculeze  $A^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2017-2018

**I.** Considerăm sirul  $(x_n)_{n \geq 1}$ , cu  $x_1 < 0$  și  $x_{n+1} = e^{x_n} - 1$ , pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Studiați convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^{\alpha}$ , pentru  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**II.** Fie  $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  astfel încât  $A^2 = I_2$ ,  $\det B = -1$  și  $AB + BA = O_2$ . Să se arate că există  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , inversabilă, astfel încât

$$A = M \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} M^{-1} \quad \text{și} \quad B = M \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} M^{-1}.$$

**III.** Fie  $g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție descrescătoare, neconstantă, care se anulează în 1, este derivabilă și derivata sa este continuă pe  $[0; 1]$ . Fie  $\mathcal{F}$  clasa funcțiilor continue  $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , astfel încât  $\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq 1$ . Asociem fiecărei funcții  $f$  din  $\mathcal{F}$  funcția continuă

$$\tilde{f} : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt, & 0 < x \leq 1 \\ f(0), & x = 0. \end{cases}$$

Determinați valoarea minimă pe care o poate lua  $\max_{0 \leq x \leq 1} \tilde{f}(x)$ , când  $f$  parcurge clasa  $\mathcal{F}$ .

**IV.** Fie  $n \in \mathbb{N}$ . Se consideră aplicația  $\mathbb{R}$ -liniară  $f : \mathbb{R}_{2n+1}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n+1}[X]$ , cu

$$(f(P))(X) = XP(X) + (1 + X^2)P'(X) + XP(-X) + (1 - X^2)P'(-X), \quad \forall P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X].$$

- a) Arătați că  $f$  este bine definită și determinați matricea asociată lui  $f$  în raport cu baza  $B_1 := \{1, X, X^2, \dots, X^{2n+1}\}$ .
- b) Să se determine o bază  $B_2$  a lui  $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ , astfel încât matricea asociată lui  $f$  în raport cu baza  $B_2$  să fie diagonală. Care este matricea de trecere de la baza  $B_1$  la  $B_2$ ?

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2017-2018

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!(x^2+y^2)^{2k}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Să se studieze derivabilitatea (diferențialitatea) Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ ;
- b) Să se studieze continuitatea în  $(0, 0)$  a derivatelor partiale ale lui  $f$ ;
- c) Să se calculeze  $\lim_{\|(x,y)\|_2 \rightarrow \infty} f(x, y)$ , unde  $\|\cdot\|_2$  este norma euclidiană din  $\mathbb{R}^2$ .

**II.** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ .

- a) Arătați că funcția  $f$  verifică ecuația lui Laplace,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$ ;
- b) Studiați convergența punctuală și convergența uniformă pe intervalul  $[0, 1]$  a sirului de funcții  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , definit prin  $g_n(x) = nx(f(\sqrt{x}, \sqrt{n}, 1))^2$ ;

c) Să se afle un versor  $(\vec{v})$  normal la suprafața  $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$  în punctul  $M(1, 1, \sqrt{2})$  și să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial \nu}(M)$ .

**III.** Fie funcția  $f : \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = xy\sqrt{4 - x^2 - y^2}$ .

- a) Să se indice mulțimea  $D$  pe care funcția  $f$  este derivabilă Fréchet;
- b) Să se afle punctele critice din  $D$  ale lui  $f$ ;
- c) Să se studieze dacă acestea sunt puncte de extrem pentru funcția  $f$ .

**IV.** Se dau matricile  $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  din  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ . Definim  $\{A, B\} = AB + BA$ . Pentru fiecare  $k \in \overline{1, 3}$  se definește funcția

$$f_k : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C}), \quad f_k(M) = \{M, \sigma_k\}, \quad \forall M \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C}).$$

- a) Arătați că funcțiile  $f_k$  sunt endomorfisme ale C-spațiului vectorial  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ ;
- b) Aflați câte o bază și dimensiunea peste  $\mathbb{C}$  a nucleelor endomorfismelor  $f_k$ ;
- c) Studiați existența unei matrice  $M \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ , care să satisfacă simultan proprietățile  $M = M^*$ ,  $M^2 = I_2$ ,  $\{M, \sigma_\ell\} = O_2$ ,  $\forall \ell \in \overline{1, 3}$ , unde prin  $*$  s-a notat cunjugarea hermitică a matricelor ( $A^* = \overline{^t A}$ ).

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil electric, 2018-2019

**I.** a) Să se arate că

$$\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2},$$

pentru orice  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

b) Să se studieze natura seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \left( \frac{\pi}{2} \right)^\alpha - (\arctg n)^\alpha \right)$ , unde  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**II.** Fie  $f : \mathbb{R}_5[X] \rightarrow \mathbb{R}_5[X]$ , o aplicație liniară, astfel încât  $f(\mathbb{R}_1[X]) = \mathbb{R}$  și  $f(1) \neq 0$ . Se consideră aplicația liniară  $g : \mathbb{R}_5[X] \rightarrow \mathbb{R}_5[X]$ , definită prin

$$g(P(X)) = f(P''(X)) + X P'''(X), \quad \forall P(X) \in \mathbb{R}_5[X].$$

Presupunem că  $\text{Im } (g)$  nu este subspațiu vectorial al lui  $\text{Ker } (g)$  și  $\text{Ker } (g)$  nu este subspațiu vectorial al lui  $\text{Im } (g)$ . Să se determine  $\dim_{\mathbb{R}}(\text{Ker } (g))$  și  $\dim_{\mathbb{R}}(\text{Im } (g))$ .

(Amintim că  $\mathbb{R}_n[X] = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } P \leq n\}$ .)

**III.** Fie  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , o funcție. Dacă  $f \in C^2(0, \infty)$ ,  $f''$  este mărginită și  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , să se arate că  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ .

**IV.** a) Fie  $A \in \mathcal{M}_3([0, 1])$ . (Prin  $\mathcal{M}_3([0, 1])$  îmtelegem mulțimea matricelor  $3 \times 3$ , cu elemente în intervalul  $[0, 1]$ .) Să se arate că, pentru orice  $\lambda \in \mathbb{C}$ , valoare proprie a matricei  $A$ , avem  $|\lambda| \leq 3$ .

b) Să se determine toate matricele din  $\mathcal{M}_3([0, 1])$  care au cel puțin o valoare proprie  $\lambda \in \mathbb{C}$ , cu  $|\lambda| = 3$ . Să se arate că aceste matrice sunt diagonalizabile și să se diagonalizeze.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2018-2019

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)! (x^2 + y^2)^{2k}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Să se studieze derivabilitatea (diferențialitatea) Fréchet a funcției  $f$  în  $(0, 0)$ ;
- b) Să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}$ ;
- c) Să se studieze continuitatea în  $(0, 0)$  a derivatelor parțiale ale lui  $f$ .

**II.** Se consideră funcțiile  $f \in C^2(\mathbb{R}_+)$  și  $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u(x, y, z) = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ .

- a) Să se calculeze  $\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right)$  în funcție de  $f'(r)$ ;
- b) Pentru  $f(r) = r$ ,  $\forall r$ , să se calculeze  $\frac{\partial u}{\partial \nu}(M)$ , unde  $\nu$  este versor normal la suprafața  $S : x^2 + y^2 + z^2 = 9$  în punctul  $M(1, -2, 2)$ ;
- c) Să se găsească funcția  $f$  astfel încât

$$\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

**III.** Fie funcția  $f_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x, y) = x^3 + y^3 - nxy$ .

- a) Să se afle punctele staționare ale funcției  $f_n$ ;
- b) Să se studieze dacă acestea sunt puncte de extrem local pentru funcția  $f_n$ ;
- c) Dacă  $(x_n, y_n)$  este punct staționar al funcției  $f_n$ , cu  $\|(x_n, y_n)\|_2 = \sqrt{x_n^2 + y_n^2} \neq 0$ , să se discute convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\|(x_n, y_n)\|_2^\alpha}$  în funcție de  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**IV.** Se dă matricea  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  din  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ , cu proprietatea  $a + b = c + d$ .

- a) Să se arate că  $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  este vector propriu al matricei  $A$ ;
- b) Să se afle valorile proprii ale matricei  $A$ ;
- c) Să se arate că multimea

$$V = \{M \mid \det M = 0, M \text{ este de tipul matricei } A \text{ și are valorile proprii egale}\}$$

este subspațiu vectorial al  $\mathbb{R}$ -spațiului vectorial  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ;

- d) Să se afle o bază și dimensiunea peste  $\mathbb{R}$  a lui  $V$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2019-2020

**I.** a) Să se dezvolte în serie de puteri ale lui  $x$  funcția

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}).$$

b) Să se arate că seria  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n) \cdot (2n+1)}$  este absolut convergentă.

c) Folosind rezultatul obținut la a), să se calculeze suma seriei numerice de la punctul b).

**II.** Fie  $T$  și  $S$ , două endomorfisme ale unui spațiu vectorial de dimensiune finită,  $V$ , astfel încât  $V = \text{Ker } T + \text{Ker } S = \text{Im } T + \text{Im } S$ .

a) Să se arate că cele două sume sunt sume directe.

b) Rămâne rezultatul adevărat dacă  $V$  are dimensiune infinită?

**III.** Fie  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ , o aplicație  $\mathbb{R}$ -liniară, astfel încât

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(x_4, x_3, x_2, x_1),$$

pentru orice  $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ , și  $f(1, 2, 3, 4) = (1, 2, 3, 4)$ .

Fie  $(a, b, c, d) = f(1, 0, 0, 0)$ . Presupunem că  $a + d \neq b + c$  și  $a + d \neq b + c + 1$ .

Să se determine (în funcție de  $a, b, c, d$ ) o bază,  $B$ , a lui  $\mathbb{R}^4$  astfel încât matricea asociată lui  $f$  în raport cu baza  $B$  să fie diagonală.

**IV.** Fie  $(a_n)_{n \geq 1}$ , un sir strict crescător de numere naturale nenule, astfel încât

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{n-1}} = +\infty.$$

Să se arate că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  este convergentă și că suma acesteia este un număr irațional.

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2002-2003

**I.** Fie  $s_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  sirul de funcții definit prin

$$s_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{x}{k(k+1)} \right), & \text{pentru } x \neq 0 \\ 1 - \frac{1}{n+1}, & \text{pentru } x = 0. \end{cases}$$

a) Arătați că  $s_n$  sunt funcții continue.

b) Arătați că sirul  $(s_n)$  converge uniform pe  $[0, 1]$ .

c) Fie  $s : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  limita de la b). Evaluati

$$\frac{s(x) - s(0)}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2(n+1)^2}$$

și demonstrați că  $s$  este derivabilă în origine.

**II.** Fie  $a_0 \in (0, 1)$  și sirul  $a_n = \ln(1 + a_{n-1})$ ,  $n \geq 1$ .

a) Să se arate că  $a_n \rightarrow 0$  și să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2}$ .

b) Să se arate că  $\sum_{n \geq 0} a_n^2$  este convergentă.

**III.** a) Dați un exemplu de matrice nenula pătratică de ordinul doi cu proprietatea  $A^2 = 0$ .

b) Să se arate că dacă  $A$  este o matrice pătratica de ordinul  $n$  astfel incât  $A^n = 0$ , atunci matricea  $I_n - A$  este inversabilă. Determinați matricea  $(I_n - A)^{-1}$  în funcție de  $A$ .

**IV.** Fie  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un endomorfism (operator liniar) cu proprietatea că  $f^2 = f$ . Arătați că valorile proprii ale lui  $f$  sunt 0 și 1 și că subspațiile proprii corespunzătoare sunt  $\text{Ker } f$  și  $\text{Im } f$ .

b) Determinați  $\text{Im } f \cap \text{Ker } f$ ,  $\text{Im } f + \text{Ker } f$  și arătați că operatorul  $f$  admite o bază formată din vectori proprii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2002-2003

**I.** a) Să se arate că  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^\alpha} = 0, \forall \alpha > 0$ .

b) Fie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} e^{-1/(x^2+y^2)}, & \text{pentru } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{pentru } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Să se calculeze derivatele parțiale ale lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

c) Să se studieze diferențialitatea lui  $f$  în  $(0, 0)$ .

d) Folosind seria de puteri a funcției exponentiale să se calculeze cu 3 zecimale exacte  $\int_1^{100} f(x, 0) dx$ .

**II.** a) Să se găsească multimea din  $\mathbb{R}$  pe care converge seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ ; să se cerceteze convergența uniformă pe  $[0, 1]$ .

b) Să se calculeze  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$  pentru  $x$  în multimea de convergență.

c) Folosind  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ , să se calculeze suma seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)^2}$

d) Să se demonstreze convergența și să se calculeze integrala  $\int_0^1 \ln x \cdot \ln(1+x) dx$  folosind dezvoltarea în serii de puteri a funcției  $\ln(1+x)$  în jurul lui zero.

**III.** Fie matricea  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ .

a) Să se determine matricea  $A^n, n \in \mathbb{N}$ .

b) Știind că  $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, x \in \mathbb{R}$ , să se calculeze matricea  $e^A$ .

c) Să se afle valorile proprii ale matricei  $A^n$ .

d) Fie forma pătratică  $F_n(X) = X^t \cdot A^n \cdot X, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ . Să se afle valorile  $n \in \mathbb{N}$  pentru care  $F_n(X)$  este pozitiv definită.

**IV.** Fie  $V = M_2(\mathbb{R})$  spațiul vectorial al matricelor pătratice cu valori reale,  $2 \times 2$  și

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

baza canonica în  $V$ . Fie funcția  $T : V \rightarrow V$ , definită prin  $T(A) = A^t$ , unde  $A^t$  este transpusa matricei  $A, A \in V$ .

a) Să se arate că  $T$  este o aplicație liniară.

b) Se cere matricea atașată aplicației  $T$  în baza  $B$ .

c) Se cer valorile proprii și vectorii proprii pentru  $T$ .

d) Dacă  $W = \{A \in V \mid T(A) = A\}$ , să se găsească o bază în  $W$  și  $\dim_{\mathbb{R}} W$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2003-2004

**I.** Pentru  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$  fixat, fie seria de puteri

$$s_{\alpha}(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

a) Să se determine raza de convergență a seriei și să se calculeze suma  $s_{\alpha}(x)$ , observând eventual că  $(1+x)s_{\alpha}'(x) = \alpha \cdot s_{\alpha}(x)$ .

b) Să se calculeze coeficienții seriei pentru  $\alpha = -1/2$ .

c) Să se calculeze următoarea integrală:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 + a^2 \sin^2 x}}, \quad |a| < 1,$$

folosind dezvoltarea în serie de la punctul b).

**II.** Fie  $f_{ab} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_{ab}(x, y) = ax + by^2$ , unde  $a, b$  sunt parametri reali.

a) Pentru ce valori ale parametrilor  $a$  și  $b$ ,  $f_{ab}$  admite puncte de extrem local ? Discutați natura lor.

b) Studiați punctele de extrem ale lui  $f_{1,1}$ , condiționate de  $x^2 + y^2 - 1 = 0$ .

c) Pentru ce valori  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $f$  are exact două puncte de extrem condiționate de  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  ?

**III.** Fie spațiul vectorial  $\mathbb{R}^3$  cu produsul scalar obișnuit

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3, \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Fie

$$L = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, x_1 - x_2 = 0\}$$

un subspațiu vectorial. Notăm cu  $L^\perp = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in L\}$  subspațiu ortogonal corespunzător subspațiului  $L$ .

a) Arătați că orice element  $x$  din  $\mathbb{R}^3$  se poate scrie în mod unic sub forma  $x = z + y$ , unde  $z \in L$  și  $y \in L^\perp$ .

b) Notăm cu  $pr_L x$  elementul  $z$  provenit din descompunerea lui  $x$  de la punctul a). Definim aplicația liniară  $T(x) = 11 \cdot (x - pr_L x)$ . Determinați o bază de vectori în  $\text{Ker } T$ .

c) Este  $T$  izomorfism? Justificați.

d) Aduceți la forma canonica forma pătratică:

$$g(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 10x_2^2 - 6x_2x_3 + 2x_3^2.$$

**IV.** Fie  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  și  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  aplicația liniară care în baza canonica are matricea  $A$ .

a) Să se arate că  $\dim \text{Ker } T = 1$  dacă și numai dacă  $a = 2$ .

b) Pentru  $a = 2$  să se găsească o bază ortonormată în  $\text{Ker } T$  și una în  $\text{Im } T$ .

c) Dacă  $\lambda = 2$  este o valoare proprie pentru  $T$  și dacă  $B$  este matricea transformării  $T \circ T$ , atunci să se arate că forma pătratică  $g(x_1, x_2, x_3)$  având matricea  $B$  relativ la baza canonica, este pozitiv definită.

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2004-2005

**I.** Fie operatorii  $f_1, f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  care în baza canonica sunt dați respectiv de matricele :

$$[f_1] = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad [f_2] = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Să se determine valorile proprii ale celor doi operatori.
- b) Care dintre ei admite rădăcini pătrate? Justificați răspunsul.
- c) Pentru operatorul care admite rădăcini pătrate să se afle matricea uneia din rădăcini.

*Notă:* rădăcina pătrată a unui operator  $f$  înseamnă un operator  $g$  care îndeplinește condiția  $g \circ g = f$ .

**II.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot \int_0^x |\sin(u \cdot y)| du, & \text{pentru } xy \neq 0 \\ 0, & \text{pentru } xy = 0. \end{cases}$

- a) Să se arate că  $f$  este continuă în origine.
- b) Calculați derivatele parțiale în origine.
- c) Studiați diferențiabilitatea în origine.
- d) Să se arate că:  $\frac{2k}{k\pi + \frac{\pi}{2}} \leq f(x, y) \leq \frac{2k+1}{k\pi}$ ,  $k\pi \leq xy \leq k\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .
- e) Calculați  $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} f(x, y)$ .

**III.** Să se aducă la forma canonica și să se reprezinte grafic conica definită de ecuația

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0.$$

**IV.** a) Se consideră seria de funcții  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot e^{-x}$ . Să se arate că această serie nu converge uniform pe  $[0, \infty)$ .

- b) Să se arate că  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$ ,  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ .
- c) Se dă seria de funcții  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$ . Să se studieze convergența seriei pe intervalul  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .
- d) Să se calculeze  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} f(x) dx$ , unde  $f$  este suma seriei de la punctul c).

## Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2004-2005

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se scrie ecuațiile care caracterizează punctele staționare ale lui  $f$ .
- b) Să se determine  $a, b, c, d$  astfel încât punctul  $(-1, -2, 3)$  să fie punct de minim local și valoarea funcției în acest punct să fie 0.
- c) Să se scrie  $f(x, y, z)$  în funcție de puterile lui  $(x+1), (y+2)$  și  $(z-3)$ , coeficienții  $a, b, c, d$  fiind determinați la punctul b).
- d) i) Să se verifice condițiile teoremei funcțiilor implice pentru ecuația  $f(x, y, z) - 1 = 0$  relativ la punctul  $(-1, -2, 2)$  și să se arate că există o funcție definită implicit  $z = z(x, y)$  în vecinătatea punctului  $(-1, -2)$  a.î.  $z(-1, -2) = 2$ .
- ii) Să se calculeze  $dz(-1, -2)$ .
- iii) Să se calculeze  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(-1, -2)$ .

**II.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \cos(x + y) - x$ .

- a) Să se calculeze  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ .
- b) Să se calculeze  $\int_0^{2\pi} \left( \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)^2 \right) dx$ .
- c) Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $\mathbb{C}^2$ ,  $u = \frac{\partial f}{\partial x}, v = \frac{\partial f}{\partial y}$ . Presupunem că
  - (i)  $u(x + 2\pi, y) = u(x, y)$ ;
  - (ii)  $v(x + 2\pi, y) = v(x, y)$ ;
  - (iii)  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ , pe  $\mathbb{R}^2$ .

Fie integrala cu parametrul  $y \in \mathbb{R}$ , dată de  $E(y) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (u^2(x, y) + v^2(x, y)) dx$ .

- a) Să se calculeze  $E(y)$ .
- b) Integrând prin părți să se deducă că  $E(y) = 0$ ,  $\forall y \in \mathbb{R}$ .

**III.** Fie  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  spațiul vectorial al matricelor pătratice cu valori reale și  $V$  subspațiul matricelor simetrice din  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Fie aplicațiile liniare  $T : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $f : V \rightarrow V$  definite de relațiile:  $T(A) = a_{11} + a_{22}$ , unde  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ , iar  $f(B) = \begin{pmatrix} a & T(B) \\ T(B) & b \end{pmatrix}$ , unde  $B = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$ .

- a) Să se descrie  $\text{Ker } T$ ,  $\text{Im } T$  și să se verifice relația:  

$$\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$
.
- b) Să se arate că  $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{O\}$  și  $\text{Ker } f + \text{Im } f = V$ .
- c) Se cere matricea transformării  $g = \underbrace{f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{2005 \text{ ori}}$  în baza

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

a spațiului vectorial  $V$ .

**IV.** Fie  $P_3 = \{P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ , spațiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult trei. Fie subspațiile vectoriale:

$$L_1 = \{P(x) \in P_3 \mid P(1) = P(-1) = 0\} \text{ și } L_2 = \{P(x) \in P_3 \mid P(2) = P(-2)\},$$

subspații vectoriale în  $P_3$ .

a) Să se determine câte o bază în  $L_1$  și  $L_2$  și să se calculeze  $\dim(L_1 + L_2)$  și  $\dim(L_1 \cap L_2)$ .

b) Considerând pe  $P_3$  produsul scalar:  $\langle P(x), Q(x) \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ , unde

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3, \quad Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3,$$

determinați o bază în

$$L_2^\perp = \{R(x) \in P_3 \mid \langle R(x), Q(x) \rangle = 0, \forall Q(x) \in L_2\}$$

și arătați că  $L_1 + L_2^\perp$  nu poate să fie egală cu  $P_3$ .

c) Fie  $L'_2 = \{P(x) \in P_3 \mid P(2) = P(-2) = 0\}$ . Calculați  $\dim(L_1 + (L'_2)^\perp)$ . Ce se poate spune despre egalitatea  $L_1 + (L'_2)^\perp = P_3$ ? (Justificare).

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2005-2006

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{(2n\pi, 1), ((2n+1)\pi, -1)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, \alpha) = \frac{\alpha \cdot \sin x}{1 - 2\alpha \cdot \cos x + \alpha^2}$ .

a) Să se determine coeficienții  $a_n = a_n(x)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , astfel încât

$$f(x, \alpha) = \sum_{n \geq 0} a_n(x) \cdot \alpha^n, \quad |\alpha| < 1.$$

b) Să se calculeze  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cdot \sin kx \, dx$ , unde  $k, n \in \mathbb{N}$ .

c) Să se calculeze  $I_n(\alpha) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x, \alpha) \cdot \sin nx \, dx$ ,  $|\alpha| < 1$ .

**II.** Se consideră  $F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left( \frac{1 + a \cdot \cos x}{1 - a \cdot \cos x} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} \, dx$ ,  $|a| < 1$ .

a) Să se arate că  $F$  este derivabilă și să se calculeze  $F'$ .

b) Să se calculeze  $F$ .

**III.** Fie forma pătratica  $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q(u) = \sum_{k,l=1}^4 s_{k+l-2} \cdot u_k \cdot u_l$ , unde

$$s_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n + x_4^n, \quad n \in \overline{0, 6},$$

iar  $x_1, x_2, x_3, x_4$  sunt rădăcinile ecuației  $x^4 - 4x^3 - 4x - 8 = 0$ . Fiecarei rădăcini  $x_j$ ,  $j = \overline{1, 4}$  îi asociem forma liniară  $l_j(u) = u_1 + x_j \cdot u_2 + x_j^2 \cdot u_3 + x_j^3 \cdot u_4$ . Arătați că:

a) La rădăcini  $x_j$  distințe corespund forme  $l_j$  liniar independente.

b) Forma pătratică  $Q$  se poate exprima astfel:  $Q(u) = \sum_{j=1}^4 l_j^2$ .

c) Forma pătratică  $Q$  are signatura (3,1).

**IV.** Fie  $A \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $n = 2k + 1$ , o matrice antisimetrică.

a) Să se arate că  $\lambda = 0$  este o valoare proprie.

b) Arătați că originea planului complex este centru de simetrie pentru mulțimea valorilor proprii ale matricei.

c) Oricare două matrice antisimetrice  $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ ,  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij})$ ,  $a_{ij}, b_{ij} \in \{\pm 1\}$ ,  $\forall i < j$ , au aceleasi valori proprii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2005-2006

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^4 + y^4}, & \text{pentru } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{pentru } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Să se studieze continuitatea funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .

b) Să se calculeze derivatele partiale ale funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .

c) Să se studieze diferențiabilitatea funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .

d) Să se stabilească natura seriei numerice  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}, n\right)$ .

**II.** Fie  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(2x) dx$ , și  $J_n = \int_a^b (x-a)^n \cdot (b-x)^n dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

a) Să se calculeze  $I_n$ .

b) Să se calculeze  $J_n$ .

c) Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{J_n}$ .

**III.** a) Fie  $F = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$ . Să se arate că  $F$  este o bază de vectori în  $\mathbb{R}^3$  și să se găsească coordonatele vectorului  $v = (1, 2, 3)$  în baza  $F$ .

b) Fie  $T_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , transformarea liniară a cărei matrice în baza  $F$  este matricea

$$A_m = \begin{pmatrix} 0 & 1 & m \\ 1 & 0 & 1 \\ m & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se cere  $T_m(v)$ , unde  $v = (1, 2, 3)$ .

c) Pentru  $m = 0$ , să se diagonalizeze matricea  $A_0$  și să se calculeze  $A_0^{2006}$ .

**IV.** Fie spațiul vectorial  $V = \mathbb{R}^3$  și funcția  $g = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin:

$$g(X, Y) = x_1y_1 + \frac{1}{2}(x_1y_2 + x_2y_1) + x_2y_2 + x_3y_3,$$

unde  $X = (x_1, x_2, x_3)$  și  $Y = (y_1, y_2, y_3)$  sunt vectori din  $V$ .

a) Să se arate că  $g$  este un produs scalar pe  $V$ .

b) Să se ortogonalizeze baza  $E = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  față de produsul scalar  $g$ .

c) Să se calculeze cosinusul unghiului dintre vectorii  $e_1 = (1, 0, 0)$  și  $e_2 = (0, 1, 0)$  din  $V$  față de produsul scalar  $g$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil cercetare, 2007-2008

**I.** Fie matricea  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Să se arate că  $A$  este nilpotentă dacă și numai dacă  $\text{tr}(A^k) = 0$ , oricare ar fi  $k > 0$ ; ( $\text{tr}(A)$  este urma matricei  $A$ ).

**II.** Fie  $E$  o submulțime nevidă a intervalului  $(0, +\infty)$  care îndeplinește condițiile

- i)  $\frac{x}{2} \in E$  oricare ar fi  $x \in E$ .
- ii)  $\sqrt{x^2 + y^2} \in E$ , oricare ar fi  $x, y \in E$ .

Se cer următoarele:

- a) Dați un exemplu de mulțime  $E \neq (0, \infty)$  care îndeplinește condițiile i) și ii).
- b) Arătați că  $\bar{E} = [0, \infty)$ ; ( $\bar{E}$  este închiderea topologică a lui  $E$ ).

**III.** Fie  $U \subset \mathbb{R}^2$  o submulțime deschisă care conține discul unitate închis  $D$  și  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^1$  cu proprietatea că:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(P) \right| \leq 1 \quad \text{și} \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(P) \right| \leq 1, \quad \forall P \in D.$$

Să se arate că dacă  $\{M_1, M_2, \dots, M_n\}$  este o mulțime de puncte din  $D$  cu centrul de greutate în  $O$  atunci pentru orice punct  $P \in D$  este adevărată inegalitatea:

$$\left| f(P) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(M_k) \right| \leq 2.$$

**IV.** Fie  $\Delta$  mulțimea plană formată din punctele interioare și laturile unui dreptunghi  $ABCD$  de laturi  $AB = a$  și  $BC = b$ . Se definește funcția  $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  prin:

$$f(P) = PA + PB + PC + PD.$$

Să se calculeze mulțimea valorilor funcției  $f$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil electric, 2007-2008

**I. a)** Să se precizeze clasa de diferențiabilitate a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \left[ x + \frac{1}{2} \right] - [2x] + [x],$$

unde  $[ \cdot ]$  reprezintă partea întreagă a expresiei pe care o conține.

b) Pentru orice  $n \in \mathbb{N}$  fie funcțiile  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \left[ \frac{x + 2^n}{2^{n+1}} \right]$ ,  $n \geq 0$ . Să se

studieze convergența seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ .

c) Să se stabilească dacă funcțiile diferențiabile pot fi aproximate oricât de bine prin funcții discontinue.

**II.** Fie  $V$  spațiu vectorial din  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  generat de matricile de forma  $AB - BA$ ,  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Să se arate că  $\dim_{\mathbb{C}} V = n^2 - 1$ .

**III.** În spațiul real  $V = \mathbb{R}^3$  se consideră forma pătratică

$$\varphi(x, x) = \xi_1^2 + 2\xi_2^2 + 3\xi_3^2 + \xi_1\xi_2 + \xi_1\xi_3 + \xi_2\xi_3,$$

în care  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  sunt coordonatele vectorului  $x \in V$  în baza canonica  $\{e_1, e_2, e_3\}$ . Se cer

a) Să se arate că forma biliniară simetrică asociată acestei forme pătratice este un produs scalar.

b) Să se afle normele vectorilor  $e_1, e_2, e_3$  și  $\cos(\widehat{e_1, e_2})$  (în raport cu produsul scalar definit la punctul a)).

**IV.** Funcțiile  $f, f', f''$  sunt continue pe  $[0, a]$ ,  $a \geq 0$  și  $f(0) = f'(0) = 0$ . Să se arate că

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \leq \frac{a^2}{2} \int_0^a (f''(x))^2 dx.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2007-2008

**I.** Fie sfera :  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ , planul  $(H) : x + y + z - 3 = 0$  și cercul spațial  $(C) = (S) \cap (H)$ .

a) Să se afle raza și coordonatele centrului cercului  $(C)$ .

b) Să se arate că orice sferă care conține efectiv cercul  $(C)$ , are ecuația de forma:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 9 + \lambda(x + y + z - 3) = 0.$$

c) Să se găsească ecuația sferei de rază  $R = 6$ , care conține cercul  $(C)$ .

d) Să se dea exemplu de o cuadrică care conține cercul  $(C)$  și de o sferă care nu conține cercul  $(C)$ .

**II.** Să se arate că ecuația  $X^2 + aX + bI_3 = 0_3$ , unde  $a^2 - 4b \geq 0$ , admite o infinitate de rădăcini în  $M_3(\mathbb{R})$ . (Căutați matrice de formă particulară).

**III.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & \text{pentru } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{pentru } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Să se studieze continuitatea, existența derivatelor partiale și diferențiabilitatea funcției  $f$  în origine.

b) Să se calculeze  $I_n = \int_0^{\pi/2} \left[ f\left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}\right) \right]^n dt$ , pentru  $n = 2k$  și  $n = 2k + 1$ .

c) Să se arate că sirul de funcții  $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definit prin  $g_n(x) = \frac{1}{2n} \cdot f(x^2, n)$  este uniform convergent pe  $\mathbb{R}$  către o funcție continuă  $g$  și să se calculeze  $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ .

**IV.** Să se studieze natura seriei:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n^{\beta} \cdot \sin \frac{1}{n}}$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil cercetare, 2008-2009

**I.** Fie  $(x_n)_n$  un sir monoton crescător și divergent de numere reale strict pozitive și  $\alpha \leq 1$ . Arătați că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n} \right)^{\alpha}$  este divergentă.

**II.** Considerăm hiperboloidul cu o pânză, în reperul cartezian  $Oxyz$ :

$$(\mathcal{H}) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Știind că există punctele  $M, N, P \in \mathcal{H}$  astfel încât vectorii  $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}, \overrightarrow{OP}$  sunt mutual ortogonali, demonstrați că  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} > \frac{1}{c^2}$ .

**III.** Demonstrați că oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  și numerele strict pozitive  $x_1, x_2, \dots, x_n$  cu  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ , avem

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k}{1 + k(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)} < \frac{\pi}{4},$$

iar constanta din dreapta este cea mai mică cu această proprietate.

**IV.** Fie  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  cu  $A \neq I_n$  și  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $k \geq 3$  astfel încât  $\hat{A} = \hat{I}_n$  în  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}_k)$ . Arătați că pentru orice  $p \in \mathbb{N}^*$  avem  $A^p \neq I_n$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil electric, 2008-2009

- I.** Fie  $a_n$  un sir de numere reale astfel încât seria  $\sum_{n \geq 0} a_n$  are raza de convergență 1 și fie  $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ ,  $x \in (-1, 1)$ . Presupunem că există  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$ .
- Dacă  $a_n \geq 0$  să se demonstreze că seria  $\sum_{n \geq 0} a_n$  este convergentă și are suma  $L$ .
  - Să se dea un exemplu de serie  $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$  ca în enunț, cu  $a_n \in \mathbb{R}$ , astfel încât  $\sum_{n \geq 0} a_n$  diverge.

**II.** Fie  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  și fie  $f_0 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă cu proprietatea  $f_0(a) = 0$ . Fie

$$f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t) dt, \quad n \geq 1.$$

- Să se studieze convergența uniformă a seriei  $\sum_{n \geq 1} f_n$ .
- să se calculeze suma seriei  $\sum_{n \geq 1} f_n$ .

**III.** Fie  $P_1, \dots, P_n$  ( $n \geq 3$ )  $n$  puncte distințe aflate pe aceeași circumferință (în această ordine). Pentru fiecare pereche de puncte  $P_i, P_j$ , notăm cu  $a_{ij}$  lungimea segmentului  $P_i P_j$  dacă  $i \leq j$  și  $a_{ji} = -a_{ij}$ . Considerăm matricea (antisimetrică)  $A = [a_{ij}]$ . Să se determine dimensiunile imaginii și nucleului aplicației liniare  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , asociate acestei matrice.

**IV.** Fie  $A, B$  matrice pătratice din  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  cu proprietățile că există o coloană nenulă  $x$  din  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  astfel încât  $Ax = 0$  și o coloană  $y$  din  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  astfel încât  $Ay = Bx$ . Dacă  $A_i$  este matricea obținută prin înlocuirea în  $A$  a coloanei  $i$ ,  $a_i$ , prin coloana  $i$ ,  $b_i$ , din  $B$ , să se arate că  $\det A_1 + \dots + \det A_n = 0$ , unde  $\det A_i$  este determinantul matricei  $A_i$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2008-2009

- I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} x^3 \cos \frac{y}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ .

- Să se calculeze derivatele parțiale ale lui  $f$  în  $(0, y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .
- Să se studieze diferențiabilitatea Fréchet a lui  $f$  în  $(0, y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .

- c) Să se studieze continuitatea derivatelor parțiale ale lui  $f$  în  $(0, y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .  
d) Fie  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  și  $g(x, y, z) = f(r, 1)$ . Să se calculeze grad  $g$ .

**II.** Fie  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{x^2/2} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt$ .

- a) Folosind, eventual, schimbarea de variabilă  $t = x + s$ , să se arate că  $0 < xf(x) < 1$ ,  $\forall x > 0$ .  
b) Să se calculeze  $f'(x)$ .  
c) Să se arate că  $f'(x) < 0$   $\forall x > 0$ .  
d) Folosind, eventual, rezultatul  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ , să se calculeze  $f(0)$ .

**III.** a) Să se găsească o transformare liniară  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  astfel încât

$$f(e_1) = (4, 3, 3), f(e_2) = (6, -5, -6), f(e_3) = (0, 0, 1),$$

unde  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0)$ ,  $e_3 = (0, 0, 1)$ .

- b) Să se arate că există  $n$  număr natural și  $a_0, a_1, \dots, a_n$  numere reale astfel încât

$$a_n f^n(x) + a_{n-1} f^{n-1}(x) + \dots + a_1 f(x) + a_0 x = 0$$

pentru orice  $x \in \mathbb{R}^3$ , unde  $f^k(x) = f(f^{k-1}(x))$ ,  $k \geq 2$ . Să se găsească  $n$  și  $a_0, a_1, \dots, a_n$ .

- c) Să se găsească un subspațiu vectorial  $U$  al lui  $\mathbb{R}^3$  astfel încât  $\dim U=1$  și  $f(u) = u$  pentru orice  $u \in U$ .

**IV.** Se dă familia de sfere

$$S_\lambda : x^2 + y^2 + z^2 - 4(\lambda + 1)x - 2(3\lambda - 2)y + 2(\lambda - 5)z - 14\lambda + 33 = 0 \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- a) Să se precizeze centrul și raza sferei  $S_\lambda$ .  
b) Să se arate că centrele sferelor  $S_\lambda$  se află pe o dreaptă. Să se afle ecuația acestei drepte.  
c) Să se găsească un plan care să fie tangent tuturor sferelor din familia dată.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”**  
Faza națională, anul I, profil cercetare, 2009-2010

**I.** Fie  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție cu proprietatea  $f(aX + bY) = af(x) + bf(Y)$ , pentru orice  $a, b \in \mathbb{R}$  și orice  $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- a) Să se arate că există o matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  astfel ca

$$f(X) = Tr(AX), \text{ pentru orice } X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

- b) Să se arate că există o matrice inversabilă  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  astfel ca  $f(B) = 0$ .

**II.** Găsiți locul geometric descris de centrul unei elipse, care este tangentă la două drepte perpendiculare date.

**III.** a) Să se justifice faptul că  $f(x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{x-n} + \frac{1}{x+n} \right)$  definește o funcție continuă  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ .

b) Dacă funcția continuă  $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  verifică

$$F\left(\frac{x}{2}\right) + F\left(\frac{x+1}{2}\right) = 2F(x), \quad \forall x \in [0, 1],$$

atunci  $F$  este constantă.

c) Să se demonstreze egalitatea:

$$\pi \operatorname{ctg}(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{x-n} + \frac{1}{x+n} \right), \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}.$$

**IV.** Fie  $f_n \in C([0, 1])$  ( $n \geq 1$ ) un sir de funcții concave. Presupunem că  $f_n$  converge simplu la 0. Să se arate că sirul  $f_n$  este uniform convergent pe  $[0, 1]$ .

#### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil electric, 2009-2010

**I.** Găsiți funcțiile continue  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$  cu proprietatea  $f(x) = 2 \int_0^x \sqrt{f(t)} dt$ .

**II.** Fie  $f$  o funcție care admite o dezvoltare în serie de puteri în jurul lui 0 având raza de convergență  $R$ .

a) Să se arate că

$$\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \left( e^x - 1 - \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \dots - \frac{x^n}{n!} \right) = \int_0^x e^{x-t} f(t) dt, \quad |x| < R.$$

b) Să se arate că

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( e^x - 1 - \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - \dots - \frac{x^n}{n!} \right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

**III.** Fie  $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$  un vector nenul fixat și  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $T(\vec{v}) = \vec{a} \times \vec{v}$ ,  $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ .

a) Să se arate că  $T$  este o aplicație liniară și să se determine subspațiile  $\operatorname{Ker} T$  și  $\operatorname{Im} T$ .

b) Să se arate că pentru orice  $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \operatorname{Im} T$ , unghiurile  $\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}$  și  $\widehat{T(\vec{v}_1), T(\vec{v}_2)}$  sunt egale.

c) Să se determine toate aplicațiile liniare  $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  cu proprietatea  $S(\vec{v}) \perp \vec{v}$ ,  $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ .

**IV.** Fie  $\mathbb{V}$  un spațiu vectorial real de dimensiune  $n$  și  $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  o aplicație liniară care admite  $n + 1$  vectori proprii astfel că oricare  $n$  dintre ei sunt liniar independenți. Să se arate că există  $\alpha \in \mathbb{R}$  astfel încât  $T = \alpha I$ , unde  $I$  este aplicația identică.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2009-2010

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^a |y|^b}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

unde  $a \geq \frac{1}{2}, b \geq \frac{1}{2}$  sunt doi parametri reali.

a) Demonstrați inegalitatea

$$\frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

b) Studiați continuitatea funcției  $f$  în origine.

c) Studiați existența derivatelor parțiale ale funcției  $f$  în origine.

d) Pentru  $a = 4$  și  $b = 1$  să se găsească mulțimea de convergență a seriei de funcții

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}, n\right) (x+1)^n.$$

**II.** Fie funcția  $I : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I(y) = \int_0^{\infty} e^{-(x+\frac{y}{x})^2} dx$ .

a) Arătați că  $I(y)$  este convergentă pentru orice  $y \in [0, \infty)$ .

b) Determinați  $I'(y)$  și arătați că  $I'(y) = -4I(y)$ .

c) Știind că  $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , să se calculeze  $I(y)$ .

**III.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definită prin

$$T((x_1, x_2, x_3)) = (2x_2 - x_3, -2x_1 + 2x_3, x_1 - 2x_2), \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

a) Să se arate că  $T$  este aplicație liniară și să se calculeze  $\text{Ker } T$  și  $\text{Im } T$ .

b) Să se arate că dacă  $u, v \in \text{Im } T$ , atunci unghiul dintre  $u$  și  $v$  este egal cu unghiul dintre  $T(u)$  și  $T(v)$ .

c) Fie matricea  $Q = (I_3 - A)(I_3 + A)^{-1}$ , unde  $A$  este matricea transformării  $T$  în baza canonica din  $\mathbb{R}^3$ . Determinați valorile proprii reale ale matricii  $Q$  și subspațiile proprii corespunzătoare.

**IV.** Se consideră planul  $\pi$  de ecuație  $(2m+1)x + (3-4m)y + 3z - 2 = 0$ .

- a) Să se scrie ecuațiile planelor  $\pi_1$ ,  $\pi_2$  și  $\pi_3$  care sunt perpendiculare pe planul  $\pi$  și conțin respectiv axele  $Ox$ ,  $Oy$  și  $Oz$ .
- b) Să se arate că cele trei plane de la punctul a) trec printr-o dreaptă  $\Delta$ , a cărei ecuație se cere.
- c) Să se arate că dreapta  $\Delta$  descrie un plan atunci când  $m$  variază.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2010-2011

**I.** Fie funcția  $f \in C^2(\mathbb{R})$  astfel încât  $|f(x)| \leq 1$  și  $|f''(x)| \leq 1$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) Scrieți formula lui Taylor de ordinul doi pentru funcția  $g(t) = 1 - f(x + t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , în jurul unui punct  $t_0$  arbitrar ( $x \in \mathbb{R}$  fixat).
- b) Să se demonstreze că  $|f'(x)| \leq \sqrt{2}$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

**II.** Găsiți cea mai mare valoare a integralei

$$\int_0^y \sqrt{x^4 + (y - y^2)^2} dx, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

**III.** Se consideră spațiile euclidiene  $\mathbb{R}^2$  și  $\mathbb{C}^2$  cu produsele scalare

$$\langle (x, y), (u, v) \rangle = x \cdot u + y \cdot v, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

respectiv

$$\langle (x, y), (u, v) \rangle = x \cdot \bar{u} + y \cdot \bar{v}, \quad (x, y) \in \mathbb{C}^2, \quad (u, v) \in \mathbb{C}^2.$$

Să se determine aplicațiile liniare  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  și  $S : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ , care satisfac respectiv proprietățile

$$\langle T(x, y), (x, y) \rangle = 0, \quad \text{pentru orice } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

$$\langle S(u, v), (u, v) \rangle = 0, \quad \text{pentru orice } (u, v) \in \mathbb{C}^2.$$

**IV.** Fie  $n \geq 2$ ,  $A \in M_n(\mathbb{R})$  o matrice simetrică ( $A^t = A$ ) astfel încât

$$(tr(A^{2010}))^{2011} = (tr(A^{2011}))^{2010}.$$

Să se arate că are loc egalitatea  $A^n = tr(A) \cdot A^{n-1}$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2010-2011

**I.** În  $\mathbb{R}^3$  se consideră transformarea liniară, pentru  $a$  real fixat,

$$T_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T_a(x, y, z) = \left( x, ax + y, \frac{a^2}{2}x + ay + z \right).$$

- a) Se cere matricea  $M_a$  a lui  $T_a$  în baza canonica din  $\mathbb{R}^3$ . Să să se determine nucleul și imaginea transformării.
- b) Să se afle valorile și vectorii proprii pentru  $M_a$ . Stabiliți dacă matricea este diagonalizabilă.
- c) Arătați că  $M_a M_b = M_{a+b}$  și calculați  $M_a^n$  și  $M_a^{-1}$ .
- d) Să se studieze convergența și să se afle (dacă există) limita sirului  $(S_n)$ , în care

$$S_n = I_3 + \frac{1}{1!}M_a + \frac{1}{2!}M_a^2 + \dots + \frac{1}{n!}M_a^n.$$

**II.** Se consideră dreapta de ecuații  $d_1 : \frac{x-a}{1} = \frac{y+2}{b} = \frac{z-a+b}{3}$  și planele

$$(P_1) : x + y + z - 4 = 0,$$

$$(P_2) : x + 2y + 2z + 1 = 0,$$

$$(P_3) : x + 7y + 7z + m = 0,$$

unde  $a, b, m \in \mathbb{R}$ .

- a) Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  știind că dreapta  $d_1$  este inclusă în planul  $(P_1)$ .
- b) Să se găsească proiecția punctului  $A = (1, -2, 2)$  pe planul  $(P_2)$ .
- c) Să se discute poziția relativă a celor trei plane în funcție de  $m$ .

**III.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Să se studieze continuitatea și diferențialitatea funcției  $f$  în origine.

b) Să se calculeze  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  și  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  în  $(0, 0)$ .

c) Se consideră sirul de funcții  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \begin{cases} \frac{n^2}{x} f\left(x, \frac{1}{n}\right), & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  și să se precizeze dacă sirul  $f_n$  converge uniform pe  $\mathbb{R}$ .

**IV.** Fie seria de puteri  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n}$ .

- a) Să se afle multimea de convergență a seriei și să se calculeze suma ei.
- b) Discutați convergența uniformă a seriei.

c) Să se calculeze  $I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \ln(1 + 3x^2) dx$  și să se arate că are loc egalitatea

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n(2n+1)} = \ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2.$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil teoretic, 2011-2012**

**I.** Fie  $n \geq 2$  număr natural și  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  două matrice cu proprietățile

$$A^{2012} = B^{2011} = I_n \text{ și } AB = BA.$$

Să se arate că matricile  $A \pm B \pm I_n$  sunt inversabile pentru orice alegere a semnelor  $+$  și  $-$ .

**II.** Fie  $X = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \{0, 1\}$  pentru orice  $i \in \{1, \dots, n\}$  și  $A \subset X$  mulțimea  $n$ -uplurilor care au un număr impar de 1. Determinați numărul maxim de elemente din  $A$  c proprietatea că oricare două dintre ele au în comun un număr par de 1.

**III.** a) Fie  $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$  o funcție bijectivă. Să se arate că seria  $\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)^n}{n!}$  este divergentă.

b) Să se arate că există o funcție bijectivă  $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}$  cu proprietatea că seria  $\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)^n}{n!}$  este convergentă.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil electric, 2011-2012**

**I.** Fie  $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  două funcții continue și fie produsul scalar  $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ . Găsiți polinomul de forma  $p(x) = a + b \cdot x^2 - x^4$ , care este ortogonal pe intervalul  $[-1, 1]$  pe toate polinoamele de grad mai mic sau egal decât 3.

**II.** Fie aplicația

$$T_\alpha : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), T_\alpha(A) = A + \alpha A^t, \forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

a) Să se arate că  $T_\alpha$  este o transformare liniară.

b) Să se scrie matricea lui  $T_\alpha$  în raport cu baza canonică din  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

c) Să se calculeze polinomul caracteristic.

d) Să se determine valorile lui  $\alpha$  pentru care  $T_\alpha$  este diagonalizabilă și să se determine o bază formată din vectori proprii.

**III.** În ce condiții integrala  $\int_0^\infty \left( a^{1/x} + \frac{b^{1/x} + c^{1/x}}{2} \right) dx$ , unde  $a, b, c > 0$ , converge absolut?

**IV.** Se consideră sirul de numere reale  $(x_n)_{n \geq 1}$  definit prin  $x_1 \in (0, 1)$ ,  $x_{n+1} = x_n \cdot \sqrt{1 - x_n^2}$ , pentru orice număr natural  $n \geq 1$ .

a) Să se arate că sirul  $(x_n)_{n \geq 1}$  este convergent și să se determine limita sa.

- b) Să se arate că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  este divergentă.
- c) Să se arate că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^3$  este convergentă.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2011-2012

**I.** a) În spațiul liniar  $\mathbb{R}^3$  se consideră  $M_0(a + c - \frac{b}{2}, a - \frac{c}{2}, -\frac{a}{2})$  și dreapta  $(d) : \frac{x-b}{b} = \frac{y-c}{c} = \frac{z-a}{a}$ . Determinați ecuația planului ce trece prin  $M_0$  și este perpendicular pe dreapta  $(d)$ .

b) Fie  $M(a, b, c)$  și planul  $(\pi) : bX + cY + aZ + \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) = 0$ . Definim aplicația  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , care duce punctul  $M$  în simetricul său față de planul  $(\pi)$ . Arătați că  $f$  este o transformare liniară.

c) Determinați defectul și rangul transformării  $f$ .

**II.** Fie  $B_m = \{(1+m, 2, 2), (2, 1+m, 2), (2, 2, 1+m)\}$  un sistem de vectori din  $\mathbb{R}^3$ . Determinați valorile lui  $m$  pentru care  $B_m$  constituie bază în  $\mathbb{R}^3$ . Determinați coordonatele vectorului  $v = (2, -8, 2)$  în baza  $B_{-1}$ , ( $m = -1$ ).

b) Fie  $\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  forma biliniară a cărei matrice în perechea de baze canonice este  $B_m = \begin{pmatrix} 1+m & 2 & 2 \\ 2 & 1+m & 2 \\ 2 & 2 & 1+m \end{pmatrix}$ . Să se scrie forma pătratică asociată și să se determine natura și genul pentru  $m = 1$ .

c) Să se calculeze  $B_0^{2012}$ .

**III.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2ye^{2x+3y}$ .

a) Să se determine punctele de extrem local ale funcției  $f$ .

b) Să se arate că există  $r > 0$  astfel ca pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$  satisfăcând relația  $(x+1)^2 + (y + \frac{1}{3})^2 < r^2$  să avem  $x^2ye^{2x+3y} + \frac{1}{3e^3} \geq 0$ .

c) Să se arate că funcția nu admite extreme globale.

**IV.** Fie  $(a_n)_{n \geq 1}$  o progresie aritmetică cu termeni strict pozitivi.

a) Să se demonstreze inegalitatea:  $\frac{a_1 \cdot a_3 \cdots a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdots a_{2n}} < \sqrt{\frac{a_1}{a_{2n+1}}}, \forall n \geq 1$ .

b) Să se determine suma seriei:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 \cdot a_3 \cdots a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdots a_{2n}} \cdot \frac{1}{a_{2n+2}}$ .

c) Studiați convergența seriei:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 \cdot a_3 \cdots a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdots a_{2n}}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil teoretic, 2012-2013

**I.** Fie  $A \in M_n(\mathbb{C})$  o matrice,  $\lambda$  o valoare proprie a matricei  $A^n$  și  $v$  un vector propriu corespunzător. Să se arate că dacă vectorii  $v, AV, A^2v, \dots, A^{n-1}v$  sunt liniar independenți, atunci  $A^n = \lambda I_n$ .

**II.** Să se determine funcțiile continue  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  cu proprietatea că pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$  pentru care  $x - y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , avem  $f(x) - f(y) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

**III.** Fie  $k \in \mathbb{N}^*$ . Demonstrați că valoarea minimă a lui  $n \in \mathbb{N}^*$  pentru care există o matrice  $A \in M_n(\mathbb{Q})$  cu proprietatea  $A^{2^k} = -I_n$  este  $2^k$ .

**IV.** Să se demonstreze că  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \int_0^1 \frac{n^2 x^2 - [nx]^2}{(1+x^2)(1+[nx]^2)} dx = 1$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil electric, 2012-2013

**I.** Punctele  $M_1$  și  $M_2$  se mișcă rectiliniu și uniform pornind din  $A_1(0, 0, 0)$  respectiv  $B_1(1, 0, 0)$  cu vitezele  $\bar{v}_1 = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$  și  $\bar{v}_2 = \bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ . Să se determine ecuația suprafetei generate de dreptele  $M_1M_2$  și să se precizeze forma ei.

**II.** Fie  $V$  un spațiu vectorial finit dimensional peste corpul  $K$ , fie  $F : V \times V \rightarrow K$  o formă biliniară și fie subspațiile:

$$V_1 = \{x \in V \mid F(x, y) = 0, \forall y \in V\}$$

$$V_2 = \{y \in V \mid F(x, y) = 0, \forall x \in V\}.$$

Arătați că  $\dim V_1 = \dim V_2$ .

**III. a)** Să se arate că  $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \dots = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ .

**b)** Să se calculeze  $\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \dots \right)^2$ .

**IV.** Să se determine funcțiile continue  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  cu proprietatea  $f(x) - f(y) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$  pentru care  $x - y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2012-2013

**I. a)** Să se dezvolte  $\frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}$  în serie de forma  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$  cu precizarea mulțimii de convergență.

b) Folosind substituția  $t = \frac{1}{2x+1}$  în seria precedentă, să se obțină o serie a cărei sumă este

$$f(x) = \left( x + \frac{1}{2} \right) \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - 1, \quad x > 0.$$

c) Folosind o serie majorantă convenabil aleasă, să se arate că  $\sum_{n=0}^{\infty} f(x+n)$  converge pentru orice  $x > 0$ .

**II.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4$ .

a) Să se afle valorile extreme ale funcției  $f$  în domeniul închis:

$$\bar{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

b) Să se determine mulțimea punctelor din plan pentru care există o vecinătate în care ecuația  $f(x, y) = 0$  definește o funcție implicită  $y = y(x)$  și să se afle punctele de extrem local ale acestei funcții.

**III.** Fie  $M = \begin{pmatrix} a \cos \theta - b \sin \theta & a \sin \theta + b \cos \theta \\ a \sin \theta + b \cos \theta & -a \cos \theta + b \sin \theta \end{pmatrix}$ , în care  $a, b$  și  $\theta$  sunt numere reale date.

a) Să se scrie  $M$  sub forma  $M = aA + bB$  și să se calculeze  $A^2$ ,  $B^2$  și  $AB + BA$ .

b) Să se determine  $M^n$ ,  $n$  număr natural.

c) Dacă  $a^2 + b^2 < 1$ , să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \cdot \frac{1}{k} M^k$ .

**IV.** a) Să se determine ecuația suprafeței formată din toate acele puncte ale spațiului care sunt egal depărtate de dreptele  $D_1 : x = y = z$  și  $D_2 : x - 1 = y = -z$ .

b) Se consideră matricele  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$  și  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ . Să se determine coordonatele centrului de simetrie al curbei de intersecție dintre suprafața  $X^t(A + A^t)X - 32 = 0$  și planul  $x + y + z - 2 = 0$ , unde  $X^t$  și  $A^t$  reprezintă transpușele matricelor respective.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil teoretic, 2013-2014

**I.** Fie  $I$  un interval nedegenerat al axei reale,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^1$  pe  $I$  și  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = |f(x)|$ . Să se demonstreze că există o mulțime cel mult numărabilă  $E_f \subseteq I$ , cu proprietatea că  $g$  este derivabilă pe  $I \setminus E_f$ . Să se dea exemplu de funcție  $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  pentru care mulțimea  $E_f$  este infinită.

**II.** Câte soluții are ecuația  $x^{2013} = 1$  în  $\mathbb{Z}_{2014}$ ?

**III.** a) Arătați că dacă un paralelogram este înscris într-o elipsă, atunci centrul lui coincide cu centrul elipsei.

b) Arătați că dacă un dreptunghi este înscris într-o elipsă care nu este cerc, atunci laturile sale sunt paralele cu axele de simetrie ale elipsei.

c) Aflați aria minimă a elipselor circumscrise unui dreptunghi dat.

**IV.** Fie  $m, n$  numere naturale și  $A \in M_n(\mathbb{C})$  o matrice cu proprietatea  $A^m = I_n$ . Să se arate că:

$$\text{rang } (A - \varepsilon_0 I_n) + \text{rang } (A - \varepsilon_1 I_n) + \dots + \text{rang } (A - \varepsilon_{m-1} I_n) = n(m-1),$$

unde  $\{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-1}\} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^m = 1\}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil electric, 2013-2014

**I.** Fie  $a > 0$  și  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = e^{-x-y} + a\sqrt{x^2 + y^2}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Arătați că  $f$  are un unic punct de extrem local; demonstrați că acesta este punct de minim global pentru  $f$ . (Folosiți eventual inegalitatea  $e^t \geq t + 1$ ,  $\forall t \in \mathbb{R}$ .)

**II.** i) Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  astfel încât pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$  să aibă loc relația

$$\int_0^\pi (ax + bx^2) \cos nx dx = \frac{1}{n^2};$$

ii) Să se arate că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

**III.** Se consideră spațiul vectorial real  $V = C[0, 2\pi]$  și endomorfismul

$$T : V \rightarrow V, \quad T(f)(x) = \int_0^{2\pi} 4 \sin^3(x+y) f(y) dy, \quad f \in V, x \in [0, 2\pi].$$

a) Dați exemplu de 2014 funcții liniar independente din  $\text{Ker } T$ .

b) Determinați valorile proprii nenele și vectorii proprii corespunzători pentru  $T$ .

**IV.** Fie  $a, b, n$  numere naturale astfel ca  $0 \leq a \leq b \leq n$  și  $0 \leq a + b - n$ . Să se arate că pentru orice număr natural  $c$  cu proprietatea  $a + b - n \leq c \leq a$  există două matrice  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ , astfel că  $\text{rang } A = a$ ,  $\text{rang } B = b$  și  $\text{rang } (A \cdot B) = c$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2013-2014

**I.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \sin(xy) \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Să se studieze existența derivatelor parțiale de ordinul întâi.

- b) Să se studieze diferențialitatea în  $(0, 0)$ .  
 c) Să se verifice dacă  $f''_{xy}(0, 0) = f''_{yx}(0, 0)$ .  
 d) Să se studieze natura seriei numerice  $\sum_{n \geq 1} f(n^{-\alpha}, n^{-\beta})$  pentru  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

**II.** Să se calculeze

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctg(a \cos x)}{\cos x} dx,$$

unde  $a \in \mathbb{R}$ .

**III.** Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = (x+y)e^{-x^2-y^2}$ , unde  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 2\}$ .

- a) Să se determine punctele de extrem local ale funcției  $f$ .  
 b) Să se determine imaginea funcției  $f$ .

**IV.** Fie planul  $\pi : 2x + y - 2z + 5 = 0$  și punctele  $A(2, -5, 0)$  și  $B(0, 1, 2)$ .

- a) Să se determine poziția relativă a sferelor centrate în  $A$ , respectiv  $B$ , tangente la planul  $\pi$ .  
 b) Să se determine punctul  $M \in \pi$  pentru care  $\text{dist}(M, A) + \text{dist}(M, B)$  este minimă.

**V.** Fie  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$  trei vectori liberi necoplanari și  $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{v} = \vec{b} + \vec{c}$ ,  $\vec{w} = \vec{c} + \vec{a}$ , astfel încât  $\|\vec{u}\| = 2$ ,  $\|\vec{v}\| = 1$ ,  $\|\vec{w}\| = 3$ ,  $m(\widehat{\vec{v}, \vec{w}}) = \frac{\pi}{6}$ ,  $m(\widehat{\vec{u}, \vec{v} \times \vec{w}}) = \frac{\pi}{3}$ .

- a) Să se afle volumul paralelipipedului construit pe suporturile cu origine comună ale vectorilor  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  și  $\vec{c}$ .  
 b) Se consideră  $T : V_3 \rightarrow V_3$  un endomorfism astfel încât  $T(\vec{a}) = \vec{v}$ ,  $T(\vec{b}) = \vec{w}$ ,  $T(\vec{c}) = \vec{u}$ . Să se calculeze  $T^{2014}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil teoretic, 2014-2015**

**I.** Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Arătați că orice element din  $\mathbb{Z}_n$  se poate scrie ca produs între un element idempotent și unul inversabil dacă și numai dacă  $n$  este liber de pătrate.

- II.** a) Fie  $p \geq 3$  un număr prim și  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$  o matrice cu proprietatea că  $\text{tr}(A) = 0$  și  $\det(A - I_p) \neq 0$ . Să se arate că  $A^p \neq I_p$ .  
 b) Să se arate că pentru orice număr natural compus  $n \geq 4$  există matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  cu proprietățile  $\text{tr}(A) = 0$ ,  $\det(A - I_n) \neq 0$  și  $A^n = I_n$ .

**III.** Să se demonstreze că cea mai mică constantă pozitivă  $C$  cu proprietatea că orice funcție continuă  $f : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  satisfacă inegalitatea

$$\int_0^a \frac{x}{\int_0^x f(t)dt} < C \int_0^a \frac{1}{f(x)} dx,$$

pentru orice  $a > 0$ , este  $C = 2$ .

**IV.** Fie  $m, n \in \mathbb{N}^*$  și  $K$  un corp comutativ. Să se arate că:

- a) Există un morfism nenul  $f : {}_m(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$  dacă și numai dacă  $m \leq n$ .
- b) Există un morfism unitar  $f : {}_m(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$  dacă și numai dacă  $m | n$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**

Faza națională, anul I, profil electric, 2014-2015

**I.** Fie  $P_2$  mulțimea polinoamelor de grad cel mult 2 cu coeficienți reali și funcția  $J : P_2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$J(f) = \int_0^1 [f(x)]^2 dx.$$

Dacă  $Q = \{f \in P_2 \mid f(1) = 1\}$ , arătați că  $J$  are minim pe  $Q$  și găsiți  $f \in P_2$  pentru care acest minim este atins.

**II.** Fie  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  o matrice cu proprietatea  $A^3 = A + I_3$ .

- a) Arătați că matricea  $A$  este inversabilă și să se determine valorile ei proprii reale cu o zecimală exactă.
- b) Să se arate că  $\det A$  și  $\det(A - I_3)$  au același semn.
- c) Să se arate că aplicația  $f : \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(X) = \det(AXA^{-1})$ , este diferențiabilă și să se determine punctele ei critice.

**III.** Fie  $n \geq 0$  un număr întreg și  $T_{2n}$  polinomul lui Taylor asociat funcției cosinus în 0, adică

$$T_{2n}(x) = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-2}}{(2k-2)!},$$

și fie

$$I_n = \int_0^\infty \frac{T_{2n}(x) - \cos x}{x^{2n+2}} dx.$$

- a) Să se arate că  $I_n = -\frac{1}{(2n+1)(2n)} I_{n-1}$ ,  $n \geq 1$ .
- b) Să se calculeze  $I_n$ , știind că  $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

**IV. a)** Fie  $p \geq 3$  un număr prim și  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$  o matrice cu proprietatea  $\text{tr}(A) = 0$  și  $\det(A - I_p) \neq 0$ . Să se arate că  $A^p \neq I_p$ .

**b)** Să se arate că pentru orice număr natural neprim  $n \geq 4$  există matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  cu proprietățile  $\text{tr}(A) = 0$ ,  $\det(A - I_n) \neq 0$  și  $A^n = I_n$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2014-2015

**I.** Fie  $S = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( a + \frac{2}{n(n+3)} \right)$  și  $I + \int_0^{1/3} \frac{1}{x \ln^x} dx$ . Stabiliți dacă  $S \cdot I = 1$ .

**II.** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definită de  $f(x, y, z) = z^{x^2y-z}$ .

- a) Să se arate că ecuația  $f(x, y, z) - z + 1 = 0$  definește o funcție implicită  $z = z(x, y)$  în vecinătatea punctului  $(1, 2, 2)$ .
- b) Pentru funcția  $z = z(x, y)$  definită la punctul a), să se scrie polinomul Taylor de gradul 2 în jurul punctului  $(1, 2)$ .
- c) Aflați punctele de extrem local pentru funcția  $g$  definită de

$$g(x, y) = f(x, y, 3) \cdot 3^{-xy^2-3x}.$$

**III.** Fie vectorii  $v_1 = (1, 1, 1)$ ,  $v_2 = (1, -2, 1)$ ,  $v_3 = (1, 0, -1)$  și  $w = (6, 0, 0)$  din  $\mathbb{R}^3$ .

- a) Să se arate că  $B = \{v_1, v_2, v_3\}$  este o bază ortogonală în  $\mathbb{R}^3$  față de produsul scalar obișnuit și să se găsească componentele vectorului  $w$  relativ la baza  $B$ .
- b) Fie  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  transformarea liniară astfel încât  $T(v_1) = 2v_1 + v_2 + v_3$ ,  $T(v_2) = -v_1 + 2v_2 - v_3$ ,  $T(v_3) = v_1 - v_2 + 2v_3$ . Să se găsească matricele transformării  $T$  relativ la baza  $B$  și la baza canonică.
- c) Să se determine valorile proprii și subspațiile proprii corespunzătoare transformării  $T$  și să se calculeze  $T^{2015}$ .
- d) Fie forma pătratică  $Q = (x')^2 - (y')^2 + 2(z')^2$ , dată în baza  $B$ . Scrieți expresia formei pătratice  $Q$  în baza canonică a spațiului  $\mathbb{R}^3$ .

**IV.** Se consideră familia de plane

$$\pi_\lambda : (\lambda^2 - 2\lambda + 1)x + (\lambda^2 + 2\lambda + 2)y + (2\lambda^2 + 2\lambda + 4)z - \lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- a) Să se arate că există un punct fix care este conținut în toate planele familiei  $\pi_\lambda$ .
- b) Să se determine coordonatele simetricului originii  $O$  față de planul  $\pi_0$ .
- c) Există sfere din familia

$$S_\lambda : x^2 + y^2 + z^2 - 2\lambda x - 6y + 4z - 1 = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

tangente la planul  $\pi_0$ ?

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil teoretic, 2015-2016

**I.** Găsiți numerele întregi  $x$  cu proprietatea că  $x^{2016} + x^{2015} + \dots + x + 1$  se divide prin 2017.

**II.** Calculați  $\lim_{h \searrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h}{1 + n^2 h^2}$ .

**III.** Considerăm subcorful  $k = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$  al corpului cuaternionilor. Arătați că:

- a) Ordinul oricărui subgrup finit al lui  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  este de forma  $2^\alpha \cdot 3^\beta$ , cu  $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ .
- b) Orice subgrup comutativ finit al lui  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  are ordin 1, 2, 3, 4 sau 6.

**IV.** Considerăm sirul de discuri  $(D_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ , discul  $D_n$  având rază  $\frac{1}{n}$ . Determinați latura minimă a unui pătrat în care pot fi amplasate fără suprapunerî toate discurile  $D_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil electric, 2015-2016**

**I.** a) Știind că  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ , să se calculeze integrala improprie

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{(\sin \frac{x}{n})^2}{x^2} dx.$$

b) Să se determine suma seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} I_{f(n)}$ , unde  $f(n) = \frac{1}{\arctg \frac{2}{n^2}}$ .

**II.** Fie  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  o matrice cu valorile proprii reale și distințe  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , cu  $-1 < \lambda_i \leq 1$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Presupunem că suma elementelor de pe fiecare coloană este 1, iar sumele elementelor de pe linii sunt egale.

- a) Să se arate că 1 este valoare proprie a matricei  $A$ , iar vectorul  $(1, 1, \dots, 1)$  este un vector propriu corespunzător valorii proprii 1.  
 b) Să se calculeze  $\lim_{k \rightarrow \infty} (A^k (x_1, x_2, \dots, x_n)^T)$ .

**III.** Considerăm sirul  $(x_n)_{n \geq 1}$ , cu  $0 < x_1 < 1$ , dat de recurența  $x_{n+1} = x_n(1-x_n)$ , pentru orice  $n \geq 1$ .

a) Să se arate că  $(n+1)x_n < 1$ , pentru orice  $n \geq 2$ .

b) Să se studieze convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ , unde  $\alpha$  este un parametru real.

**IV.** Să se arate că pentru o matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  următoarele afirmații sunt echivalente:

- a)  $A^2 = A$ .  
 b)  $\operatorname{rang} A + \operatorname{rang} (I_n - A) = n$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil mecanic, 2015-2016**

**I.** a) Să se determine mulțimea de convergență a seriei de puteri  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot 2^{2n}}$ .

b) Să se dezvolte în serie Taylor în jurul originii funcția  $F : (-2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \ln \frac{x+2}{2-x}$ .

c) Să se calculeze suma seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{2n}}$ .

**II.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \frac{x^{2015} + y^{2015}}{x^{1008} + y^{1008}} \cdot e^{-x^{2016}}$ .

a) Să se calculeze  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ .

b) Să se studieze diferențiabilitatea funcției  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

c) Să se calculeze  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{x + y}$ .

**III.** Se dau sfera  $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$  și planul  $(\pi) : 2x + 2y + z - 9 = 0$ .

- a) Stabiliti poziția sferei față de planul  $(\pi)$ .
- b) Să se scrie ecuația simetricei sferei  $S$  față de planul  $(\pi)$ .
- c) Aflați sferele care conțin cercul  $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$  și sunt tangente sferei  $S$ .

**IV.** Fie  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  spațiul vectorial al matricelor reale cu 2 linii și 2 coloane și fie

$$B = \{E_11 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_12 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_21 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_22 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$$

baza canonica asociată. Fie  $T : V \rightarrow V$  transformarea liniară definită prin  $T(A) = 2A + 3A^t$ , unde  $A^t$  înseamnă matricea transpusă.

- a) Să se arate că matricea  $m_B(T)$  a transformării  $T$  în baza canonica  $B$  este:

$$m_B(T) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

- b) Să se scrie matricea transformării  $T$  în baza

$$B' = \{F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}.$$

- c) Să se determine nucleul și imaginea transformării  $T$  și să se verifice teorema dimensiunii pentru aplicații liniare (teorema rang-defect).
- d) Să se determine valorile și vectorii proprii (în baza  $B$ ) pentru transformarea  $T$ . e) Să se calculeze  $T^{2016} \left( \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right)$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil teoretic, 2016-2017

**I.** Fie  $n \in \mathbb{N}^*$ . Decideți dacă limita

$$\lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (0, 0, \dots, 0)} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

există. În caz afirmativ, determinați-o.

**II.** Fie  $G$  și  $H$  două subgrupuri ale grupului aditiv  $Q/Z$ . Arătați că  $G$  și  $H$  sunt izomorfe dacă și numai dacă ele sunt egale.

**III.** Fie numerele reale  $a, b, c, d$  cu proprietatea că  $a, b, c$  nu sunt toate nule. Determinați distanța de la planul de ecuație  $ax + by + cz + d = 0$  la paraboloidul de ecuație  $z = x^2 + y^2$ .

**IV.** Considerăm un corp finit  $K$  de caracteristică diferită de 2 și astfel încât  $|K| > 5$ . Arătați că orice element al lui  $K$  se poate scrie ca sumă de trei pătrate nenule din  $K$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil electric, 2016-2017**

**I.** Considerăm matricea  $A = I_n - 2XX^T$ , unde  $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ , pentru care  $x_1 + x_2 + \dots + x_n \neq 0$  și  $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ .

- a) Să se arate că matricea  $A$  este ortogonală.
- b) Aflați valorile proprii ale matricei  $A$  și determinați o bază în raport cu care matricea  $A$  are forma canonică Jordan.
- c) Determinați  $X$ , știind că  $(1, 1, \dots, 1)^T$  este un vector propriu pentru  $A$ .

**II.** Se consideră sirul de numere reale  $(x_n)_{n \geq 1}$ , definit prin

$$x_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{i \cdot j}, \quad \forall n \geq 1.$$

Să se studieze natura seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^{\alpha}},$$

unde  $\alpha$  este un parametru real.

**III.** Fie  $V$  un spațiu vectorial real de dimensiune finită, și  $T, S : V \rightarrow V$  două aplicații liniare, cu proprietățile  $T \circ S = T$  și  $S \circ T = S$ .

- a) Să se arate că  $\text{rang } T = \text{rang } S$ .
- b) Să se arate că dacă aplicațiile  $T$  și  $S$  au aceeași imagine, atunci  $S = T$ .

**IV.** Fie  $c > 1$  și  $f : [0, c] \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție continuă, crescătoare, cu  $f(0) = 0$  și  $f(1) = 1$ . Să se calculeze

$$\lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} \int_0^1 f(x) (f(x+t) - f(x)) dx.$$

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil mecanic, 2016-2017**

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ .

- a) Să se calculeze extremele locale ale funcției  $f$ .
- b) Să se demonstreze că ecuația  $f(x, y) + 2 = 0$  definește o funcție  $y = y(x)$  în vecinătatea punctului  $A(\pi, 0)$ . Calculați  $y''(\pi)$ .
- c) Să se studieze convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n\pi, 0)}{n} \cdot x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

**II.** Fie funcția  $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \frac{1}{(x-a)(b-y)}$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție și  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ .

- a) Să se arate că integrala  $I(a, b) = \int_a^b \sqrt{f(x, x)} dx$  este convergentă.

- b) Să se calculeze integrala  $I(a, b)$ .  
c) Să se calculeze  $\frac{\partial^{2017} f}{\partial^{1008} \partial^{1009}} \left( \frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2} \right)$ .

**III.** Considerăm operatorii liniari  $T_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , pentru care  $T_m(e_1) = -me_2 + me_3$ ,  $T_m(e_1 + e_2) = e_1 - me_2 + (m+1)e_3$ ,  $T_m(e_1 + e_2 + e_3) = (1+m)e_1 + (1-m)e_2 + (1+m)e_3$ , unde  $\{e_1, e_2, e_3\}$  este baza canonica din  $\mathbb{R}^3$ .

- a) Aflați matricea  $A_m$  a operatorului  $T_m$  în baza canonica.  
b) Aflați  $m \in \mathbb{R}$  pentru care  $T_m$  este izomorfism.  
c) Aflați  $m \in \mathbb{R}$  pentru care  $T_m$  este diagonalizabil.  
d) Pentru  $m = \frac{1}{4}$ , aflați o bază în raport cu care  $T_m$  are forma diagonală și aflați apoi  $\lim_{k \rightarrow \infty} (A_m^k \cdot e_1)$ .

**IV.** Se consideră fasciculul de plane  $\pi_{\alpha, \beta} : (\alpha+\beta)x + (\alpha+\beta)y + (\alpha-2\beta)z - \alpha + 2\beta = 0$ .

- a) Să se demonstreze că planele conțin o dreaptă comună și să se determine ecuațiile acestei drepte.  
b) Să se determine ecuațiile planelor bisectoare ale planelor  $\pi_{1,0}$  și  $\pi_{0,-1}$ .  
c) Să se determine locul geometric al centrelor sferelor de rază 1 tangente la dreapta comună, situate în planul  $P : x - y = 0$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza națională, anul I, profil teoretic, 2017-2018**

**I.** Într-o elipsă  $E_1$  se înscrie dreptunghiul  $D_1$  de arie maximă. În dreptunghiul  $D_1$  se înscrie elipsa  $E_2$  care are semiaxele paralele cu laturile lui  $D_1$  și.a.m.d. Se obțin astfel sirurile  $(E_n)$  și  $(D_n)$ . Arătați că

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{aria}(E_n) = 2 \text{ aria}(E_1) \quad \text{și} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \text{aria}(D_n) = 2 \text{ aria}(D_1).$$

**II.** Considerăm dreapta de ecuație  $d : x + a = y + a = z - 2a$  și sfera de ecuație  $S^2 : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . Determinați valorile parametrului real  $a$  pentru care există plane tangente la  $S^2$  și care conțin  $d$ . Pentru aceste valori ale lui  $a$  determinați ecuațiile respectivelor plane.

**III.** Arătați că o matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  este simetrică dacă și numai dacă există o bază ortonormală  $\{u_1, \dots, u_n\}$  în  $\mathbb{R}^n$  și numerele reale  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  astfel încât

$$A = \lambda_1 u_1 u_1^t + \dots + \lambda_n u_n u_n^t.$$

În cazul în care  $\lambda_i \neq \lambda_j$  pentru orice  $i \neq j$ , precizați câte astfel de baze există.

**IV. a)** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție indefinit derivabilă astfel încât există un număr întreg  $p \geq 1$  pentru care  $f^{(p+1)} = f'$ . Să se calculeze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{f(x) - f(0)}{x} \right)^{(n)}, \text{ unde } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

b) Să se calculeze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{e^x - 1}{x} \right)^{(n)}, \text{ unde } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2017-2018

**I.** a) Dacă  $n$  este impar,  $n \geq 3$ , determinați toate matricele simetrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  care verifică  $\text{Tr}(A^{n-1}) = \det(A) < n^n$ .

b) Dacă  $n$  este impar,  $n \geq 3$ , și matricea simetrică  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  verifică relația  $\text{Tr}(A^{n-1}) = \det(A) = n^n$ , arătați că  $A^2 = n^2 I_n$ .

c) Dacă  $n$  este par,  $n \geq 4$ , arătați că există o matrice simetrică  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  care verifică  $\text{Tr}(A^{n-1}) = \det(A) = n^n$  și  $A^2 \neq n^2 I_n$ .

**II.** Fie  $f : [1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ , continuă, astfel încât  $\int_1^\infty f(x) dx$  este convergentă.

a) Să se arate că, pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ , există un unic  $a_n \in [1, \infty)$  astfel încât

$$\int_1^{a_n} x^n f(x) dx = \int_1^\infty f(x) dx.$$

b) Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  și să se studieze natura seriei  $\sum_{n=1}^\infty (a_n - 1)$ .

**III.** Fie  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  o matrice pătratică. Să se arate că:

a)  $\text{rang } A^n = \text{rang } A^{n+1}$ ;

b) există matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  cu proprietatea  $\text{rang } B^{n-1} \neq \text{rang } B^n$ ;

c) toate matricele  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , pentru care  $\text{rang } B^{n-1} \neq \text{rang } B^n$ , sunt asemenea între ele (similar).

**IV.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție indefinit derivabilă astfel încât există  $p \in \mathbb{N}^*$  pentru care  $f^{(p+1)} = f'$ . Să se calculeze următoarele limite de siruri:

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{f(x) - f(0)}{x} \right)^{(n)}, \quad x \in \mathbb{R}^*$ .

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{f(x) - f(0)}{x} \right)^{(np)}, \quad x \in \mathbb{R}^*$ .

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{e^x - 1}{x} \right)^{(n)}, \quad x \in \mathbb{R}^*$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2017-2018

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^{2018} + \arctg(x^4 + y^{2018})}{x^4 + y^{2018}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

- a) Arătați că  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}^2$ .
- b) Studiați existența derivatelor parțiale în  $(0, 0)$ .
- c) Studiați natura seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} \cdot f(n, 0)$ , pentru  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**II.** Fie  $\mathbb{R}_2[X] = \{aX^2 + bX + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$  spațiul euclidian cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \cdot g(x) dx, \quad \forall f, g \in \mathbb{R}_2[X].$$

- a) Calculați  $\langle p_1, p_2 \rangle$ , unde  $p_1 = X + 2018$  și  $p_2 = \frac{1}{2018}X^2$ .
- b) Aflați o bază și dimensiunea spațiului vectorial  $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p \perp q\}$ , unde  $q = X^2$ .
- c) Folosind procedeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt, să se ortonormeze baza aflată la punctul b).

**III.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + 8y^2 + 2x$ .

- a) Aflați extretele locale ale funcției  $f$ .
- b) Aflați punctele de extrem ale funcției  $f$  cu legătura  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ .
- c) Aflați maximul și minimul funcției  $f$  pe domeniul compact  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1\}$ .

**IV.** Fie sfera  $(S)$ :  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z - 3 = 0$  și familia de plane  $(\Pi_\lambda)$ :  $x + 2y + z + \lambda = 0$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

- a) Aflați  $\lambda \in \mathbb{R}$  astfel încât planul  $(\Pi_\lambda)$  să fie tangent sferei  $(S)$ .
- b) Determinați coordonatele centrului și raza cercului  $(\Gamma)$  de intersecție dintre sfera  $(S)$  și planul  $(\Pi_0)$ .
- c) Aflați ecuația sferei ce conține cercul  $(\Gamma)$  și trece prin punctul  $M(1, 2, -4)$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil teoretic, 2018-2019

**I.** Se consideră punctele  $A(0, 0, 1)$ ,  $B(6, 0, 0)$  și dreapta  $d : \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ . Să se

găsească coordonatele punctului  $M \in d$  pentru care suma distanțelor la punctele  $A$  și  $B$  este minimă.

**II.** Două matrice  $A, B \in \mathcal{M}_2(R)$ , unde  $R$  este inel comutativ și unitar, se numesc *aritmetic echivalente* dacă există  $U, V \in \mathcal{M}_2(R)$  inversabile astfel încât  $B = UAV$ . Să se arate că matricele  $\begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{pmatrix}$  și  $\begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & Z \end{pmatrix}$  din  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C}[X, Y, Z])$  nu sunt aritmetic echivalente.

**III.** Fie  $n > 2$  un număr natural. Se consideră funcția  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{\sum\limits_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j}{\sum\limits_{i=1}^n x_i^2}, & (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\} \\ a, & (x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0). \end{cases}$$

Să se determine valorile  $a \in \mathbb{R}$  pentru care graficul funcției  $f$  este conex.

**IV.** a) Fie  $n \in \mathbb{N}^*$ . Să se calculeze

$$I_n = \int_0^1 \frac{\ln(1-x) + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n}}{x^{n+1}} dx.$$

b) Fie  $a \in \mathbb{R}$  și  $b > 0$ . Să se arate că integrala

$$J(a, b) = \int_0^\infty \left[ 2 + (x+a) \ln \frac{x}{x+b} \right] dx$$

este convergentă dacă și numai dacă  $a = 1$  și  $b = 2$  și în acest caz să se calculeze  $J(1, 2)$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2018-2019

**I.** Să se arate că, oricare ar fi  $a \in \mathbb{C}$ ,  $a \neq 0$  și oricare ar fi matricea  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $n \geq 2$ ,

$$\operatorname{rang}(aA - A^2) = \operatorname{rang}A + \operatorname{rang}(aI_n - A) - n.$$

Este valabilă afirmația pentru  $a = 0$ ? Justificați.

**II.** Fie  $(a_n)_{n \geq 3}$  un sir descrescător de numere pozitive. Să se arate că seriile

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{a_n}{n(\ln n)^2} \quad \text{și} \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{a_n}{\ln(n-1)} - \frac{a_{n+1}}{\ln(n+1)}$$

sunt convergente.

**III.** Fie funcția  $f : [a, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  continuă și monotonă astfel încât  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  este convergentă. Graficul lui  $f$ , împreună cu dreptele  $y = 0$  și  $x = a$ , mărginește un domeniu de arie  $A > 0$ .

Aratați că, pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ , există punctele  $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, +\infty)$  astfel încât dreptele de abscise  $x_k$ ,  $k = \overline{1, n}$ , paralele cu  $Oy$ , împart domeniul de mai sus în  $n$  părți de arie egală.

b) Fie sirul  $(a_n)_{n \geq 1}$  dat prin

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k), \quad \forall n \geq 1.$$

Arătați că  $V$ , volumul corpului obținut prin rotația graficului funcției  $f$  în jurul axei  $Ox$ , este finit și că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{V}{\pi A}.$$

**IV.** Fie matricele  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  astfel ca  $A^2 + B^2 = 2AB$ .

- a) Să se arate că  $(AB)^n = O_n$ .
- b) Să se arate că  $A$  și  $B$  au aceleași valori proprii.

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

#### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2018-2019

**I.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \begin{cases} (x^{2018} + y^{2020}) \sin \frac{1}{x^{2018} + y^{2020}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

- a) Aratați că funcția  $f$  este continuă în  $(0, 0)$ .
- b) Studiați diferențialitatea funcției  $f$  în  $(0, 0)$ .
- c) Discutați natura seriei

$$\sum_{n \geq 1} n^{1-\alpha} f(n, 0), \quad \text{unde } \alpha \in \mathbb{R}.$$

**II.** Fie  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y, z) = z^3 + z + 20(x^2 + y^2) - 8(xy + x + y)$ .

- a) Determinați extremele locale ale funcției  $z = z(x, y)$  definite implicit de ecuația  $F(x, y, z) = 0$ .
- b) Calculați integrala

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(\sin^{2019} t, -\sin^{2019} t, 0) dt.$$

**III.** Fie aplicația liniară  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $T(x, y) = (2018x + 2019y, -2017x + 2018y)$ .

- a) Aratați că matricea aplicației liniare  $T$  în baza  $B = \{f_1 = (1, 1), f_2 = (0, 1)\}$  a spațiului vectorial  $\mathbb{R}^2$  este  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2019 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

- b) Arătați că matricea  $A$  este diagonalizabilă și determinați baza în care matricea lui  $T$  are forma diagonală. Calculați  $A^{2019}$ .
- c) Dacă  $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $X \neq O_2$  are proprietățile  $X^{2019} = X$  și  $\det(X) = 0$ , ce valori poate lua  $\text{Tr}(X)$ , unde  $\text{Tr}(X)$  este suma elementelor de pe diagonala principală a matricei  $X$ . Determinați valorile proprii ale lui  $X$  în acest caz.

**IV.** Fie familia de plane:

$$P_\lambda : (4 - 3\lambda)x + (2\lambda - 1)y + 5z - 5 = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- a) Arătați că toate planele  $P_\lambda$  trec printr-o dreaptă fixă  $d_1$  și determinați ecuațiile parametrice ale acesteia.
- b) Scrieți ecuația planului  $Q$  perpendicular pe planele  $P_\lambda$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ , care conține dreapta  $d_2 : x = -y = -z$ .
- c) Determinați ecuația suprafeței descrise de punctele egal depărtate de dreptele  $d_1$  și  $d_2$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

## Enunțuri - anul II

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2001-2002

**I.** a) Să se determine funcția olomorfă  $f$  dacă:

$$\operatorname{Im} f = e^x \sin(y); \quad f(0) = 1.$$

b) Se dă:  $\operatorname{Re} f = \varphi(x^2 + y^2)$ ;  $\varphi \in C^2$ ; se cere funcția olomorfă  $f$ .

**II.** a) Să se dezvolte în serie Laurent funcția:  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 1}$  pentru:

i)  $0 < |z - 1| < 2$ ; ii)  $|z - 1| > 2$ ; iii)  $|z| < 2$ .

b) Să se calculeze integralele:

$$I_1 = \oint_{|z|=R>0} \frac{z}{z^2 - 1} dz; \quad I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \sin x} dx.$$

**III.** a) Se dă sistemul:  $\begin{cases} \dot{x} = x + 5y \\ \dot{y} = 5x + y \end{cases}$ . Se cere:

i) soluția generală și stabilitatea soluției banale;

ii) soluția particulară, dacă  $x(0) = 1$ ;  $y(0) = -1$ .

b) Fie polinomul  $P(\lambda) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 12\lambda + 8$ . Să se verifice dacă este stabil.

**IV.** Să se rezolve, folosind transformarea Laplace

a)  $y'' - 2y' + y = \sin(t) + 4e^{-t} + 2e^t$ ;  $y(0) = 0$ ;  $y'(0) = 2$ .

b)  $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y \end{cases}$ ;  $\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ .

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2002-2003

**I.** a) Să se determine funcția olomorfă  $f$ , dacă  $\operatorname{Re}(f(z)) = e^x \cos y$ ,  $f(0) = 1$ .

b) Să se determine funcția olomorfă  $f$ , dacă  $\operatorname{Im} f = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ ,  $\varphi \in C^2$ .

**II.** a) Să se dezvolte în serie Laurent funcția  $f(z) = \frac{e^{1/z}}{1-z}$ ,  $0 < |z| < 1$  și să se calculeze

$$\int_{|z|=R} f(z) dz, \quad R > 0, R \neq 1.$$

b) Să se calculeze integrala  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^6 + 1} dx$ , folosind teorema reziduurilor.

**III.** Să se rezolve cu ajutorul transformării Laplace ecuațiile:

a)  $y'' - 2y' + y = e^t \cos 2t, y(0) = 1, y'(0) = 1$ .

b)  $x(t) + x'(t) - 2 \int_0^t x(s) \sin(t-s) ds = \cos t + \sin t, x(0) = 1$ .

**IV.** a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = f(x + 2\pi)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^{ax}$ ,  $x \in [-\pi, \pi], a \in \mathbb{R}$ .

b) Aceeași problemă pentru  $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1 - a \cos x}{1 - 2a \cos x + a^2}, |a| < 1.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2003-2004

**I.** Să se determine funcția olomorfă  $f$  dacă

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)) = \frac{x}{x^2 + y^2}, f(1) = 1.$$

**II.** Să se determine soluțiile ecuației  $\cos z = 5$ .

**III.** Să se calculeze integrala:  $I = \int_{4x^2+9y^2=36} \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 1)} dz$ .

**IV.** Să se dezvolte funcția  $f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 6}$  în serie, în domeniile:

- a)  $|z| < 2$ ; b)  $2 < |z| < 3$ ; c)  $|z| > 3$ ; d)  $|z - 2| < 1$ .

**V.** Să se calculeze integrala, folosind teorema reziduurilor:

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2(x^2 + b^2)}, a > b > 0.$$

**VI.** Să se calculeze integralele, folosind teorema reziduurilor (discuție după  $a$ ):

$$a_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{1 - 2a \cos x + a^2} dx, \quad b_n = \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{1 - 2a \cos x + a^2} dx, \quad n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}, |a| \neq 1.$$

**VII.** Să se rezolve sistemul:

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y + 2 \sin t \\ \dot{y} = 2x - y \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}, \quad \text{unde} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t). \end{cases}$$

**VIII.** Să se determine funcția original dacă  $F(p) = \frac{p+1}{p^2+2p+\alpha}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$  (discuție după  $\alpha$ ).

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Sunt obligatorii 6 subiecte la alegere.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2004-2005

**I.** Să se calculeze, folosind teorema reziduurilor, integrala  $I = \int_{\Gamma} z^2 e^{\frac{2z}{z+1}} dz$ , unde

$$\Gamma = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \left| z - \frac{1}{2} \right| = R \right\}, \quad R \neq \frac{3}{2}, \quad R > 0$$

este un drum parcurs în sens trigonometric o singură dată.

**II.** Să se determine dezvoltarea în serie Fourier a funcției periodice, definită prin

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ x/2, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Folosind această dezvoltare, determinați suma seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ .

**III.** Folosind transformarea Laplace să se rezolve ecuația

$$x'''(t) - 2x''(t) - x'(t) + 2x(t) = 5 \sin 2t,$$

cu condițiile inițiale  $x(0+) = 1$ ,  $x'(0+) = 1$ ,  $x''(0+) = -1$ .

**IV.** Să se determine soluția în  $L^1 \cap L^2$  a ecuației integrale Fourier

$$\int_0^{\infty} f(x) \cos(tx) dx = \frac{1}{1+t^2}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2004-2005

**I.** Să se determine funcția olomorfă  $f$ , știind că:

a)  $Re(f(z)) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ ; b)  $Re(f(z)) = \varphi\left(\frac{x^2}{x^2+y^2}\right)$ ;  $\varphi \in C^2$ .

**II.** a) Să se rezolve sistemul prin diferite metode:

$$\begin{cases} y' + 2x - y = 0 \\ 2x' + y'' = 2t - \cos(2t) \end{cases}, \quad x(0) = \frac{1}{2}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -1.$$

b) Să se rezolve ecuația integrală:

$$\varphi(t) - \int_0^t e^{t-u} (t-u) \varphi(u) du = \cos t.$$

**III.** Să se calculeze integralele:

$$\text{a)} \int_{|z|=2} (z^2 + 2z + 1) e^{\frac{1}{z-1}} dz; \quad \text{b)} \int_0^{2\pi} \frac{\sin(2nx)}{5 + 3 \sin x} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2005-2006

**I. a)** Să se calculeze folosind reziduuri  $\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^3}$ , unde  $\gamma$  este frontiera domeniului:

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R, 0 < \arg z < \pi\}.$$

b) Calculați  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$ .

**II.** Determinați funcția  $g$  din relația:

$$\int_0^{\infty} g(u) \sin ut du = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin \frac{t}{4}, & 0 < t < 2\pi \\ \frac{\pi}{4}, & t = 2\pi \\ 0, & t > 2\pi. \end{cases}$$

**III.** Să se rezolve ecuația diferențială folosind transformarea Laplace

$$x'' - 2x' + x = e^t, x(0) = 0, x'(0) = 1.$$

**Notă.** Timp de lucru 2h 30 min.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2005-2006

**I.** Să se determine funcția olomorfă  $f$ , știind că:

- a)  $\operatorname{Im}(f(z)) = \operatorname{arctg} \left( \frac{y}{x} \right)$ ,  $f(1) = 0$ .
- b)  $\operatorname{Re}(f(z)) = \varphi \left( \frac{x^2 + y^2}{x} \right)$ ,  $\varphi \in C^2$ .

**III.** Folosind teorema reziduurilor, calculați următoarele integrale:

a)  $I_1 = \int_{|z|=r} z^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz, r > 0.$

b)  $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{2006}} dx.$

**III.** a) Folosind transformarea Laplace, să se rezolve ecuația

$$\varphi''(t) + \int_0^t e^{2(t-u)} \cdot \varphi'(u) du = e^{2t}, \quad \varphi(0) = \varphi'(0) = 0.$$

b) Să se calculeze transformata Fourier a funcției:  $f(x) = e^{-x^2/2}, x \in \mathbb{R}.$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul II, profil electric, 2006-2007

**I.** Să se rezolve ecuațiile:

a)  $xy'' - (x+2)y' + y = 0.$

b)  $x^2y'' - xy' + y = \ln x, x > 0.$

**II.** Să se rezolve sistemul  $\begin{cases} x' = 2x + 2z \\ y' = 2x - 2z \\ z' = 2x - 2y. \end{cases}$

**III.** Fie  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^2$ ,  $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $v(x, y) = \varphi(x^2 - y^2)$ .

a) Să se determine  $\varphi$ , astfel încât  $v$  să fie armonică.

b) Determinați funcția  $f$  olomorfă, pentru care  $\operatorname{Im}(f) = v(x, y)$ .

c) Calculați  $\int_{|z|=1} \frac{f(z) \cdot \sin z}{z^2} dz.$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2006-2007

**I.** Să se determine funcțiile olomorfe  $f = f(z)$  știind că:

a)  $\operatorname{Re} f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y); \quad f(0) = 0.$

b)  $\operatorname{Re} f(z) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right); \quad \varphi \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}).$

**II.** a) Să se dezvolte funcția  $f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 6}$  în serie, în domeniile:

i)  $|z| < 2$ ;   ii)  $2 < |z| < 3$ ;   iii)  $|z| > 3$ ;   iv)  $|z - 2| > 1$ .

b) Să se rezolve în  $\mathbb{C}$  ecuația  $\sin z = 2$ .

**III.** Folosind teorema reziduurilor, să se calculeze integralele:

a)  $I_1 = \int_{|z|=R} z^3 e^{\frac{1}{z-1}} dz; R > 0, R \neq 1.$

b)  $I_2 = \int_0^\pi \frac{dx}{1 - 2a \cos x + a^2}; a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}.$

**IV.** Să se rezolve sistemul:

$$\begin{cases} x' - 4x - y = -36t \\ y' + 2x - y = -2e^t \end{cases} \quad \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva, la alegere, 3 subiecte.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profilele electric și mecanic, 2007-2008

**I.** Să se rezolve problema Cauchy:

$$y''' - 3y' + 2y = x^2 e^x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = -\frac{241}{27}.$$

**II.** Să se rezolve problema Cauchy:

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}, \quad Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

**III.** Determinați funcția olomorfă  $f = f(z)$ , știind că:

$$\operatorname{Im}(f(z)) = \ln(x^2 + y^2) + x - 2y, \quad f(1+i) = -i - 3 + 2i \ln \sqrt{2}.$$

**IV.** Folosind teorema reziduurilor, calculați integrala:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{4 - \sin^2 x}.$$

**V.** Calculați integrala, folosind teorema reziduurilor:

$$J = \int_{|z|=R} z^2 e^{1/(z-1)} dz, \quad R > 0, R \neq 1.$$

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva, la alegere, 4 subiecte din cele 5.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2008-2009

**I.** Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale  $Y' = AY$ ,  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ,

cu condiția  $Y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**II.** Fie  $p, q, r : (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $q(x, 0) > 0$ ;  $r(x, 0) \geq 0$ ,  $\forall x \in (a, b)$ . Arătați că nicio soluție a ecuației  $r(x, y') \cdot y'' + p(x, y') \cdot y' = q(x, y') \cdot y$ , nu poate avea un maxim interior pozitiv sau un minim interior negativ.

**III.** Să se calculeze  $\int_{\Gamma} z^2 \cdot e^{2z/(z+1)} dz$ , unde  $\Gamma$ :  $x^2 + y^2 + 2x = 0$ .

**IV.** a) Să se determine funcția  $f$  olomorfă, dacă  $\operatorname{Re}(f) = \varphi\left(\frac{x^2 + y^2}{x}\right)$ ,  $\varphi \in C^2(D)$ , unde  $D$  este domeniul maxim de definiție.

b) Calculați  $\int_{|z|=R} f^3(z) \cdot \sin z dz$ , unde  $R > 0$  și  $f$  este funcția olomorfă de la punctul a).

**V.** Calculați, folosind teorema reziduurilor,  $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(3 + \cos x)^2}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2008-2009

**I.** a) Să se determine  $F \in C^2(\mathbb{R})$ , astfel încât  $F(t(x, y))$ ,  $t \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R})$ ,  $t(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x}$  să fie funcție armonică.

b) Să se determine funcția olomorfă  $f = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , știind că

$$u(x, y) = F(t(x, y)), \quad F \in C^2(\mathbb{R}), \quad t \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}), \quad t(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x}.$$

**II.** a) Să se determine reziduul funcției  $f(z) = (z - 1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}$  în  $z = 1$ .

b) Folosind formulele Euler, să se determine soluțiile ecuației  $\sin z = i$ .

**III.** Calculați integrala  $I_n$  folosind teorema reziduurilor:

$$I_n = \int_0^{2\pi} \frac{(1 - a^2) \cdot e^{inx}}{1 - 2a \cos x + a^2} dx, \quad a \in \mathbb{R}, \quad |a| \neq 1 \quad (\text{discuție după } a).$$

**IV.** Să se rezolve problema Cauchy:  $\begin{cases} x' + y = t \\ x + y' = 1 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = -1. \end{cases}$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2009-2010

**I.** Găsiți soluția problemei Cauchy:

$$y''' + y'' - 2y' = \ln(e^x + 1), \quad y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = -1.$$

**II.** Construiți funcția olomorfă  $f$  care verifică:

$$\operatorname{Re}(f(z)) = \varphi\left(\frac{x^2 + y^2}{x}\right), \quad \varphi \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}).$$

**III.** Folosind formulele Euler, calculați:

a) soluția ecuației  $\operatorname{tg}(z) = \frac{5}{3} \cdot i$ ;

b)  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 x}{5 - 3 \cdot \sin x} dx$ .

**IV.** Să se calculeze:

a)  $\int_{|z|=r} \frac{z^2 e^z}{(z-1)^{n+1}} dz, r > 0, n \in \mathbb{N}$ .

b)  $\int_0^\infty \frac{x \cdot \sin x}{x^2 + a^2} dx, a \geq 0$  (discuție după  $a$ ).

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2009-2010

**I.** a) Să se determine  $F \in C^2(\mathbb{R})$  astfel încât

$$F(t(x, y)), \quad t \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}), \quad t(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - x$$

să fie funcție armonică.

b) Să se determine funcția olomorfă  $f = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , știind că

$$u(x, y) = F((t(x, y))), \quad F \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}), \quad t(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - x.$$

**II.** a) Să se determine reziduul funcției  $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z-2}}$  în  $z = 2$ .

b) Să se determine soluțiile ecuației  $\operatorname{tg} z = \frac{5i}{3}$ .

**III.** Să se calculeze integrala  $I$ , folosind teorema reziduurilor:

$$I = \int_{0.25x^2+0.16y^2=0.04} \frac{\operatorname{tg} z}{z^2(z^2+1)} dz.$$

**IV.** Calculați integrala  $J$ , folosind teorema reziduurilor (discuție după  $a$ ):

$$J = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} dx, a \in \mathbb{R}, |a| < 1.$$

**V.** Să se rezolve problema Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) - y(t) = t \\ y''(t) - x(t) = 1. \end{cases} \quad \begin{cases} x(0) = x'(0) = 0 \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2010-2011

**I.** Să se afle soluția generală a sistemului diferențial  $y' = Ay$ . Se dă matricea  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

**II.** a) Să se afle soluția generală a ecuației diferențiale

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = x^2 + 1, \quad x > 0,$$

unde  $y = x$  este o soluție a ecuației *omogene*.

b) Determinați  $\lambda \in \mathbb{R}$  astfel încât ecuația diferențială  $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$  admite o soluție nenulă pe  $(0, \infty)$ , ce îndeplinește condițiile  $y(1) = 0$ ,  $y(e) = 0$ .

**III.** Să se calculeze integrala  $I = \int_{\Gamma:|z|^2=2 \operatorname{Re} z=0} \frac{z^3 e^{z/(z-1)}}{(z-1)^2} dz$ .

**IV.** Calculați  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos x \cos(nx)}{13 - 12 \cos x} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , (discuție după  $n$ ).

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2010-2011

**I.** Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , știind că

$$u(x, y) + v(x, y) = F(t(x, y)), \quad F \in C^2(R), \quad t \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}), \quad t(x, y) = \frac{y}{x}.$$

- II.** a) Să se determine reziduul funcției  $f(z) = z^3 e^{1/(z-3)}$  în  $z = 3$ .  
 b) Să se determine soluțiile ecuației  $\sin z = 2i$ .

**III.** Folosind teorema reziduurilor, să se calculeze integrala:

$$I = \int_{9x^2+25y^2=225} \frac{\sin z}{z^2(z^2+4)} dz.$$

**IV.** Folosind teorema reziduurilor, calculați integrala:

$$I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{b - ia \cos x} dx, \quad a > 0, b > 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

**V.** Să se rezolve problema Cauchy:

$$\begin{cases} y'' + 4y = 4(\cos 2t - \sin 2t), & y = y(t) \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 3. \end{cases}$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profilele electric și mecanic, 2011-2012

- I.** a) Să se determine  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$  astfel încât  $\varphi(t(x, y))$ ,  $t \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ ,  $t(x, y) = x^3 - 3xy^2$  să fie funcție armonică.  
 b) Să se determine funcția olomorfă  $f = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , știind că  $u(x, y) = \varphi(t(x, y))$ ,  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ ,  $t \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ ,  $t(x, y) = x^3 - 3xy^2$ .

- II.** Să se dezvolte în serie Laurent funcția  $f(z) = \frac{z}{\sin z}$  în vecinătatea punctului  $z = \pi$ , precizând coeficienții lui  $(z - \pi)^n$ , pentru  $n = -1$  și  $n = 0$ .  
 b) Să se calculeze integrala  $I$  folosind teorema reziduurilor, unde

$$I = \int_{|z-\pi|=1} \frac{z}{\sin z} dz.$$

**III.** Calculați integrala  $I$ , folosind teorema reziduurilor:

$$I = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^n \sin nt dt.$$

**IV.** Să se rezolve sistemul

$$\begin{cases} x' = x - y + 2 \sin t \\ y' = 2x - y \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}, \quad \text{unde} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t). \end{cases}$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2012-2013

**I.** Calculați integrala complexă:

$$\int_{|z|=R} (z-1)^{2012} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot \frac{z}{z-1}\right) dz,$$

dacă  $R \in (0, \infty)$ ,  $R \neq 1$ .

**II.** Fie  $F : D = \mathbb{R} \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(x, y) = e^x(ax \cos y - by \sin y), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- a) Ce relație trebuie să existe între  $a$  și  $b$  astfel încât  $F$  să fie armonică?  
b) Construiți  $f$  olomorfă,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , astfel încât:

$$\operatorname{Re} f = F(x, y) + \varphi(x^2 - y^2), \quad \varphi \in \mathcal{C}^2(D).$$

**III.** Calculați integrala:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos^2(2012x)}{x^2 - 6x + 13} dx.$$

**IV.** a) Determinați soluția sistemului diferențial  $Y' = AY$ , unde am notat  $Y = Y(t) = (y_1(t), y_2(t), y_3(t))^t$ , dacă  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{pmatrix}$ .

b) Știind că soluția sistemului de la punctul a) satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (1, 9, 0)^t$ , rezolvați în  $\mathbb{C}$  ecuația:

$$\sin z = y_1(t) + y_2(t) + y_3(t).$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2012-2013

**I.** Calculați integrala complexă:

$$\int_{|z|=R} (z-1)^{2012} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} \cdot \frac{z}{z-1}\right) dz,$$

dacă  $R \in (0, \infty)$ ,  $R \neq 1$ .

**II.** Fie  $F : D = \mathbb{R} \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$F(x, y) = e^x(ax \cos y - by \sin y), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- a) Ce relație trebuie să existe între  $a$  și  $b$  astfel încât  $F$  să fie armonică?  
 b) Construiți  $f$  olomorfă,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , astfel încât:

$$\operatorname{Re} f = F(x, y).$$

**III.** Calculați integrala:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin(\frac{\pi}{2}x)}{x^4 + 2x^2 + 1} dx.$$

**IV.** a) Determinați soluția sistemului diferențial  $Y' = AY$ , unde am notat  $Y = Y(t) = (y_1(t), y_2(t), y_3(t))^t$ , dacă  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , iar soluția satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (0, 1, 1)^t$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
 Faza locală, anul II, profil electric, 2013-2014

**I.** Calculați integrala:  $I = \int_{|z|=7} \frac{1}{z^3 \sin z} dz$ .

**II.** Fie  $F : D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y) = ax^2 - by^2 + \cos(ax) \operatorname{sh}(by)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- a) Ce relație trebuie să existe între  $a$  și  $b$  astfel încât  $F$  să fie armonică?  
 b) Construiți  $f$  olomorfă,  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât:  
 $3u + 5v = F(x, y)$  și  $f(0) = 0$ .

**III.** Calculați:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx}{(x^2 + 1)^2} dx$ .

**IV.** Determinați soluția sistemului diferențial  $Y' = AY + b$ , unde am notat  $Y = Y(t) = (y_1(t), y_2(t))^t$ ,  $b = b(t) = (b_1(t), b_2(t))^t$ , dacă  $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $b(t) = (\sin t, \cos t)^t$ , iar soluția sistemului satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (0, 0)^t$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
 Faza locală, anul II, profil mecanic, 2013-2014

**I.** Calculați integrala:  $I = \int_{\gamma} \frac{1}{z^3 \sin z} dz$ , unde  $\gamma$  este curba  $|z| = 7$ .

**II.** Fie  $F : D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y) = ax^2 - by^2$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- a) Ce relație trebuie să existe între  $a$  și  $b$  astfel încât  $F$  să fie armonică?  
 b) Construiți  $f$  olomorfă,  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât:  
 $5u + 3v = F(x, y)$  și  $f(0) = 0$ .

**III.** Calculați integrala:  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 \cos x}{(x^2 - 6x + 13)^2} dx$ .

**IV.** Determinați soluția sistemului diferențial  $Y' = AY + b$ , unde am notat  $Y = Y(t) = (y_1(t), y_2(t))^t$ ,  $b = b(t) = (b_1(t), b_2(t))^t$ , dacă  $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $b(t) = (\sin t, \cos t)^t$ , iar soluția sistemului satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (0, 0)^t$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul II, profil electric, 2014-2015

**I.** Rezolvați sistemul de ecuații diferențiale  $Y' = AY$ ,  $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$ , care satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (0, 0, 3)^t$ , unde  $a \neq 0$ .

**II.** Fie  $u : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u(x, y) = \frac{ax+b}{x^2+y^2}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ .

a) Determinați  $a$  și  $b$  astfel încât  $u$  să fie funcție armonică.

b) Construiți  $f$  olomorfă astfel încât  $\operatorname{Re} f = u$ ,  $f(1) = a$ .

c) Aflați soluția problemei Cauchy  $y'' - 2y' + y = te^t f(t)$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = f(1)$ , unde  $y = y(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

**III.** Calculați  $\int_0^\infty \frac{x^2 \sin^2 x + \cos^2 x}{(x^2 + 1)^2} dx$ .

**IV.** Fie  $I_n = \int_{|z|=R} z^2 \left( \sin \frac{1}{z} + \sin \frac{2}{z} + \dots + \sin \frac{n}{z} \right) dz$ , unde  $R > 0$  și  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Arătați că  $e^{12 I_n} \in \mathbb{Z}$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2014-2015

**I.** Rezolvați sistemul de ecuații diferențiale  $Y' = AY$ ,  $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$ , care satisfacă condiția inițială  $Y(0) = (0, 0, 3)^t$ , unde  $a \neq 0$ .

**II.** Fie  $u : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u(x, y) = \frac{ax+b}{x^2+y^2}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ .

a) Determinați  $a$  și  $b$  astfel încât  $u$  să fie funcție armonică.

b) Construiți  $f$  olomorfă astfel încât  $\operatorname{Re} f = u$ ,  $f(1) = a$ .

**III.** Calculați  $\int_0^\infty \frac{x^2 \sin^2 x}{(x^2 + 1)^2} dx$ .

**IV.** Fie  $I_n = \int_{|z|=R} z^2 \left( \sin \frac{1}{z} + \sin \frac{2}{z} + \dots + \sin \frac{n}{z} \right) dz$ , unde  $R > 0$  și  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Arătați că  $e^{12 I_n} \in \mathbb{Z}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2015-2016

**I.** Dacă  $Y(t) = (x(t), y(t))^T$  este soluția sistemului diferențial

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \leq 0,$$

ce îndeplinește condiția inițială  $Y(0) = (0, 2)^T$ , calculați  $\lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) + y(t))$ .

**II.** a) Construiți funcția  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ , astfel încât:

$$\operatorname{Re}(f) = x^2 - y^2 + e^x \varphi(y), \quad \text{unde } \varphi \in C^2(\mathbb{R}).$$

b) Calculați reziduurile funcției  $g(z) = \frac{f(z)}{(z-1)^2}$ , unde  $f$  este funcția determinată la punctul a), ce satisface condițiile  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ .

**III.** Fie  $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5-4 \cos(nx)}$ , unde  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculați:

a)  $I_1$ .

b)  $I_n$ , pentru  $n \geq 2$ .

**IV.** Calculați integrala complexă  $I_k = \int_{|z|=r, r \neq k} \frac{\sin(k\pi z)}{(z-k)^k} dz$ , unde  $k \in \mathbb{N}^*$ , pentru:

a)  $k = 1$ ;

b)  $k = 2016$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2015-2016

**I.** Dacă  $Y(t) = (x(t), y(t))^T$  este soluția sistemului diferențial

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \leq 0,$$

ce îndeplinește condiția inițială  $Y(0) = (0, 2)^T$ , calculați  $\lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) + y(t))$ .

**II.** a) Construiți funcția  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ , astfel încât:

$$\operatorname{Re}(f) = \varphi(x^2 - y^2) + e^x \cos y, \quad \text{unde } \varphi \in C^2(\mathbb{R}).$$

b) Calculați reziduurile funcției  $g(z) = \frac{f(z)}{(z-1)^2}$ , unde  $f$  este funcția determinată la punctul a), ce satisface condițiile  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ .

**III.** Să se calculeze integrala  $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5-4 \cos(2x)}$ .

**IV.** Calculați integrala complexă  $I_k = \int_{|z|=r, r=2016} \frac{e^{2016z}}{(z-2016)^{2016}} dz$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric matematici speciale, 2016-2017

**I.** Construiți funcția  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât:

$$u + \varphi(v) = x^2 - y^2, \text{ unde } \varphi \in C^2(\mathbb{R}).$$

**II.** Calculați integrala

$$I = \int_{|z|=2} \frac{(z-1)e^{\frac{1}{z-1}} + \sin \pi z}{(z-1)^2} dz.$$

**III.** Calculați, folosind teorema reziduurilor:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \frac{\cos x + \cos(2x) + \dots + \cos(nx)}{5 - 4 \cos x} dx, \text{ unde } n \in \mathbb{N}^*.$$

**IV.** Determinați  $x(t)$  și  $y(t)$ , dacă

$$\begin{cases} x\partial(t) + y(t) - 2 \int_0^t x(s) \sin(t-s) ds = \cos t + \operatorname{sh} t \\ x'(t) + y'(t) = e^t \end{cases}, \quad x(0) = 1, x'(0) = 0, y(0) = 0.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric matematici speciale, 2016-2017

**I.** Dacă  $Y(x) = (y_1(x), y_2(x), y_3(x))^T$  este soluția sistemului diferențial:

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} e^a & 1 & 1 \\ 1 & e^a & 1 \\ 1 & 1 & e^a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R},$$

ce îndeplinește condiția inițială  $Y(0) = (1, 1, 1)^T$ , calculați  $\lim_{x \rightarrow -\infty} Y(x)$ .

**II. a)** Determinați funcția  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât  $f(0) = \frac{1-i}{2}n$  și

$$u = v + e^x \cos y + e^{2x} \cos(2y) + \dots + e^{nx} \cos(ny) \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

**b)** Pentru funcția  $f$  determinată la punctul a), demonstrați că soluțiile ecuației  $f(z) \frac{1-e^z}{e^z} = 1$  sunt pur imaginare.

**III. a)** Dezvoltați în serie Laurent în jurul lui  $z_0 = 0$  funcția  $f(z) = \cos^2 \left( \frac{1}{z} \right)$ .

**b)** Calculați integrala  $I = \int_{|z|=R} z^{2017} \left[ \frac{1}{2} \cos \left( \frac{2}{z} \right) - \cos^4 \left( \frac{1}{z} \right) \right] dx$ , unde  $R > 0$ .

**IV.** Calculați integrala  $I = \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^n} dx$ , unde  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n > 2$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”  
Faza locală, anul II, profil ne-electric matematici speciale, 2016-2017

**I.** Dacă  $Y(x) = (y_1(x), y_2(x), y_3(x))^T$  este soluția sistemului diferențial:

$$Y' = AY, \quad A = \begin{pmatrix} e^a & 1 & 1 \\ 1 & e^a & 1 \\ 1 & 1 & e^a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R},$$

ce îndeplinește condiția inițială  $Y(0) = (1, 1, 1)^T$ , calculați  $\lim_{a \rightarrow -\infty} Y(x)$ .

**II. a)** Determinați funcția  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât  $f(0) = \frac{1-i}{2}n$  și

$$u = v + e^x \cos y + e^{2x} \cos(2y) + \dots + e^{nx} \cos(ny) \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

**b)** Pentru funcția  $f$  determinată la punctul a), demonstrați că soluțiile ecuației  $f(z) \frac{1-e^z}{e^z} = 1$  sunt pur imaginare.

**III. a)** Dezvoltați în serie Laurent în jurul lui  $z_0 = 0$  funcția  $f(z) = \cos^2\left(\frac{1}{z}\right)$ .

**b)** Calculați integrala  $I = \int_{|z|=R} z^{2017} \left[ \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2}{z}\right) - \cos^2\left(\frac{1}{z}\right) \right] dz$ , unde  $R > 0$ .

**IV.** Calculați integrala  $I = \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^n} dx$ , unde  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n > 2$ ,  $a > 0$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”  
Faza locală, - anii I și II - profil electric matematici speciale, 2017-2018

**I.** Construiți  $f$  olomorfă,  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f = u + iv$ , dacă

$$\int_0^x u(t, y) dt = y\varphi(x^2 - y^2), \quad \varphi \in \mathcal{C}^3(\mathbf{R}).$$

**II.** Fie  $I = \int_{|z|=1}^{2018} \sum_{k=1}^{2018} \sin\left(\frac{z}{z + \frac{i}{2^k}}\right) dz$ . Arătați că  $I \in \mathbb{R}$  și  $0 < I < 2\pi$ .

**III.** Calculați  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos((n-1)x)}{(a + \cos x)^n} dx$ ,  $|a| > 1$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .

**IV.** Determinați soluția  $y = y(t)$ , dacă

$$y'' + 4y = \frac{1}{4 + \cos(2t)}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil ne-electric matematici speciale, 2017-2018

**I.** Să se determine funcția  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât  $\operatorname{Re}(f) = u(x, y) = \varphi(v(x, y))$ , unde  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$  și  $u$  nu este funcție constantă.

**II.** Calculați integrala:  $J = \int_{|z|=2} \frac{\sin z + z \cos \frac{1}{z}}{z^2(z-1)} dz$ .

**III.** Fie  $I = \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1}$ . Rezolvați în  $\mathbb{C}$  ecuația:  $\sin z = \frac{6}{\pi} I$ .

**IV.** Să se determine  $x = x(t)$  și  $y = y(t)$ , soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} x + y = \int_0^t \sin(t-s) ds \\ -x' + y'' = \cos t \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = -1, y'(0) = 0. \end{cases}$$

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, - anii I și II - profil electric matematici speciale, 2018-2019

**I.** Fie  $f_1$  și  $f_2$  două funcții olomorfe,  $f_1 = u_1 + iv_1$ ,  $f_2 = u_2 + iv_2$ , astfel încât

$$\begin{cases} u_1(x, y) + v_2(x, y) = e^x \cos y, \\ u_2(x, y) + v_1(x, y) = \operatorname{arctg} \left( \frac{y}{x} \right). \end{cases}$$

a) Determinați  $f_1(z)$  și  $f_2(z)$ .

b) Calculați  $\int_{|z|=R, R \neq 0} z^{2019} \left( f_2 \left( \frac{1}{z} \right) + i f_1 \left( \frac{1}{z} \right) \right) dz$ .

**II.** Calculați  $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z \sin^2 z} dz$ .

**III.** Fie  $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(nx)}{4 + 5 \cos^2 x} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

a) Calculați  $I_0$ . b) Calculați  $I_n$  și demonstrați că  $|I_n| < \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .

**IV.** Fie  $f(t) = \int_0^t x^{a-1} (t-x)^{b-1} dx$ ,  $a, b > 0$ .

a) Calculați transformata Laplace a funcției  $f(t)$ .

b) Arătați că  $\frac{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \cdot t^{a+b-1} = f(t)$ , unde  $\Gamma$  este funcția  $\Gamma$  a lui Euler.

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil ne-electric matematici speciale, 2018-2019

**I.** Să se determine funcția  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât

$$\operatorname{Re}(f) = u(x, y) = 2xy \cdot \varphi(x^2 - y^2),$$

unde  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ .

**II.** Fie

$$I_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R, R>0} z^2 \left[ \operatorname{sh}\left(\frac{1}{z}\right) + \operatorname{sh}\left(\frac{2}{z}\right) + \dots + \operatorname{sh}\left(\frac{n}{z}\right) \right] dz, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Calculați  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{I_n}}{n^2}$ .

**III.** Să se calculeze integrala:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x+1) \sum_{k=1}^n \sin(2k\pi x)}{x^3 + 1} dx, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

**IV.** Folosind transformarea lui Laplace, să se determine  $x = x(t)$  și  $y = y(t)$ , soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} x' = y - \int_0^t x(s) \cos(t-s) ds \\ y' = x + \cos t - 1 \end{cases}, \begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil ne-electric matematici speciale, 2019-2020

**I.** Se consideră funcția de o variabilă complexă  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = az^2 + bz + c$ , unde  $a, b, c \in \mathbb{C}^*$ , astfel încât  $|a| + |c| = |b|$  și  $\arg a + \arg c = 2\arg b$ .

a) Să se demonstreze că ecuația  $f(z) = 0$  are o soluție  $z_1$  cu proprietatea  $|z_1| = 1$ .

b) Dacă  $f$  este o funcție cu proprietățile de la a), astfel încât  $a = 1$  și  $c = -1$ , să se calculeze următoarea integrală, folosind teorema reziduurilor:

$$I = \int_{|z+i|=1} \frac{e^{\frac{1}{f(z)}} dz}{zf(z)}.$$

**II.** Să se calculeze următoarea integrală, folosind teorema reziduurilor:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(2nx) + \sin(2nx)}{(5 + 3 \sin x)^2} dx, \quad \text{unde } n \in \mathbb{N}.$$

**III.** Să se determine funcția  $f : \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z = 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f$  olomorfă,  $f = f(z)$ ,  $f = u + iv$ , astfel încât  $u(x, y) = \frac{x}{y}v(x, y)$ .

**IV.** a) Să se determine constantele  $n \in \mathbb{N}$  și  $\mathcal{C} \in \mathbb{R}$  astfel încât

$$\underbrace{\theta(t) * \cdots * \theta(t)}_{n \text{ funcții}} = \mathcal{C}t^8,$$

unde  $\theta(t)$  este funcția Heaviside,  $\theta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$ , iar  $"*"$  este produsul de conoluție.

b) Folosind  $n \in \mathbb{N}$  determinat la a), să se rezolve problema Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) - y(t) = \int_0^1 (t-s)e^s ds \\ y(0) = n - 10. \end{cases}$$

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

**Notă.** Timp de lucru 3 ore. Se vor rezolva la alegere trei subiecte.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2002-2003

**I.** Folosind teorema reziduurilor, să se calculeze integrala  $I = \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx$ .

**II.** Să se rezolve problema Cauchy  $\begin{cases} x''(t) + 2x'(t-2) + x(t-4) = t \\ x(0) = x'(0) = 0. \end{cases}$

**III.** Fie  $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \lambda \\ 0, & x > \lambda \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \mu \\ 0, & x > \mu, \end{cases}$ , unde  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+^*$ .

a) Să se arate că funcțiile  $f$  și  $g$  admit transformate Fourier (notează  $F_c, G_c$ ) prin cosinus și să se calculeze acestea,

$$F_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \cos(\xi x) dx, \quad G_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty g(x) \cos(\xi x) dx.$$

b) Să se demonstreze relația

$$\int_0^\infty F_c(\xi)G_c(\xi)d\xi = \int_0^\infty f(x)g(x)dx.$$

c) Folosind punctul b) să se arate că  $\int_0^\infty \frac{\sin \lambda t \cdot \sin \mu t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2} \min(\lambda, \mu)$ .

**IV.** a) Să se dezvolte în serie Fourier trigonometrică funcția:

$$f(x) = \frac{a \cos x - a^2}{1 - 2a \cos x + a^2}, \quad -1 < a < 1.$$

b) Folosind seria Fourier a funcției  $f$  și formula lui Parseval, să se demonstreze că:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} \right)^2 dx = \frac{\pi}{1 - a^2}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2002-2003

**I.** a) Determinați funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , știind că

$$v(x, y) = \varphi(t(x, y)), \quad \varphi \in C^2(\mathbb{R}), \quad t \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*), \quad t(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{y}.$$

b) Să se calculeze  $I = \int_{\gamma} \frac{e^{1/z}}{(1-z)^2} dz$ ,  $\gamma : |z| = r$ ,  $r > 0$ ,  $r \neq 1$ .

**II.** Pentru fiecare  $r \in [0, 1)$  fixat, fie  $f(\theta) = \frac{1 - r^2}{2(1 - 2r \cos \theta + r^2)}$ . Să se dezvolte  $f$  în serie Fourier.

**III.** a) Să se calculeze transformata Fourier prin cosinus a funcției

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{(x^2 + 4)^2}.$$

b) Folosind (eventual) rezultatul obținut la punctul a), să se calculeze transformata Fourier prin sinus a funcției  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{x}{(x^2 + 4)^2}$ .

**IV.** Folosind transformarea Laplace, să se rezolve ecuația integrală

$$\varphi(t) - \int_0^t e^{t-u}(t-u) \cdot \varphi(u) du = \cos t.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2003-2004

**I.** Să se calculeze valoarea integralei  $\int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + 1)^{2004}} dx$ .

**II.** Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u + iv$ , știind că

$$v(x, y) = e^x \sin y - \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0), \quad f(1) = e.$$

**III.** Să se dezvolte în serie Fourier trigonometrică funcția

$$f(\theta) = \frac{a \sin \theta}{a^2 - 2a \cos \theta + 1}, \quad |a| < 1.$$

**IV.** Să se calculeze transformatele Fourier prin sinus și cosinus ale funcției  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = e^{-at}$ ,  $a > 0$ , prelungind convenabil funcția  $f$  pe toată axa reală.

**V.** Folosind transformarea Laplace, să se rezolve problema Cauchy

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\dot{x} + x + \ddot{y} + \dot{y} + y = 1 \\ 2\dot{x} + 2x + \ddot{y} + 2\dot{y} = 2t \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 2 \\ y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = -2, \end{cases}$$

unde  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2004-2005

**I.** Să se studieze convergența și în caz afirmativ să se calculeze integrala

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}}{1+x} dx.$$

**II.** Fie funcția  $f(t) = \begin{cases} 1, & 2nl < t < (2n+1)l \\ -1, & (2n+1)l < t < (2n+2)l \end{cases}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- a) Să se dezvolte  $f$  în serie Fourier de sinusuri;
- b) Să se calculeze transformata Laplace a funcției  $f$ ;
- c) Utilizând teoreme de inversare să se regăsească funcția  $f$  ca serie Fourier.

**III.** a) Să se arate că există transformata Fourier prin sinus a funcției  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  și să se calculeze aceasta.

b) Folosind punctul a) să se rezolve ecuația integrală  $\int_0^\infty g(t) \sin tx dt = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ,  $x > 0$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2004-2005

**I.** a) Știind că partea reală  $u(x, y)$  a unei funcții olomorfe  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$  este de forma  $u(x, y) = \varphi(t(x, y))$ , unde  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ ,  $t : \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $t(x, y) = \frac{y}{x}$ , să se determine funcția  $f(z)$ .

b) Să se calculeze  $I = \int_{|z-1|=r} z^2 \sin \frac{\pi}{z} dz$ ,  $r \in (0, 2)$ ,  $r \neq 1$ .

**II.** Să se dezvolte în serie Fourier funcția  $f : (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{\pi}{2 \operatorname{sh} \pi} e^t$ .

Din dezvoltarea obținută, să se determine suma seriei numerice  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}$ .

**III.** Folosind transformarea Laplace să se rezolve problema Cauchy:

$$\begin{cases} x'' - 2x' + 5x = e^t \cos 2t \\ x(0) = x'(0) = 1. \end{cases}$$

**IV.** Să se arate că transformata Fourier prin sinus a funcției  $xe^{-x^2/2}$  coincide cu ea însăși.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2005-2006**

**I.** Fie funcția  $v(x, y) = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ . Verificați dacă  $v$  este funcție armonică, și determinați funcția olomorfă  $f$ , cu  $\operatorname{Im} f = v(x, y)$ ,  $f(0) = 0$ . Pentru  $f$  astfel determinat, calculați:  $\int_{|z|=r} \frac{f(1/z)}{1-z} dz$ .

**II.** Dezvoltați în serie Fourier trigonometrică, pe  $[-\pi, \pi]$ , funcția:  $f(x) = \operatorname{ch}(ax)$ ,  $a > 0$ , și determinați suma seriilor  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + a^2)^2}$ .

**III.** Determinați funcția  $f$ , dacă

$$\int_0^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt = \frac{1}{(1 + \omega^2)^2}, \quad \omega > 0.$$

**IV.** Rezolvați ecuația diferențială:  $y'' + 4y = f(t)$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = a$  unde  $a \in \mathbb{R}$ , iar  $f(t) = \begin{cases} 1, & t \in [2, 3] \\ 0, & t \notin [2, 3]. \end{cases}$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
**Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2005-2006**

**I. a)** Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , știind că  $u(x, y) = \varphi(x^2 - y^2)$ ,  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$  și  $f(0) = 0$ ,  $f(i) = -1$ .

b) Fie  $g(z) = \frac{f(z) \cdot e^{2/z}}{z^2 - z}$ . Să se calculeze  $\operatorname{Rez}(g, 1)$ .

c) Să se calculeze  $\operatorname{Rez}(g, 0)$ .

d) Să se calculeze  $\int_{|z|=2} g(z) dz$ .

**II.** Fie funcția  $f(x) = \frac{\sin x}{5 + 4 \cos x}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Să se dezvolte  $f$  în serie Fourier pe intervalul  $(-\pi, \pi)$ .

**III. a)** Să se calculeze transformata Fourier a funcției  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{-x^2/a^2}$ , ( $a \in \mathbb{R}^*$ ).

b) Să se calculeze transformatele Fourier prin sinus și cosinus pentru funcția

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} 0, & \text{pentru } x < 0 \\ e^{-x}, & \text{pentru } x \geq 0. \end{cases}$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2006-2007

**I.** a) Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  știind că

$$u(x, y) = \operatorname{Re} f = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), \quad \varphi \in C^2.$$

b) Folosind teorema reziduurilor, să se calculeze integrala  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$ .

**II.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{\sin t}{5 + 3 \cos t}$ .

a) Să se dezvolte funcția  $f$  în serie Fourier trigonometrică.

b) Să se regăsească dezvoltarea de la a), utilizând o dezvoltare Laurent în coroană pentru o funcție complexă atașată funcției  $f$ .

**III.** Să se rezolve ecuația integrală  $x(t) = \cos t + \int_0^t (t - \tau) e^{t-\tau} x(\tau) d\tau$ , utilizând transformarea Laplace.

**IV.** Să se rezolve ecuația integrală  $\int_0^\infty \varphi(u) \cos(ux) du = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos x, & x \in (0, \pi) \\ -\frac{\pi}{4}, & x = \pi \\ 0, & x > \pi. \end{cases}$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2006-2007

**I.** Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ , dacă

$$v(x, y) = \operatorname{Im} (f) = \operatorname{arctg} \left( \frac{y}{x} \right), \quad f(1) = 0, \quad \text{unde } v \in C^2(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}).$$

**II.** Folosind teorema reziduurilor, calculați  $\int_{|z|=R} \frac{e^{1/z}}{z(1-z)} dz$ ,  $R > 0$ ,  $R \neq 1$ .

**III.** Cu ajutorul transformării Laplace, determinați  $y(t)$ , dacă  $\begin{cases} y'' - 2y' + y = t \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1. \end{cases}$

**IV.** Calculați transformata Fourier pentru funcția  $f(x) = e^{-x^2/2}$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2007-2008

**I.** Fie funcția  $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + e^x \cdot \cos y$ .

a) Arătați că  $u(x, y)$  este funcție armonică.

b) Construiți  $f(z)$  olomorfă pe  $\mathbb{C}^*$ ,  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ , unde  $u(x, y)$  este funcția precizată în enunț, cu condiția  $f(1) = e$ .

c) Fie  $R \in (0, \infty) \setminus \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} \right\}$ . Calculați integrala:

$$I = \int_{|z-\frac{1}{2}|=R} \frac{f(z) - 2 \ln z}{z^2(z+i)} dz,$$

unde  $f$  este funcția olomorfă determinată la punctul b).

**II.** Calculați integrala  $I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x \cdot e^{inx}}{(13 - 5 \cos x)^2} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**III.** Să se rezolve ecuația diferențială:

$$x'' - 2x' + x = e^t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1,$$

folosind transformarea Laplace.

**IV.** Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x' = -x + y + z \\ y' = x - y + z \\ z' = x + y + z, \end{cases}$$

unde  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$  și care verifică condițiile inițiale

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 1.$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profil electric, 2008-2009

**I.** Se consideră ecuația diferențială  $x''' + (2a - 1)x'' + (a^2 + 3)x' + (a^2 + 3a)x = 1$ , unde  $a \in \mathbb{R}$  este un parametru.

a) Să se determine valorile lui  $a$  pentru care ecuația are soluțiile stabile spre  $\infty$ .

b) Pentru  $a = 1$ , să se determine, folosind transformarea Laplace, soluția  $x(t)$  pe  $(0, \infty)$  a ecuației, astfel încât  $x(0_+) = x'(0_+) = x''(0_+) = 0$ .

**II.** Fie  $D$  un disc deschis în planul complex.

a) Să se arate că o funcție olomorfă  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  are primitive și că orice două primitive diferă printr-o constantă.

b) Dacă  $F$  este o primitivă a unei funcții  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , are loc relația

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1).$$

c) Să se determine  $a, b \in \mathbb{R}$  dacă  $a + ib = \int_0^{\frac{\pi}{2} + i} \sin z dz$ .

**III.** Să se determine seria Fourier atașată funcției  $f(x) = \frac{1}{5 - 4 \cos z}$  pe  $[-\pi, \pi]$ , să se studieze natura convergenței acestei serii și să se calculeze  $\int_{|z|=3} \frac{dz}{5 - 4 \cos z}$ .

**IV.** Fie  $f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$  cu  $a_i \in \mathbb{C}, i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$ .

- a) Să se calculeze  $I_k = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^k} dz$  și  $J_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-ikt} dt$  pentru  $0 \leq k \leq n$ .  
 b) Dacă toți  $a_i \in \mathbb{R}$ , să se arate că au loc relațiile

$$\int_{-1}^1 f(x)^2 dx = -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt; \quad \int_0^1 f(x)^2 dx \leq 2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
 Faza națională, anul II, profil mecanic, 2008-2009

**I.** Se consideră ecuația diferențială  $x''' + (2a - 1)x'' + (a^2 + 3)x' + (a^2 + 3a)x = 1$ , unde  $a \in \mathbb{R}$  este un parametru.

- a) Să se determine valorile lui  $a$  pentru care soluțiile sunt stabile pentru  $t \rightarrow \infty$ .  
 b) Pentru  $a = 1$ , să se determine, folosind transformarea Laplace, soluția  $x(t)$  pe  $(0, \infty)$  a ecuației, astfel încât  $x(0_+) = 0, x'(0_+) = 0, x''(0_+) = 0$ .

**II. a)** Să se determine  $\left\{ z \in \mathbb{C} \mid \cos z = \frac{5}{4} \right\}$ ;

b) Să se dezvolte în serie Fourier funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{1}{5 - 4 \cos t}$ ;

c) Să se calculeze  $\int_{|z-i|=1} \frac{dz}{5 - 4 \cos z}$ .

**III.** Fie sistemul  $x' = f(x, y); y' = g(x, y)$  cu  $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , funcții de clasă  $C^1$  cu soluții  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(t) = (x(t), y(t))$ .

- a) Un punct  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  se numește echilibru dacă funcția  $\varphi(t) = (a, b)$  este soluție. Să se arate că  $(a, b)$  este echilibru dacă și numai dacă  $f(a, b) = 0, g(a, b) = 0$ .  
 b) Să se arate că două orbite sunt sau disjuncte, sau coincid.  
 (Se numește orbită imaginea oricărei soluții.)

c) Să se rezolve sistemul  $x' = y, y' = -x$ .

**IV.** Fie  $f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$  cu  $a_i \in \mathbb{C}, i = 0, 1, 2, \dots, n$ .

a) Să se calculeze

$$I_k = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^k} dz \text{ și } J_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-ikt} dt,$$

pentru  $0 \leq k \leq n$ .

b) Dacă toți  $a_k \in \mathbb{R}$ , să se arate că

$$\int_{-1}^1 f(x)^2 dx = -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt \quad \text{și că} \quad \int_0^1 f(x)^2 dx \leq 2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2009-2010

**I.** a) Se consideră ecuația diferențială:  $tx''(t) + x'(t) + tx(t) = 0$ .

Să se arate că ecuația admite o unică soluție serie de puteri convergentă pe  $\mathbb{R}$ , care respectă condiția  $x(0) = 1$ .

b) Să se rezolve problema Cauchy:  $\begin{cases} x' = 2x + y + 2z \\ y' = -x - 2z \\ z' = x + y + 2z \end{cases}$ , unde  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,

$z = z(t)$  și  $x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = 1$ .

**II.** Să se determine funcția olomorfă:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy, \quad x > 0,$$

știind că  $f(1) = 0$ ,  $f(e) = 1 - i$  și  $u(x, y) + v(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ , unde  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție de două ori derivabilă pe  $\mathbb{R}$ .

**III.** Rezolvați ecuația integrală:

$$x'(t) - 2 \int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = \int_0^t (t - \tau) \sin \tau d\tau,$$

știind că  $x(0) = 0$  și  $t > 0$ .

**IV.** Să se dezvolte în serie Fourier trigonometrică funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{\cos^2 x}{5 + 4 \sin x}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2010-2011

**I. a)** În coordonate polare  $(\rho, \theta)$ , sistemul Cauchy-Riemann este  $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \theta}, \end{cases}$ , iar operatorul lui Laplace are expresia  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$ . Să se determine funcția olomorfă  $f(z) = u(\rho, \theta) + iv(\rho, \theta)$ , unde  $z = \rho e^{i\theta}$  știind că  $u(\rho, \theta) = \varphi(\operatorname{tg}\theta)$ , unde  $\varphi$  este o funcție de două ori diferențiabilă.

b) Calculați:  $\int_{|z|=r} \frac{e^{1/(z-a)}}{z(z-a)^2} dz, \quad r > 0, r \neq a, a \in \mathbb{R}$ .

**II.** Să se rezolve următoarea ecuație integrală, utilizând transformarea Laplace

$$\varphi''(t) + \int_0^t 4e^{4(t-u)} \varphi'(u) du = \sin(5t),$$

cu condițiile inițiale  $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ .

**III.** Rezolvați ecuația integrală  $\int_0^\infty \varphi(t) \sin(ut) dt = \frac{u}{(u^2 + a^2)^2}, \quad u > 0, a > 0$ .

**IV.** Fie  $f : (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2s\pi} \cdot e^x$ .

a) Să se dezvolte funcția  $f$  în serie Fourier.

b) Folosind dezvoltarea obținută la punctul a), calculați sumele seriilor numerice

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \quad \text{și} \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+1}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul II, profil inginerie, 2011-2012

**I.** Calculați:  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos(2012x) + \sin(2012x)}{3 + 2 \cos x} dx$ .

**II.** Calculați:  $\int_{|z|=R} z^{2012} \sin\left(\frac{1}{z}\right) dx, \quad R > 0$ .

**III.** a) Determinați soluția  $f(t), t > 0$  a următoarei ecuații integrale:

$$\int_0^\infty f(t) \sin(\omega t) dt = e^{-a\omega}, \quad a > 0.$$

b) Considerând  $f(t) = F[g(\omega)]$ , unde  $g$  este funcția original, să se determine  $g(\omega)$ .

**IV.** Rezolvați următoarea ecuație integrală:

$$\int_0^t f(\tau) \cdot (t - \tau) d\tau + \int_0^t f(t - \tau) \cdot \tau d\tau = t^2.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul II, profil inginerie, 2012-2013

**I.** Fie funcția  $u(x, y) = e^{nx} \cdot (x \cos ny - y \sin ny)$ ,  $n$  număr natural.

a) Construiți  $f$  olomorfă,  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ , care verifică condiția  $f(1) = e^n$ .

b) Fie  $g : D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  o funcție olomorfă și fie  $\varphi$  o funcție reală de clasă  $C^2(\mathbb{R})$ . Aflați  $\varphi(t)$  astfel încât  $\operatorname{Re}(f) = \varphi(\operatorname{Im}(g))$ , unde  $f$  este funcția determinată la punctul a).

c) Fie  $R > 0$ . Calculați integrala  $\int_{|z|=R} \frac{e^{1/z} \cdot f(z)}{z^3 \cdot e^{nz}(z+2i)} dz$ .

**II.** Folosind transformarea Laplace, să se determine soluția problemei Cauchy

$$x''(t) + 2 \cdot x'(t) + x(t) = \frac{e^{-t}}{t+1}; \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1.$$

**III.** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{5 - 4 \sin x}$ .

a) Să se dezvolte funcția  $f$  în serie Fourier trigonometrică.

b) Să se calculeze  $\int_{\pi}^{3\pi} \frac{\cos((2n+1) \cdot x)}{5 - 4 \sin x} dx$ ,  $n$  număr natural.

**IV.** a) Să se calculeze transformata Fourier a funcției  $f_k(x) = e^{-|x|} \cdot x^k$ ,  $k$  număr natural.

b) Calculați transformata Fourier,  $\hat{g}(\omega)$ , a funcției  $g(x) = e^{-|x|} \cdot \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!}$  în punctul  $\omega = 1$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profil inginerie, 2013-2014

**I.** Să se rezolve:  $ty'' - 2y' + ty = -2 \operatorname{ch} t$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ .

**II.** Fie  $f : [-\pi; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^{\cos x} \cos(\sin x)$ . Să se dezvolte funcția  $f$  în serie Fourier trigonometrică.

**III.** Să se calculeze  $\int_{|z|=1} \frac{z \sin z + i \sin(\bar{z})}{z^{2n} + a} dz$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|a| < 1$ .

**IV.** Să se rezolve ecuația integrală  $\int_0^\infty f(x) \cos(\omega x) dx = \frac{1}{(\omega^2 + a^2)^2}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profil inginerie, 2014-2015

**I.** Determinați funcțiile  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  olomorfe,  $f = u + iv$ , unde  $u(x, y) = xy^2 + y\varphi(x)$ ,  $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$  și  $f$  are rădăcină dublă pe  $z = 1$ .

**II.** Calculați  $I = \int_0^\pi \frac{\cos^2(nx) - \frac{1}{2}}{\cos x - \cos(\frac{\pi}{2n})} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**III.** Să se rezolve ecuația integrală  $\int_0^t \frac{x(\tau)}{\sqrt{t-\tau}} d\tau = t^n, \quad n \in \mathbb{N}, t > 0.$

**IV.** Aflați funcția  $g$ , soluție a ecuației integrale  $\int_0^\infty g(u) \sin(u \cdot t) du = e^{-t}, \quad t > 0.$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profil inginerie, 2015-2016

Enunțuri

**I.** Construiți funcția  $f$  olomorfă pe  $D$ ,  $f = u + iv$ , ( $i^2 = -1$ ), dacă  $v(x, y) = \varphi(u(x, y)) + \cos x \cdot \operatorname{ch} y$ , unde  $\varphi \in C^2(D)$ .

**II.** a) Calculați  $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos^4(nx)}{5 - 3 \cdot \sin x} dx, n \in \mathbb{N}$ .

b) Determinați  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ .

**III.** Se consideră ecuația  $t \cdot y''(t) + (1-t) \cdot y'(t) + n \cdot y(t) = 0, t \geq 0, n \in \mathbb{N}$ .

a) Determinați soluția  $y_n(T)$ , care este funcție original Laplace, împreună cu derivatele sale și care verifică  $y_n(0) = 1$ .

b) Să se arate că există numerele întregi  $a_n, b_n, c_n$ , astfel încât  $a_n \cdot y_{n+1}(t) + (t - b_n) \cdot y_n(t) + c_n \cdot y(t) = 0, t \geq 0, n \geq 1$ .

**IV.** Fie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x - [x + \frac{1}{2}]]|$ , unde  $[\cdot]$  reprezintă partea întreagă, iar  $|\cdot|$  reprezintă funcția modul.

a) Arătați că  $f$  este periodică, de perioadă  $T = 1$ .

b) Dezvoltați funcția  $f$  în serie Fourier pe  $\mathbb{R}$ .

c) Calculați  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil matematici speciale, 2016-2017

**I.** Să se rezolve problema Cauchy

$$\begin{cases} x_1'' = x_2 + x + 3 + \cdots + x_n \\ x_2'' = x_1 + x + 3 + \cdots + x_n \\ x_n'' = x_1 + x + 2 + \cdots + x_{n-1} \end{cases} \quad x_k \in C^2(\mathbb{R}), x_k(0) = k, x_k'(0) = \frac{1}{2}(n-1)^{3/2}, k = \overline{1, n}.$$

**II.** a) Calculați

$$\int_{|z|=1} \frac{(z+1)^n}{z^{k+1}} dz, \quad k, n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

b) Calculați  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} C_{2n}$ .

**III.** Să se calculeze transformata Fourier pentru:  $f(t) = \frac{\sin^2 \frac{3t}{2}}{t^2}$ .

**IV.** Fie  $y \in C^2(0, \infty)$  astfel ca  $y, y'$  și  $y''$  sunt funcții original pentru care  $y(0+)$  și  $y(0-)$  să fie finite. Fie  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin:

$$f(t) = 2ty''(t) + y'(t) + 2y(t)$$

și  $f = \mathcal{L}\{f\}$ .

- a) Să se calculeze  $F$  dacă  $y(t) = \sin(2\sqrt{t})$ ,  $\forall t > 0$ .
- b) Să se găsească  $y$  pentru care  $F$  este funcție constantă.

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul II, profil inginerie, 2016-2017

Enunțuri

**I.** Determinați funcțiile olomorfe  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = f(x+iy) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ , pentru care  $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 2 \cdot e^x \cdot \cos y$ .

**II.** Se consideră funcția  $f : D \subset \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = \frac{z^{12} \cdot \sin(\frac{3\pi i}{z})}{(z^2 + 2)^5 \cdot (z^2 + iz + 6)}$ .

a) Stabiliți domeniul  $D$  de definiție, precizând natura punctelor singulare (inclusiv natura punctului de la infinit).

b) Calculați  $I = \int_{|z|=2} f(z) dz$ .

**III.** Să se determine transformata Laplace a funcției original

$$f(t) = \int_0^1 e^x \cdot (t-x)^3 \cdot [\sin(t-x)]^{(n)} dx, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

**IV.** a) Desvoltăți în serie Fourier funcția  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $f(x) = \ln(1 - 2a \cos x + a^2)$ ,  $|a| < 1$ .

b) Calculați  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil matematici speciale, 2017-2018

**I.** Să se calculeze integrala  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2t}{\sinh(\pi t)} dt$ .

**II.** a) Folosind, eventual, trecerea în coordonate polare, să se determine funcția olomorfă  $f$ , știind că

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot \varphi \left( \operatorname{arctg} \left( \frac{y}{x} \right) \right), \quad \varphi \in C^2(\mathbb{R})$$

și că  $f$  verifică condițiile  $f(0) = 0$  și  $f(1) = 1$ .

b) Să se determine valoarea integralei  $I = \int_{|z|=1} e^{\frac{1}{z^2}} \cdot (f(z+1))^n dz$ , unde funcția  $f$  este determinată la punctul a).

**III.** Să se determine funcția originală  $f(t)$  a transformatei Laplace  $F(s) = e^{-\sqrt{s}}$ , arătând în prealabil că:  $4sF''(s) + 2F'(s) - F(s) = 0$ .

**III.** Calculați integrala  $\int_{||z||=1} \frac{1}{(1-e^{-z})^n} dz$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profil inginerie, 2017-2018

Enunțuri

**I.** a) Arătați că toate rădăcinile ecuației  $z^4 + \alpha z^3 + \alpha z + 1 = 0$  sunt de modul 1, pentru orice număr real  $\alpha \in (-1, 1)$ .

b) Să se calculeze integrala

$$\int_{|z|=R} \frac{2z+3}{(z-2)(z^4 + \alpha z^3 + \alpha z + 1)} dz, \quad \alpha \in (-1, 1) \quad \text{și} \quad R > 0.$$

**II.** Să se determine soluția  $y = y(x)$  a ecuației diferențiale:

$$x \cdot y'' + (2x+3) \cdot y' + (x+3) \cdot y = 0,$$

care verifică condiția inițială  $y(0) = y_0$  și transformata Laplace a funcției  $y = y(x)$  satisfacă condiția  $L[y(x)](0) = y_0$ .

**III.** Calculați integrala  $I_n = \int_0^{2\pi} \sin(nx) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) dx$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**IV.** Fie funcția

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-ax}, & x > 0 \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

a) Să se calculeze transformatele Fourier  $\hat{f}_s(\omega)$  și  $\hat{f}_c(\omega)$ .

b) Să se calculeze integrala

$$\int_0^{+\infty} [\hat{f}_c(\omega) \cdot \cos(\omega x) + \hat{f}_s(\omega) \cdot \sin(\omega x)] d\omega, \quad x \geq 0.$$

c) Să se calculeze integrala  $\int_0^{+\infty} \hat{f}_c(\omega) \cdot \hat{f}_s(\omega) \cdot \sin(\omega x) d\omega$ ,  $x \geq 0$ .

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”  
Faza națională, anul I, profil matematici speciale, 2018-2019

**I.** a) Să se determine funcția olomorfă  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  cu proprietățile

$$|f(z)| = (x^2 + y^2)(\operatorname{ch}^2 x \cos^2 y + \operatorname{sh}^2 x \sin^2 y), \quad z = x + iy \quad \text{și} \quad f(\pi i) = -\pi^2.$$

b) Să se calculeze  $\int_0^\pi \operatorname{Re}(f(e^{i\theta})) \cos n\theta d\theta$ , unde  $n \in \mathbb{N}$  și  $f(z) = z^2 \operatorname{ch}^2 z$ .

**II.** Să se calculeze

$$\int_{|z|=R} \frac{z}{(1 - \cos z) \sin z} dz,$$

unde  $0 < R < 5$ .

**III.** Să se determine  $y(t)$ , soluție a ecuației diferențiale

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(tx)}{1+x^2} dx, \quad t \geq 0,$$

cu condițiile inițiale  $y(0) = 1$  și  $y'(0) = 1$ .

**IV.** Se consideră funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|} \cos x}{[1 + (x-t)^2]^2} dx.$$

a) Calculați transformata Fourier a funcției  $f$  în punctul 1.

b) Calculați integrala

$$\int_0^\infty f(t) \cos t dt.$$

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”  
Faza națională, anul II, profil inginerie, 2018-2019

**I.** Să se calculeze valoarea integralei

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{\operatorname{ch} x}, \quad a \in \mathbb{R}^*.$$

**II.** Să se calculeze:

$$\int_0^\pi \frac{\cos x \cos(nx)}{5 - 4 \cos x} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

**III.** a) Să se rezolve ecuația:

$$x(t) + 2 \int_0^t x(u) du + \int_0^t \left( \int_0^\lambda x(\mu) d\mu \right) d\lambda = t, \quad t \geq 0.$$

b) Fie  $x(t)$  soluția de la punctul a). Dezvoltați în serie Fourier de sinusuri această funcție pe  $[0, \pi]$ .

**IV.** Să se afle funcția  $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  continuă, care satisface ecuația integrală

$$\int_0^\infty g(u) \cos(ux) du = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2 + 1}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

**Notă.** Timp de lucru 4 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.

## Rezolvări

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2002-2003

**I.** Avem  $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \cdot e^{-y^2/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot e^{-y^2/x^2} = 0$  și  $f(0, y) = 0$ , deci  $f$  continuă în punctul  $(0, y)$ .

b) Avem

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0, \end{cases}$$

deci

$$\alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2 \cdot e^{-y^2/x^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Se observă că  $|\alpha(x, y)| = \frac{x^2 \cdot e^{-y^2/x^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ . Deoarece  $e^{y^2/x^2} \geq \frac{y^2}{x^2} + 1$  și  $\frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1$ , rezultă

$$|\alpha(x, y)| = \frac{x^2 \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \left( \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^3 \cdot |x| \leq |x| \rightarrow 0,$$

pentru  $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ , deci  $f$  este diferențială Fréchet în  $(0, 0)$ .

c) Deoarece  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot e^{-y^2/x^2}}{x} = 0$ , și similar

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, a) = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(0, y) - f(0, a)}{y - a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{0 - 0}{y - a} = 0,$$

deci

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} 2e^{-y^2/x^2} \left( x + \frac{y^2}{x} \right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} -2y \cdot e^{-y^2/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Dar  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = 0$  și

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2e^{-y^2/x^2} \left( x + \frac{y^2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left( x + \frac{y^2}{x} \right)}{e^{y^2/x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left( 1 - \frac{y^2}{x^2} \right)}{e^{y^2/x^2} \cdot \frac{-2y^2}{x^3}} = 2 \cdot 0 \cdot \frac{0}{-2y^2} = 0,$$

deci  $\frac{\partial f}{\partial x}$  este continuă în  $(0, y)$ ; în concluzie,  $\frac{\partial f}{\partial x}$  este continuă peste tot. Analog, avem  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, y) = 0$  și  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} -2y \cdot e^{-y^2/x^2} = -2y \cdot 0 = 0$  deci  $\frac{\partial f}{\partial y}$  continuă în  $(0, y)$ , și deci continuă peste tot.

d)  $g(x, y, z) = f(1, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) = f(1, \beta)$ , unde am notat  $\beta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ . Obținem

$$\text{grad } g = \left( \frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) = \left( \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{x}{\beta}, \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{y}{\beta}, \frac{\partial f}{\partial \beta} \cdot \frac{z}{\beta} \right)$$

deci

$$\langle \text{grad } g, \bar{r} \rangle = x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} + z \frac{\partial g}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial \beta} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{\partial f}{\partial \beta} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\partial f}{\partial \beta} \beta.$$

**II.**  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$ ,  $x \in \mathbb{R}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . a) Fie  $a_n = \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$ . Calculăm raza de convergență  $\rho$  a seriei. Avem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(n+1)^{\alpha}(\ln(n+1))^{\beta}} n^{\alpha} (\ln n)^{\beta} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^{\alpha} \left( \frac{\ln n}{\ln(n+1)} \right)^{\beta} = 1 \cdot 1 = 1, \end{aligned}$$

deci raza de convergență este  $\rho = \frac{1}{1} = 1$ .

b)  $\beta = 0 \Rightarrow a_n = \frac{1}{n^{\alpha}}$ . Intervalul de convergență este  $I = (-\rho, \rho) = (-1, 1)$ .

i) Pentru  $x = -1$  avem  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}} = \begin{cases} \text{convergentă, } \alpha > 0 \text{ (Leibniz)} \\ \text{divergentă, } \alpha \leq 0 \text{ (crit. de necesitate).} \end{cases}$

ii) Pentru  $x = 1$  avem  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = \begin{cases} \text{convergentă, } \alpha > 1 \\ \text{divergentă, } \alpha \leq 1 \end{cases}$ .

În concluzie, distingem cazurile:

- dacă  $\alpha \leq 0$  atunci  $M = (-1, 1)$ ;
- dacă  $0 < \alpha \leq 1$  atunci  $M = [-1, 1)$ ;
- dacă  $\alpha > 1$  atunci  $M = [-1, 1]$ .

c) Dacă  $\alpha = 1$ , atunci obținem  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n)^{\beta}}$ , deci  $a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\beta}}$ .

Intervalul de convergență este  $I = (-1, 1)$ .

• Pentru  $x = -1$ , avem  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^{\beta}} = \begin{cases} \text{convergentă, } \beta > 0 \text{ (Leibniz)} \\ \text{divergentă, } \beta \leq 0 \text{ (crit. de necesitate).} \end{cases}$

- Pentru  $x = 1$  avem  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\beta}}$  = divergent,  $\forall \beta \in \mathbb{R}$ , deoarece pentru  $\beta < 0$ , rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n)^{-\beta} = \infty \neq 0$  și  $\beta \geq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\ln n)^{\beta}} = \infty \neq 0$  și conform criteriului de comparație,  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\beta}}$  are aceeași natură cu  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ , care este divergentă.

În concluzie, avem cazurile:

- dacă  $\beta > 0$  atunci  $M = [-1, 1]$ ;
- dacă  $\beta \leq 0$  atunci  $M = (-1, 1)$ .

d)  $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ , pentru  $|x| < 1$ ; rescriem egalitatea:  $\sum_{n \geq 1} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$ ,  $|x| < 1$  și integrând, obținem

$$\sum_{n \geq 1} \int_0^x t^{n-1} dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt \Leftrightarrow \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad |x| < 1,$$

deci  $f(x) = -\ln(1-x)$ ,  $D_f = (-1, 1)$ . Se observă că pentru  $x = 1$ ,  $f(1) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  este divergentă, iar pentru  $x = -1$ , avem  $f(-1) = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$  convergentă și domeniul maxim de definiție este  $[-1, 1]$ .

**III.**  $A = \begin{pmatrix} -\cos t & \sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . a) Avem

$$\text{Ker } T \neq \{0\} \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow -a \cos^2 t + \cos t - a \sin^2 t = 0 \Leftrightarrow a = \cos t.$$

b) Pentru  $t = \pi$ ,  $a = \cos \pi = -1$  determinăm Ker  $T$ ; ecuația  $T(x, y, z) = O_{\mathbb{R}^3}$  se rescrie  $\begin{cases} x = 0 \\ -y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \\ y = z \end{cases}$ , deci

$$\text{Ker } T = \{(x, y, z) \mid x = 0, y = z\} = \{(0, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((0, 1, 1)).$$

Determinăm Im  $T$ . Din egalitatea  $T(x, y, z) \equiv (x, -y + z, y - z) = (\alpha, \beta, \gamma)$  rezultă  $\gamma = -\beta$ ; deci

$$\text{Im } T = \{(\alpha, \beta, \gamma) \mid \gamma = -\beta\} = \{(t, s, -s) \mid t, s \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((1, 0, 0), (0, 1, -1)).$$

c) Pentru  $a = 1$ ,  $t = \frac{\pi}{2}$  avem  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Polinomul caracteristic al acestei

matrice este  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda - 1$ .

Rezolvăm ecuația caracteristică  $P_A(\lambda) = 0$ . Fie  $g(\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda - 1$ . Atunci  $g'(\lambda) \equiv -3\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3} \right\}$ . Dar  $g\left(\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}\right) = \frac{-7 \pm 14\sqrt{7}}{27}$ , deci avem tabelul Rolle

$x$	$-\infty$	$\frac{1 - \sqrt{7}}{3}$	$\frac{1 + \sqrt{7}}{3}$	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\frac{-7 - 14\sqrt{7}}{27}$	$\frac{-7 + 14\sqrt{7}}{27}$	$-\infty$

deci ecuația  $g(\lambda) = 0$  are trei soluții reale,  $\lambda_1 \in \left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{7}}{3}\right)$ ,  $\lambda_2 \in \left(\frac{1 - \sqrt{7}}{3}, \frac{1 + \sqrt{7}}{3}\right)$ ,  $\lambda_3 \in \left(\frac{1 + \sqrt{7}}{3}, +\infty\right)$ . Se observă că  $g(-2) = 7 > 0$ ,  $g(-1) = -1 < 0$ , iar  $g(0) = -1 < 0$ ,  $g(1) = 1 > 0$ ,  $g(2) = -1 < 0$ , deci  $\lambda_1 \in (-2, -1)$ ,  $\lambda_2 \in (0, 1)$ ,  $\lambda_3 \in (1, 2)$ .

d) Polinomul caracteristic al matricei  $A$  este  $P(\lambda) = -(\lambda^2 - 1)(\lambda - a)$ , deci valorile proprii sunt  $\{\pm 1, a\}$ . Distingem două cazuri: (i) dacă  $a \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ , atunci matricea este diagonalizabilă (valorile proprii fiind distincte, multiplicitatea geometrică și algebraică ale acestora coincid); (ii)  $a \in \{\pm 1\}$ . În acest caz, pentru valoarea proprie dublă

$\lambda = a$ , matricea  $A - aI_3 = \begin{pmatrix} -\cos t \mp a & \sin t & 0 \\ \sin t & \cos t - a & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  are rangul 2 (minorul de

ordin doi din cloțul dreapta-jos este nul), deci multiplicitatea geometrică este 1, mai mică decât cea algebraică (2, valoarea proprie fiind dublă), deci în acest caz  $A$  nu este diagonalizabilă. În concluzie,  $A$  este diagonalizabilă dacă și numai dacă  $a \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ .

e) Pentru  $a = 1$ ,  $t = \frac{\pi}{2}$  avem  $(A + I_3)^{10} \cdot (A - I_3)^2 + A$ . Avem  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda + 1$ . Folosind teorema Cayley-Hamilton, rezultă  $P_A(A) = O_3 \Rightarrow A^3 - A^2 - 2A + I_3 = O_3$ , deci  $(A + I_3)(A - I_3)^2 = A$  și, prin urmare, rezultă

$$\begin{aligned} (A + I_3)^{10} \cdot (A - I_3)^2 + A &= (A + I_3)^9 \cdot A + A = (A + I_3)^{10} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{10} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 9 & 13 & 11 \\ 12 & 19 & 18 \\ 13 & 26 & 32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 13 & 11 \\ 12 & 19 & 18 \\ 13 & 26 & 32 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 13 & 11 \\ 12 & 19 & 18 \\ 13 & 26 & 32 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**IV.** a)  $f(\varphi_1(y, z), y, z) = 0$ . Derivând în raport cu  $x$ , obținem  $\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ , deci  $\frac{\partial \varphi_1}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}}$  ⇒  $\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(b, c) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c)}{\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c)}$ . Analog, rezultă  $\frac{\partial \varphi_2}{\partial z}(a, c) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c)}{\frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c)}$ ,  $\frac{\partial \varphi_3}{\partial x}(a, b) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c)}{\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c)}$ , de unde, prin înmulțirea celor trei egalități, rezultă relația  $\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(b, c) \cdot \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}(a, c) \cdot \frac{\partial \varphi_3}{\partial x}(a, b) = -1$ .

b) Avem  $F(x, a, b) = x^7 + ax + b$ . Verificăm condițiile teoremei funcțiilor implicate:

$$\begin{cases} F(1, 1, -2) = 1 + 1 - 2 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x} = 7x^6 + a \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x}(1, 1, -2) = 7 + 1 = 8 \neq 0 \\ F \in C^1(\mathbb{R}^3; \mathbb{R}). \end{cases}$$

Rezultă că există  $U_0 \in \mathcal{V}((1, -2))$  și  $V_0 \in \mathcal{V}(1)$  și o unică funcție  $\varphi : U_0 \rightarrow V_0$  astfel încât

$$\begin{cases} \varphi(1, -2) = 1 \\ F(\varphi(a, b), a, b) = 0, \forall (a, b) \in U_0 \\ \varphi \in C^1(U_0, V_0), x = \varphi(a, b). \end{cases}$$

c) Din relația  $F(\varphi(a, b), a, b) = 0$ , prin derivare în raport cu  $x$  rezultă  $\frac{\partial F}{\partial x}(x, a, b) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial a}(a, b) + \frac{\partial F}{\partial a}(x, a, b) = 0$ , deci obținem

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a}(a, b) = \frac{-\frac{\partial F}{\partial a}(x, a, b)}{\frac{\partial F}{\partial x}(x, a, b)} = \frac{-x}{7x^6 + a} = \frac{-\varphi(a, b)}{7\varphi^6(a, b) + a} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial b}(a, b) = \frac{-\frac{\partial F}{\partial b}(x, a, b)}{\frac{\partial F}{\partial x}(x, a, b)} = \frac{-1}{7x^6 + a} = \frac{-1}{7\varphi^6(a, b) + a}. \end{cases}$$

d)  $F(x, 1, -2) = 0 \Leftrightarrow x^7 + x - 2 = 0$ . Notând  $g(x) = x^7 + x - 2$  obținem  $g'(x) = 7x^6 + 1 > 0$ ,  $\forall z \in \mathbb{R}$ ;  $g$  fiind continuă și strict crescătoare pe  $\mathbb{R}$ , rezultă că ecuația  $g(x) = 0$  are soluție unică și se observă că aceasta este  $x = 1$ .

e) Folosim metoda contractiei: se observă că ecuația se rescrie sub forma  $x(x^6 + 0.99) = 2.03$ , deci  $x = \frac{2.03}{x^6 + 0.99}$ . Atunci funcția  $g : [1.004, 1.008] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{2.03}{x^6 + 0.99}$  este o contractie. Prima iterare folosind valoarea inițială  $x_0 = 1.004$ , este  $x_1 = g(x_0) \sim 1.0078$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2003-2004

**I.** a) Funcția  $f(x, y) = \operatorname{arctg}(x+y)$  se dezvoltă în serie Taylor în jurul unui punct  $(x_0, y_0)$ ,  $f(x, y) = f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) + R_f$ , unde

$$R_f = \frac{1}{2!} d^2 f(\xi_1, \xi_2)(x - x_0, y - y_0)^2, \quad \xi_1 \in (x, x_0), \quad \xi_2 \in (y, y_0).$$

Avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+(x+y)^2}$ , deci

$$\begin{aligned} df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) &= \frac{1}{1 + (x_0 + y_0)^2}(x + y - x_0 - y_0), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{-2(x + y)}{[1 + (x + y)^2]^2}, \end{aligned}$$

deci

$$d^2 f(\xi_1, \xi_2)(x - x_0, y - y_0)^2 = \frac{-2(\xi_1 + \xi_2)}{[1 + (\xi_1 + \xi_2)^2]^2} (x + y - x_0 - y_0)^2.$$

Atunci, pentru  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ , rezultă  $f(x, y) = 0 + x + y + R_f$ , unde

$$R_f = \frac{-2(\xi_1 + \xi_2)}{[1 + (\xi_1 + \xi_2)^2]^2} (x + y)^2, \quad \xi_1 \in (x, 0), \quad \xi_2 \in (y, 0)$$

și deci

$$f(x, y) \simeq x + y \Rightarrow |f(x, y) - x - y| = \frac{2(x + y)^2}{[1 + (\xi_1 + \xi_2)^2]^2} |\xi_1 + \xi_2| \leq x^2 + y^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

b)  $g(x) = \int_0^x \left( \operatorname{arctg}(t) + \frac{1}{1+t^2} \right) dt \Rightarrow g'(x) = \operatorname{arctg}(x) + \frac{1}{1+x^2}$ . Dar  $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$ , deci  $\operatorname{arctg}(x) = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ . Rezultă

$$g'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( x^{2n} + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) \Rightarrow g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)} \right).$$

c) Folosind punctul b), rezultă

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)} \right) dx = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} + \frac{1}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)} \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+4}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)}. \end{aligned}$$

Dar

$$\frac{2n+4}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)} < 10^{-2} = \frac{1}{100} \Leftrightarrow 100(2n+4) < (2n+1)(2n+2)(2n+3).$$

Inegalitatea este falsă pentru  $n = 4$  ( $1200 \not< 990$ ) și este adevărată pentru  $n = 5$  ( $1400 < 11 \cdot 12 \cdot 13 = 2716$ ), deci aproximarea corectă se realizează cu primii 5 termeni ai sumei.

**II. a)** Relația din enunț se rescrie

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 4x + 2z + 1 \Leftrightarrow (x-2)^2 + 2y^2 + (z+1)^2 = 4,$$

de unde rezultă  $(z+1)^2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq z+1 \leq 2 \Leftrightarrow -3 \leq z \leq 1 \Leftrightarrow z \in [-3, 1]$ .

**b)** Aducem ecuația cuadricei la forma canonică (redusă)

$$(x-2)^2 + 2y^2 + (z+1)^2 = 4 \Leftrightarrow \frac{(x-2)^2}{4} + \frac{y^2}{2} + \frac{(z+1)^2}{4} = 1,$$

deci efectuând translația de reper  $Oxyz \rightarrow OXYZ$  dată de relațiile  $\begin{cases} X = x - 2 \\ Y = y \\ Z = z + 1, \end{cases}$ , se obține în noile coordonate ecuația redusă  $\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{2} + \frac{Z^2}{4} = 1$ , ecuația unui elipsoid de rotație cu axa de rotație  $OY$ .

c) Fie  $x + 2y - z + a = 0$  un plan paralel cu  $x + 2y - z = 0$ . Impunem condiția ca sistemul ce descrie intersecția cuadricei cu planul  $\begin{cases} (x - 2)^2 + 2y^2 + (z + 1)^2 = 4 \\ x + 2y - z - a = 0 \end{cases}$  să aibă soluție unică. Substituim  $y = \frac{a+z-x}{2}$  în prima ecuație, și obținem

$$3z^2 + z(2a - 2x + 4) + 3x^2 - 2ax - 8x + 2 + a^2 = 0.$$

Soluția  $z$  este unică în cazul în care discriminantul ecuației este nul, deci atunci când  $8x^2 - 4x(a + 5) + 2(a - 1)^2 = 0$ . Anularea discriminantului conduce la relațiile:

$$\Delta' = 0 \Leftrightarrow 4(a + 5)^2 - 16(a - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow 3(7 - a)(a + 1) = 0 \Leftrightarrow a \in \{-1, 7\}.$$

Distingem cazurile:

- i) Dacă  $a = -1$ , atunci  $x = \frac{-16}{-16} = 1$ ;  $z = 0$ ,  $y = -1$ , deci punctul  $(1, -1, 0)$ .
- ii) Dacă  $a = 7$ , atunci  $x = \frac{-48}{-16} = 3$ ;  $z = \frac{-12}{6} = -2$ ;  $y = 1$ , deci punctul  $(3, 1, -2)$ .

**III. a)**  $f_4 \in L(\{f_1, f_2, f_3\})$  d.n.d. există  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , nu toate nule, astfel încât

$$f_4 = af_1 + bf_2 + cf_3 \Leftrightarrow af_1 + bf_2 + cf_3 - 1 = 0,$$

deci curba se află în planul  $\pi_1 : ax + by + cz - 1 = 0$ , care nu trece prin origine, deoarece  $O(0, 0, 0)$  nu satisfacă ecuația planului. Familia  $\{f_1, f_2, f_3\}$  este liniar dependentă  $\Leftrightarrow \exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , nu toate nule, a.î.  $\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0$ , deci curba se află în planul  $\pi_2 : \alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ , care conține originea ( $O(0, 0, 0)$  satisfacă ecuația lui  $\pi_2$ ). Deci curba este inclusă în dreapta  $\Delta = \pi_1 \cap \pi_2$ , aflată la intersecția celor două plane distincte ( $O \in \pi_2 \setminus \pi_1$ ).

b) Construim un drum parametrizat  $\alpha(t)$  care să unească  $P$  cu  $Q$ . O alegere posibilă este segmentul ce unește cele două puncte,

$$[PQ] : \frac{x - 2}{2} = \frac{y - 1}{3} = \frac{z - 1/3}{7/3} = t, \quad x \in [2, 4],$$

care admite parametrizarea  $\alpha(t) = (2t + 2, 3t + 1, (7t + 1)/3)$ ,  $t \in [0, 1]$ . Viteza pe acest segment este  $\alpha'(t) = (2, 3, \frac{7}{3})$ , iar lungimea sa este

$$l = \int_0^1 \sqrt{2^2 + 3^2 + \left(\frac{7}{3}\right)^2} dt = \frac{\sqrt{166}}{3}.$$

*Altfel.* Lungimea  $l$  este distanța dintre punctele  $P(2, 1, \frac{1}{3})$  și  $Q(4, 4, \frac{8}{3})$ , deci

$$l = d(P, Q) = \sqrt{(4 - 2)^2 + (4 - 1)^2 + \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{166}}{3}.$$

**IV.** a) Se verifică direct că transformarea  $f$  este liniară. Prin calcul direct, obținem

$$\begin{aligned}
 f(\varphi)(x) &= \int_0^{2\pi} [1 + \sin(x-t)] \cdot \varphi(t) dt = \\
 &= \int_0^{2\pi} \varphi(t) dt + \int_0^{2\pi} (\sin x \cdot \cos t - \sin t \cdot \cos x) \cdot \varphi(t) dt = \\
 &= \underbrace{\int_0^{2\pi} \varphi(t) dt}_{I_1} + \sin x \cdot \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos t \cdot \varphi(t) dt}_{I_2} + \cos x \cdot \underbrace{\left( - \int_0^{2\pi} \sin t \cdot \varphi(t) dt \right)}_{I_3} = \\
 &= I_1 + I_2 \cdot \sin x + I_3 \cdot \cos x, \quad I_1, I_2, I_3 \in \mathbb{R},
 \end{aligned}$$

deci  $\text{Im } f = \{C_1 + C_2 \cdot \sin x + C_3 \cdot \cos x \mid C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}\}$ , și deci o bază în  $\text{Im } f$  este  $\{1, \sin x, \cos x\}$ .

b) Folosind punctul a), avem  $\varphi \in \text{Ker } f \Leftrightarrow f(\varphi(x)) = 0, \forall x \in [0, 2\pi]$ , adică

$$I_1 + I_2 \cdot \sin x + I_3 \cdot \cos x = 0, \quad \forall x \in [0, 2\pi] \Leftrightarrow I_1 = 0, I_2 = 0, I_3 = 0,$$

deci

$$\int_0^{2\pi} \varphi(t) dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} \varphi(t) \cdot \cos t dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} \varphi(t) \cdot \sin t dt = 0.$$

Atunci, folosind dezvoltarea în serie trigonometrică Fourier, rezultă

$$\text{Ker } f = \left\{ \varphi \in C[0, 2\pi] \mid \varphi(t) = \sum_{n=2}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt), a_n, b_n \in \mathbb{R}, n \geq 2 \right\}.$$

c) Pentru  $\lambda = 0$  (valoare proprie), subspațiul propriu este  $\text{Ker } T$ . Pentru o valoare proprie  $\lambda \neq 0$ , un vector propriu  $\varphi$  asociat valorii proprii satisfac relațiile echivalente:

$$f(\varphi) = \lambda \varphi \Leftrightarrow \varphi = \frac{1}{\lambda} f(\varphi), \quad \text{deci } \varphi \in \text{Im } f \Rightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R} \text{ nu toate nule, astfel încât}$$

$$\varphi(x) = a + b \sin x + c \cos x, \quad \forall x \in [0, 2\pi].$$

Atunci egalitatea  $f(\varphi) = \lambda \varphi$  se scrie

$$\begin{aligned}
 &\int_0^{2\pi} (a \cos t + b \sin t \cos t + c \cos^2 t) dt \cdot \sin x + \int_0^{2\pi} (a \sin t + b \sin^2 t + c \sin t \cos t) dt = \\
 &= \lambda(a + b \sin x + c \cos x), \quad \forall x \in [0, 2\pi].
 \end{aligned}$$

Identificând în egalitate coeficienții familiei liniar independente  $\{1, \sin x, \cos x\}$ , obținem relațiile:

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 \left( at \Big|_0^{2\pi} - b \cos t \Big|_0^{2\pi} + c \sin t \Big|_0^{2\pi} \right) = \lambda a \\
 \left( a \sin t \Big|_0^{2\pi} + b \frac{\sin^2 t}{2} \Big|_0^{2\pi} + c \frac{t + \frac{\sin 2t}{2}}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) = \lambda b \\
 \left( -a \cos t \Big|_0^{2\pi} + b \frac{t - \frac{\sin 2t}{2}}{2} \Big|_0^{2\pi} + c \frac{\sin^2 t}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) = \lambda c
 \end{array}
 \right. \Leftrightarrow \left\{
 \begin{array}{l}
 2\pi a = \lambda a \\
 \pi c = \lambda b \\
 \pi b = \lambda c
 \end{array}
 \right. \Leftrightarrow \left\{
 \begin{array}{l}
 a(\lambda - 2\pi) = 0 \\
 \lambda b - \pi c = 0 \\
 \lambda c - \pi b = 0.
 \end{array}
 \right.$$

Se disting cazurile:

- i)  $a = 0$ . Subcazuri:
  - $b = 0 \Rightarrow \lambda c = 0$ . Dar s-a presupus  $\lambda \neq 0$  deci  $c = 0 \Rightarrow \varphi = 0$ , posibil.
  - $b \neq 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\pi c}{b}$ . Folosind ultima ecuație, rezultă

$$c^2 = b^2 \Leftrightarrow c = \pm b \Rightarrow \lambda = \pm\pi.$$

Pentru  $\lambda = \pi$  avem

$$b = c \Rightarrow \varphi(t) = b(\cos t + \sin t), \quad b \in \mathbb{R},$$

iar  $S_{\lambda=\pi}$  admite drept bază vectorul  $\{\cos t + \sin t\}$ . Pentru  $\lambda = -\pi$  avem  $b = -c$ , deci  $\varphi(t) = b(\cos t - \sin t)$ ,  $b \in \mathbb{R}$ , iar  $S_{\lambda=-\pi}$  admite baza  $\{\cos t - \sin t\}$ .

- $a \neq 0 \Rightarrow \lambda = 2\pi$ . Ultimele două ecuații conduc la

$$\begin{cases} 2b = c \\ 2c = b \end{cases} \Leftrightarrow b = c = 0,$$

deci  $\varphi(t) = a$ ,  $\forall t \in [0, 2\pi]$ , iar  $S_{\lambda=2\pi}$  admite baza  $\{1\}$ .

În concluzie,  $f$  admite valorile proprii  $\lambda_1 = \pi$ ,  $\lambda_2 = -\pi$ ,  $\lambda_3 = 2\pi$ , iar bazele subspațiilor proprii asociate sunt:

$$B_1 = \{\cos x + \sin x\}, \quad B_2 = \{\cos x - \sin x\}, \quad B_3 = \{1\}.$$

Se observă că toate cele trei subspații proprii sunt incluse în  $\text{Im } f = L(\{1, \sin x, \cos x\})$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2004-2005

**I. a)**  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\arctg(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ . Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\arctg(x^2)}{x^2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg(x^2) - x^2}{x^3} \stackrel{0}{=} \\ &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^4} \cdot 2x - 2x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^4}{x(1+x^4)} = 0. \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\arctg(y^2)}{y^2} - 1}{y} = 0.$$

b)  $\alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 0 - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\frac{\arctg(x^2+y^2)}{x^2+y^2} - 1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ . Atunci  $\sqrt{x^2+y^2} = t \rightarrow 0$  pentru  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow 0$  ( $t > 0$ ). Deci, folosind un raționament identic cu cel de la punctul a),

$$\lim_{x,y \rightarrow 0} \alpha(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\arctg(t^2)}{t^2} - 1}{t} = 0$$

deci  $f$  este diferențială Fréchet în  $(0, 0)$ .

c) Pentru  $(x, y) \neq (0, 0)$ , avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\frac{1}{1+(x^2+y^2)^2} \cdot 2x \cdot (x^2+y^2) - \operatorname{arctg}(x^2+y^2) \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}$ , deci notând  $t = x^2 + y^2$ , obținem:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial x} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} 2x \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\frac{1}{1+(x^2+y^2)^2} - \operatorname{arctg}(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} 2x \cdot \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\frac{t}{1+t^2} - \operatorname{arctg} t}{t^2} \stackrel{0}{=} \\ &\stackrel{0}{=} 0 \cdot \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\frac{1+t^2-2t^2}{(1+t^2)^2} - \frac{1}{1+t^2}}{2t} = 0 \cdot \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{-t}{(1+t^2)^2} = 0 \cdot 0 = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \end{aligned}$$

deci  $\frac{\partial f}{\partial x}$  este continuă în  $(0, 0)$ . Analog,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  este continuă în  $(0, 0)$ .

d) Fie  $h(x) = \operatorname{arctg} x \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ . Dar

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n, |x| < 1 \Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}, |x| < 1,$$

iar

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, |x| < 1 \Rightarrow \operatorname{arctg}(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot x^{4n+2}, |x| < 1.$$

Atunci

$$g(x) = \int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot t^{4n} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot \frac{t^{4n+1}}{4n+1} \Big|_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(4n+1)} \cdot x^{4n+1},$$

serie de puteri cu coeficienții  $a_n = \frac{(-1)^n}{(2n+1)(4n+1)}$ . Determinăm raza de convergență,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+3)(4n+5)}{(2n+1)(4n+1)} \right| = 1$ . Intervalul de convergență este deci  $(-1, 1)$ . Dacă  $x = -1$ , atunci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{(2n+1)(4n+1)}$  este convergentă conform criteriului Leibniz. Analog, pentru  $x = 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{(2n+1)(4n+1)}$  rezultă convergentă. În concluzie, mulțimea de convergență este  $[-1, 1]$ .

e) Avem  $g(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(4n+1)}$ . Atunci

$$\begin{aligned} \left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)(4n+1)} \right| < 10^{-3} &\Leftrightarrow (2n+1)(4n+1) > 1000 \Leftrightarrow 8n^2 + 6n + 1 > 1000 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 8n^2 + 6n - 999 > 0 \Leftrightarrow n \in \mathbb{N} \cap \left( \frac{-3 + \sqrt{8001}}{8}, \infty \right) \Leftrightarrow n \in \{11, 12, \dots\}. \end{aligned}$$

**II. a)**  $f(x, y, z) = x^n + y^n + z^n - 3xy + z^2 - 2z$ . Aflăm punctele critice ale funcției

$f$ , acestea satisfac sistemul:  $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = n \cdot x^{n-1} - 3y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = n \cdot y^{n-1} - 3x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = n \cdot z^{n-1} + 2z - 2 = 0 \end{cases}$ . Distingem cazurile:

i) Dacă  $n = 1$ , atunci  $\begin{cases} 1 - 3y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{3} \\ 1 - 3x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \end{cases}$ , deci  $A = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$  este punct critic. Matricea hessiană în acest punct este  $H_f = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , deci

$$d^2f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) = (dx, dy, dz)H_f\begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = -6dxdy + 2dz^2,$$

deci  $A$  nu este punct de extrem.

ii) Dacă  $n = 2$ , atunci  $\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 2y - 3x = 0 \\ 4z - 2 = 0 \end{cases}$ , de unde  $B = (0, 0, \frac{1}{2})$  este punct critic, iar matricea hessiană în  $B$  este  $H_f = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ , iar

$$d^2f\left(0, 0, \frac{1}{2}\right) = 2dx^2 + 2dy^2 + 4dz^2 - 6dxdy = 2\left(dx - \frac{3}{2}dy\right)^2 - \frac{5}{2}dy^2 + 4dz^2.$$

Această formă pătratică nu are semn constant, deci  $B$  nu este punct de extrem.

iii) Dacă  $n = 3$ , atunci  $\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2 \\ 3y^2 - 3x = 0 \\ 3z^2 + 2z - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z \in \left\{ \frac{\pm\sqrt{7}-1}{3} \right\} = \{z_{1,2}\}$ .

Din primele două ecuații rezultă  $x^4 - x = 0$ , cu soluțiile posibile  $x = y = 0$ , sau  $x = y = 1$ . Matricea hessiană este:

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 6x & -3 & 0 \\ -3 & 6y & 0 \\ 0 & 0 & 6z+2 \end{pmatrix} \Rightarrow H_f(0, 0, z_1) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6z_1+2 \end{pmatrix},$$

de unde rezultă  $C_1 = (0, 0, z_1)$  nu este punct de extrem. Analog,  $C_2 = (0, 0, z_2)$  nu este punct de extrem. Avem  $H_f(1, 1, z_1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6z_1+2 \end{pmatrix}$  deci

$$\begin{aligned} d^2f(1, 1, z_1) &= 6dx^2 + 6dy^2 - 6dxdy + (6z_1 + 2)dz = \\ &= (\sqrt{3}dx - \sqrt{3}dy)^2 + 3dx^2 + 3dy^2 + (6z_1 + 2)dz^2 > 0, \end{aligned}$$

deci  $C_3 = (1, 1, z_1)$  este punct de minim local. În al patrulea punct  $C_4 = (1, 1, z_2)$  avem:  $H_f(1, 1, z_2) = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6z_2+2 \end{pmatrix}$ , deci

$$d^2f(1, 1, z_2) = 6dx^2 + 6dy^2 - 6dxdy + (6z_2 + 2)dz^2 = 6(dx - \frac{1}{2}dy)^2 + \frac{9}{2}dy^2 + (6z_2 + 2)dz^2.$$

Dar  $6z_2 + 2 = -2\sqrt{7} - 2 + 2 = -2\sqrt{7} < 0$ , deci  $d^2 f(1, 1, z_2)$  nu are semn constant și deci  $(1, 1, z_2)$  nu este punct de extrem. În concluzie,  $n_{\min} = 3$ .

b) Avem  $f(0, 0, 1) = 0$ , iar pentru  $n = 4$ ,

$$f(x, y, z) = 0 \Rightarrow x^4 + y^4 + z^4 - 3xy + z^2 - 2z = 0. \quad (2)$$

Notăm  $z = z(x, y)$  și derivăm (2) în raport cu  $x$ . Obținem:

$$4x^3 + 4z^3 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 3y + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad (3)$$

de unde rezultă  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3y - 4x^3}{4z^3 + 2z - 2}$ . Derivăm (2) în raport cu  $y$  și obținem:

$$4y^3 + 4z^3 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - 3y + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad (4)$$

de unde rezultă  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3x - 4y^3}{4z^3 + 2z - 2}$ . Punctele critice ale funcției  $z(x, y)$  se obțin rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3y - 4x^3 = 0 \\ 3x - 4y^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{4x}{3} \\ 3x - \frac{256x^9}{27} = 0. \end{cases}$$

Din a doua ecuație obținem:  $x \left( 3 - \frac{256x^8}{27} \right) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ 0, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ . Punctele staționare sunt deci:  $(0, 0)$ ,  $\left( \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ ,  $\left( -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ .

c) Derivăm (3) în raport cu  $x$  și obținem

$$12x^2 + 12z^2 \cdot \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + 4z^3 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0,$$

deci  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{-12x^2 - 12z^2 \cdot \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2 \cdot \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2}{4z^3 + 2z - 2}$ . Derivăm (3) în raport cu  $y$  și obținem

$$12z^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 4z^3 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 3 + 2 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

deci  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{3 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} (6z^2 + 1)}{4z^3 + 2z - 2}$ . Derivăm (4) în raport cu  $y$ ; rezultă

$$12y^2 + 12z^2 \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + 4z^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

deci  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{-12y^2 - 2 \cdot \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 (6z^2 + 1)}{4z^3 + 2z - 2}$ . Atunci  $d^2 z(0, 0) = 0 \cdot dx^2 + 0 \cdot dy^2 + 2 \cdot \frac{3}{4} dxdy = \frac{3}{2} dxdy$ , și deci  $(0, 0)$  nu este punct de extrem pentru  $z(x, y)$ .

**III.** a) Matricea  $A = \frac{1}{2}(B + B^t)$  este simetrică, deci toate rădăcinile polinomului caracteristic sunt reale. Fie  $\lambda$  o valoare proprie pentru  $A$ . Atunci  $Ax = \lambda x$  și deci  $Q(x) = X^t AX = \lambda X^t X \geq 0 \Leftrightarrow \lambda \geq 0$ .

b) Pentru  $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -5 \\ 1 & 8 & 1 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ , rezultă  $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ . Polinomul caracteristic al matricii  $A$  este  $\det(A - \lambda I_3) = -\lambda(\lambda - 9)^2 = 0$ , deci  $\lambda_1 = 9$  ( $\mu_{\lambda_1} = 2$ ) și  $\lambda_2 = 0$  ( $\mu_{\lambda_2} = 1$ ). Determinăm subspațiile proprii asociate valorilor proprii. Pentru  $\lambda_1 = 9$ , sistemul caracteristic asociat este

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 2y - 4z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \\ -4x + 2y - 4z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow b = 2a + 2c, \quad a, c \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a, b, c) = (a, 2a + 2c, c) = c(0, 2, 1) + a(1, 2, 0), \quad a, c \in \mathbb{R}.$$

Alegem vectorii proprii liniar independenți  $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Pentru  $\lambda_2 = 0$ , avem

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 5a + 2b - 4c = 0 \\ a + 4b + c = 0 \\ -4a + 2b + 5c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a = c = -2b, \quad b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a, b, c) = (-2b, b, -2b) = b(-2, 1, -2), \quad b \in \mathbb{R}.$$

Alegem vectorul propriu  $v_3 = (-2, 1, -2)^t$ . S-a obținut astfel baza diagonalizatoare a matricei  $A$  dată de  $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ , a cărei matrice modală (matricea de schimbare la baza diagonalizatoare) este  $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ , iar  $D = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  este matricea diagonală.

c) Ortogonalizăm baza primului subspățiu propriu, apoi normăm reunirea bazelor celor două subspații. Obținem:  $v_1' = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^t$  și

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1 = (1, 2, 0)^t - \frac{4}{5} \cdot (0, 2, 1)^t = \left(1, \frac{2}{5}, \frac{-4}{5}\right)^t \parallel (5, 3, 4)^t,$$

deci

$$v_2' = \frac{1}{\|\tilde{v}_2\|} \tilde{v}_2 = \left(\frac{5}{9\sqrt{5}}, \frac{2}{9\sqrt{5}}, \frac{-4}{9\sqrt{5}}\right)^t, \quad v_3' = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^t.$$

Baza cerută este  $B' = \{v_1', v_2', v_3'\}$ , iar matricea modală este  $C' = \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{9\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{9\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-4}{9\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ .

d) Avem

$$\Sigma : (x, y, z) \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \underbrace{(10, 4, 8)}_{A_1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 22 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 + 8y^2 + 5z^2 + 4xy - 8xz + 4yz + 10x + 4y - 8z - 22 = 0.$$

Cuadrice este degenerată fără centru de simetrie, deoarece  $\det \begin{pmatrix} A & A_1^t \\ A_1 & -22 \end{pmatrix} = 0$  și  $\det A = 0$ ). Pentru a afla ecuația redusă a acesteia aplicăm metoda valorilor proprii. Efectuăm schimbarea de coordonate (rotația de reper  $Oxyz \rightarrow Ox'y'z'$  de

$$\text{matrice } C') X = C'X' \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5y'/9\sqrt{5} - 2z'/3 \\ y = 2x'/\sqrt{5} + 2y'/9\sqrt{5} + z'/3 \\ z = x'/\sqrt{5} - 4y'/9\sqrt{5} - 2z'/3 \end{cases}, \text{ unde } X = (x, y, z)^t,$$

$X' = (x', y', z')^t$ , iar  $C'$  este matricea de la punctul c. Înlocuind  $X$  în  $\Sigma$ , se obține  $\Sigma: y'^2 + 4\sqrt{5}y' + 9x'^2 - 22 = 0$ , care prin restrângerea pătratului în  $y'$  devine:

$$9x'^2 + (y' + 2\sqrt{5})^2 = 42. \text{ În urma translației de reper } Ox'y'z' \rightarrow O''x''y''z'' \text{ dată de relațiile } \begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + 2\sqrt{5} \\ z'' = z' \end{cases}, \text{ ecuația cuadricei devine } \frac{9x''^2}{42/9} + \frac{y''^2}{42} = 1, \text{ deci se obține}$$

un cilindru eliptic cu generatoarele paralele cu  $O''z''$ .

**IV. a)**  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \cos \theta + x_3 \sin \theta - 1, x_2 + 1, -x_1 \sin \theta + x_3 \cos \theta - 1)$ . Avem

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(y)\|_2 &= \\ &= \|(x_1 - y_1) \cos \theta + (x_3 - y_3) \sin \theta, x_2 - y_2, -(x_1 - y_1) \sin \theta + (x_3 - y_3) \cos \theta\|_2 = \\ &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \\ &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2} = \|x - y\|_2. \end{aligned}$$

b) Obținem

$$\begin{aligned} f(x) &= (x_1 \cos \theta + x_3 \sin \theta - 1, x_2 + 1, -x_1 \sin \theta + x_3 \cos \theta - 1) = \\ &= (x_1 \cos \theta + x_3 \sin \theta, x_2, -x_1 \sin \theta + x_3 \cos \theta) + (-1, 1, -1), \end{aligned}$$

$$\text{deci } f(x)^t = R(x_1, x_2, x_3)^t + V, \text{ unde } R = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ și } V = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

c) Polinomul caracteristic asociat matricei  $R$  este

$$P(\lambda) = \det(R - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1).$$

Deci  $P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{1, e^{\pm i\theta}\}$ . Determinăm subspațiile proprii pentru complexificata

$R^{\mathbb{C}}$  a transformării  $R$ . Pentru  $\lambda_1 = 1$  obținem sistemul caracteristic

$$\begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & 0 & \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} (\cos \theta - 1)a + c \sin \theta = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a = c = 0; b \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a, b, c) = (0, b, 0) = b(0, 1, 0), b \in \mathbb{R}.$$

Alegem vectorul propriu generator  $v_1 = (0, 1, 0)^t$ . Pentru  $\lambda_2 = \cos \theta + i \sin \theta$ , avem

$$\begin{pmatrix} -i \sin \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 - e^{i\theta} & 0 \\ -\sin \theta & 0 & -i \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow (a, b, c) = (a, 0, ia) = a(1, 0, i), a \in \mathbb{R}.$$

Alegem  $v_2 = (1, 0, i)^t$  vector propriu. Pentru  $\lambda_3 = \bar{\lambda}_2 = \cos \theta - i \sin \theta$ , alegem vectorul propriu  $v_3 = \bar{v}_2 = (1, 0, -i)^t$ . S-a obținut baza  $B_{\mathbb{C}^3} = \{v_1, v_2, v_3\}$  a spațiului  $\mathbb{C}^3$ , formată din vectori proprii ai endomorfismului  $R^{\mathbb{C}}$  (complexificata transformării liniare  $R$ ). Se observă însă că  $R$  este transformare liniară reală, endomorfism al spațiului vectorial real  $\mathbb{R}^3$ . Distingem următoarele cazuri:

- Pentru  $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $R$  admite o singură valoare proprie  $\lambda_1 = 1$  cu vectorul propriu generator al subspațiului propriu asociat  $v_1 = (0, 1, 0)^t$ .
- Pentru  $\theta \in \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ , avem  $R = I_3$ , iar  $\lambda_1 = 1$  este singura valoare proprie (triplă,  $\mu_1 = 3$ );  $\mathbb{R}^3$  este subspațiu propriu asociat, o bază a acestuia fiind cea canonică,  $\{e_1, e_2, e_3\}$ .
- Pentru  $\theta \in \{(2k+1)\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ , avem  $R = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , iar valorilor proprii  $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -1$  le corespund respectiv vectorii proprii generatori

$$w_1 = (0, 1, 0)^t, w_2 = \operatorname{Re}(v_1) = (1, 0, 0)^t, w_3 = \operatorname{Im}(v_1) = (0, 0, 1)^t.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profilele electric și mecanic(baraj), 2004-2005

**I. a)** Fie  $\lambda$  valoare proprie pentru  $A$ . Atunci

$$AX = \lambda X \Rightarrow \|AX\| = |\lambda| \cdot \|X\| \Rightarrow |\lambda| = \frac{\|AX\|}{\|X\|} \leq \frac{\|A\| \cdot \|X\|}{\|X\|} = \|A\|.$$

Alegem  $\|A\| = \|A\|_{\infty} = \max_i \left\{ \sum_{j=1}^4 |a_{ij}| \right\} = \max\{11, 17, 23, 23\} = 23$ , și obținem  $|\lambda| \leq 23$ .

b)  $A$  este autoadjunctă. (evident)

c)  $A$  este pozitiv definită deoarece:  $\Delta_1 = 6 > 0$  și

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = 50 > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & 2 & -3 \\ 2 & 9 & 5 \\ -3 & 5 & 13 \end{vmatrix} = 369 > 0, \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} 6 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 9 & 5 & 1 \\ -3 & 5 & 13 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 20 \end{vmatrix} > 0.$$

**III.** a) Polinomul caracteristic al matricii  $A$  este

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_n) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = (-1)^n \lambda^n + \Delta_n. \end{aligned}$$

Dezvoltând determinantul după ultima coloană, obținem

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix} = \\ &= (-1)^{2n-1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{2n} a_n \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

deci  $\Delta_n = -\Delta_{n-1} + a_n(-1)^{n-1} \lambda^{n-1}$ . Rezultă relațiile

$$\begin{cases} \Delta_n = -\Delta_{n-1} + a_n(-1)^{n-1} \lambda^{n-1} \\ \Delta_{n-1} = -\Delta_{n-2} + a_{n-1}(-1)^{n-2} \lambda^{n-2} \\ \dots \\ \Delta_3 = -\Delta_2 + a_3(-1)^2 \lambda^2. \end{cases}$$

Amplificând  $\Delta_k$  cu  $(-1)^{n-k}$ , ( $k = 3, n$ ) și sumând, rezultă

$$\Delta_n = (-1)^{n-2} \Delta_2 + (-1)^{n-1} (a_n \lambda^{n-1} + a_{n-1} \lambda^{n-2} + \dots + a_3 \lambda^2).$$

De asemenea, avem  $\Delta_2 = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = -\lambda a_2 + a_1$ , deci

$$\det(A - \lambda I_n) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} a_n \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} a_3 \lambda^2 + (-1)^{n-1} a_2 \lambda^2 + (-1)^{n-2} a_1.$$

Prin urmare,

$$\det(A - \lambda I_n) = 0 \Leftrightarrow \lambda^n + a_n \lambda^{n-1} + \dots + a_3 \lambda^2 + a_2 \lambda^2 + a_1 = 0.$$

Notând rădăcinile polinomului cu  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ , multiplicitățile acestora satisfac relația  $(\mu_{\lambda_1} + \mu_{\lambda_2} + \dots + \mu_{\lambda_p} = n)$ . Pentru  $\lambda = \lambda_i$  obținem sistemul caracteristic

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -\lambda_i & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_i & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{n-1} & a_n - \lambda_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_2 = \lambda_i \alpha_1 \\ \alpha_3 = \lambda_i^2 \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n = \lambda_i^{n-1} \alpha_1 \\ a_1 \alpha_1 + a_2 \lambda_i \alpha_2 + \dots + a_{n-1} \lambda_i^{n-2} \alpha_{n-1} + (a_n - \lambda_i) \lambda_i^{n-1} \alpha_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \alpha_1 (a_1 + a_2 \lambda_i + \dots + a_{n-1} \lambda_i^{n-2} + (a_n - \lambda_i) \lambda_i^{n-1}) = 0. \end{aligned}$$

Notând  $A_i = (a_1 + a_2 \lambda_i + \dots)$ , sistemul are soluții doar dacă  $A_i = 0$ . Subspațiul propriu asociat valorii proprii  $\lambda_i$  este

$$S_{\lambda_i} = \{(a, \lambda_i a, \lambda_i^2 a, \dots, \lambda_i^{n-1} a) \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

b) Polinomul caracteristic este:  $\lambda^3 - a_3 \lambda^2 - a_2 \lambda + a_1 = 0$ . Relațiile lui Viète conduc la rezultatul dorit:

$$\begin{cases} a_3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 + 1 + 4 = 6 \\ -a_2 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = 1 + 4 + 4 = 9 \Rightarrow a_1 = -4 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -9 & 6 \end{pmatrix}. \\ -a_1 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4 \end{cases}$$

**III.** Derivata funcției  $F$  are forma

$$\begin{aligned} F'(y) &= \frac{\ln[1 + (a+y)^2 y^2]}{y^2} - \frac{\ln[1 + (a-y)^2 y^2]}{y^2} + \int_{a-y}^{a+y} \frac{1}{1+x^2 y^2} \frac{2x^2 y}{x^2} dx = \\ &= \frac{\ln\left(\frac{1+(a+y)^2 y^2}{1+(a-y)^2 y^2}\right)}{y^2} + \int_{a-y}^{a+y} \frac{2y}{1+x^2 y^2} dx = \frac{\ln\left(\frac{1+(a+y)^2 y^2}{1+(a-y)^2 y^2}\right)}{y^2} + 2 \operatorname{arctg}(xy) \Big|_{x=a-y}^{x=a+y} = \\ &= \frac{\ln\left(\frac{1+(a+y)^2 y^2}{1+(a-y)^2 y^2}\right)}{y^2} + 2 \operatorname{arctg}(ay + y^2) - 2 \operatorname{arctg}(ay - y^2). \end{aligned}$$

**IV.** Curba de intersecție este:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = -(x + y) \\ x^2 + y^2 + xy = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{(x + \frac{y}{2})^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

deci avem un cilindru eliptic cu generatoarele paralele cu axa  $Oz$  intersectat cu un plan oblic (vectorul normal  $\bar{n} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k} \not\parallel \bar{k}$ ), prin urmare o elipsă. O parametrizare a

acestei elipse este:  $\begin{cases} y = 2 \sin t \\ x = \sqrt{3} \cos t - \sin t \\ z = -\sqrt{3} \cos t - \sin t \end{cases}$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ , deci  $\alpha(t) = (\sqrt{3} \cos t - \sin t, 2 \sin t, -\sqrt{3} \cos t - \sin t)$  și obținem succesiv

$$\begin{cases} \alpha'(t) = (-\sqrt{3} \sin t - \cos t, -2 \cos t, \sqrt{3} \sin t - \cos t), \\ \alpha''(t) = (-\sqrt{3} \cos t + \sin t, -2 \sin t, \sqrt{3} \cos t + \sin t), \\ \bar{\alpha}' \times \bar{\alpha}'' = 2\sqrt{3}\bar{i} + 2\sqrt{3}\bar{j} + 2\sqrt{3}\bar{k}, \end{cases}$$

iar elementele Frenet sunt: (i) vesorii Frenet

$$\begin{cases} \bar{T} = \frac{\bar{\alpha}'}{\|\bar{\alpha}'\|} = \frac{\bar{\alpha}}{\sqrt{6}} = \frac{-1}{\sqrt{6}}(\sqrt{3} \sin t + \cos t)\bar{i} + \frac{2}{\sqrt{6}} \cos t \bar{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}(\sqrt{3} \sin t - \cos t)\bar{k}, \\ \bar{B} = \frac{\bar{\alpha}' \times \bar{\alpha}''}{\|\bar{\alpha}' \times \bar{\alpha}''\|} = \frac{\sqrt{3}}{3}(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}), \\ \bar{N} = \bar{B} \times \bar{T} = \frac{1}{\sqrt{6}}(\sin t - \sqrt{3} \cos t)\bar{i} - \frac{2}{\sqrt{6}} \sin t \bar{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}(\sqrt{3} \cos t + \sin t)\bar{k}. \end{cases}$$

și (ii) curbura  $k = \frac{\|\bar{\alpha}' \times \bar{\alpha}''\|}{\|\bar{\alpha}'\|} = \frac{6}{(\sqrt{6})^3} = \frac{1}{\sqrt{6}}$  și torsiunea  $\tau = 0$  (care se obține prin calcul direct, sau observând că  $\alpha$  este curbă plană inclusă în planul  $x + y + z = 0$ ). Formulele Frenet se scriu

$$\begin{cases} \frac{d\bar{T}}{dt} = kv\bar{N} = \sqrt{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{N} = \bar{N} \\ \frac{d\bar{N}}{dt} = -kv\bar{T} + \tau v\bar{B} = -\bar{T} \\ \frac{d\bar{B}}{dt} = \tau v\bar{N} = 0, \end{cases}$$

unde  $v = \|\bar{\alpha}'\| = \sqrt{6}$ . Căutăm valoarea parametrului  $t$  asociată punctului  $A$ . Din relația

$$(1, 1, -2) = (\sqrt{3} \cos t - \sin t, 2 \sin t, -\sqrt{3} \cos t - \sin t),$$

rezultă  $\begin{cases} \sin t = 1/2 \\ \cos t = \sqrt{3}/2 \end{cases}$ , deci  $t = \frac{\pi}{6}$ . Atunci în acest punct avem elementele Frenet:

$$\left\{ \bar{T}_A = \frac{-1}{\sqrt{2}}\bar{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\bar{j}, \bar{N}_A = \frac{-1}{\sqrt{6}}\bar{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\bar{j} + \frac{2}{\sqrt{6}}\bar{k}, \bar{B}_A = \frac{\sqrt{3}}{3}(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}) \right\}, k_A = \frac{1}{\sqrt{6}}, \tau_A = 0.$$

$$\mathbf{V. } S(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^n}{n+1}. \text{ Dar pentru } |x| < 1 \text{ și } |t| \in [0, |x|]$$

avem  $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$ , de unde prin integrare obținem

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1},$$

deci  $\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ ,  $|x| < 1$ . Substituind  $x \rightarrow x^2$ , rezultă

$$\frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n+1} = 1 + S(x) \Rightarrow S(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} - 1,$$

Atunci, integrând prin parti, obținem:

$$\begin{aligned} \int_1^x S(t) dt &= \int_1^x \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt - x + 1 = -\frac{1}{t} \ln(t^2 + 1) \Big|_1^x + \int_1^x \frac{1}{t} \frac{1}{t^2 + 1} 2t dt - x + 1 = \\ &= -\frac{1}{x} \ln(x^2 + 1) + \ln 2 + 2 \operatorname{arctg} t \Big|_1^x - x + 1 = \\ &= -\frac{1}{x} \ln(x^2 + 1) + \ln 2 + 2 \operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{2} - x + 1. \end{aligned}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2005-2006

**I. a)** Notând  $x^2 + y^2 = t$ , rezultă  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{e^{\frac{1}{t}}}$ . Efectuând

substituția  $z = \frac{1}{t}$ , rezultă  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{e^z} = 0 = f(0,0)$ , deci  $f$  este continuă în  $(0,0)$ .

**b)**  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^2 \cdot x}$ . Fie  $t = \frac{1}{x}$ , rezultă  $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t^2} \cdot t^3 = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3}{e^{t^2}} = 0$ . Analog se obține  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ .

**c)** Pentru  $(x,y) \neq (0,0)$ , avem

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{(x^2+y^2)^2} \cdot 2x \cdot (x^2+y^2) - e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot 2x \left( \frac{1}{x^2+y^2} - 1 \right)}{(x^2+y^2)^2},$$

deci

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot 2x \left( \frac{1}{x^2+y^2} - 1 \right)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Analog,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot 2y \left( \frac{1}{x^2+y^2} - 1 \right)}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Notând  $t = \frac{1}{x^2+y^2}$ , rezultă

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot 2x \left( \frac{1}{x^2+y^2} - 1 \right)}{(x^2+y^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot \left( \frac{1}{x^2+y^2} - 1 \right)}{(x^2+y^2)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2x \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} (t-1) \cdot t^2 = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2(t-1)}{e^t} = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0), \end{aligned}$$

deci  $\frac{\partial f}{\partial x}$  continuă în  $(0, 0)$ . Analog se demonstrează că  $\frac{\partial f}{\partial y}$  continuă în  $(0, 0)$ . Fie

$$\alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Avem  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha(x, y) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} \cdot t \sqrt{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \sqrt{t}}{e^t} = 0$ , deci  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(0, 0)$ .

d)  $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot z^n$ , deci înlocuind  $z \rightarrow \frac{1}{x^2}$ , rezultă  $e^{1/x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{x^{2n}}$ , pentru  $x \neq 0$ . Atunci  $\frac{e^{1/x^2}}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{x^{2n+2}}$  și deci  $\int_1^{\infty} \frac{e^{1/x^2}}{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{2n+2}} dx$ , de unde rezultă

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{1/x^2}}{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left. \frac{x^{-2n-1}}{-2n-1} \right|_1^{\infty} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \frac{1}{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! (2n+1)}.$$

**III. a)**  $f(x) = \arctg(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n} \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$ , iar  $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ , deci  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ,  $x \in (-1, 1)$ .

b) Pentru  $x \rightarrow 1$  în egalitatea de la punctul a), obținem  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = f(1) = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$ .

c)  $f(x, y) = \cos x + y^2 - 2y + 5$ . Punctele critice ale lui  $f$  se obțin rezolvând sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\sin x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ y = 1, \end{cases}$$

deci punctele critice sunt  $\{(k\pi, 1) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ . Matricea hessiană  $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -\cos x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  calculată în aceste puncte este  $H_f(k\pi, 1) = \begin{pmatrix} (-1)^{k+1} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  și conduce la forma pătratică  $d^2 f(k\pi, 1) = (-1)^{k+1} \cdot dx^2 + 2dy^2$ . Distingem două cazuri. Dacă  $k$  este par, atunci  $d^2 f(k\pi, 1) = -dx^2 + 2dy^2$ , deci  $(k\pi, 1)$  nu este punct de extrem. Dacă  $k$  este impar, atunci  $d^2 f(k\pi, 1) = dx^2 + 2dy^2 > 0$ , deci  $(k\pi, 1)$  este punct de minim local. În concluzie,  $f$  admite punctele de minim local  $\{(2m+1)\pi, 1) \mid m \in \mathbb{Z}\}$ .

**III. a)** Matricea diagonală asociată lui  $A$  este  $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , iar matricea modală (de schimbare de bază) este  $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ . Au loc relațiile

$$D = C^{-1}AC \Leftrightarrow A = CDC^{-1} \Rightarrow \det A = \det C \cdot \det D \cdot \det C^{-1} = 0.$$

b) Cei trei vectori proprii ai matricei  $A$  formează o bază în spațiul vectorial  $\mathbb{R}^3$ , deci  $A$  este diagonalizabilă.

c) Folosind egalitatea  $A = CDC^{-1}$ , obținem:

$$A^3 = (CDC^{-1})^3 = CD^3C^{-1} = C \cdot (3D^2)C^{-1} = 3CD^2C^{-1} = 3(CDC^{-1})^2 = 3A^2,$$

deci  $A^3 = 3A^2$ .

*Metoda 2.* Polinomul caracteristic asociat lui  $A$  este

$$P(\lambda) = -(\lambda - 0)^2(\lambda - 3) = -\lambda^2(\lambda - 3) = 3\lambda^2 - \lambda^3.$$

Conform teoremei Cayley-Hamilton, avem  $3A^2 - A^3 = O_3 \Leftrightarrow A^3 = 3A^2$ .

**IV.** a) Obținem succesiv  $\overline{AB} = -2\bar{i} - 3\bar{j} - 2\bar{k}$ ,  $\overline{AC} = (u-1)\bar{i} + (v-1)\bar{j} + uv\bar{k}$ ,

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -2 & -3 & -2 \\ u-1 & v-1 & uv \end{vmatrix} = \bar{i}(-3uv + 2v - 2) - \bar{j}(-2uv + 2u - 2) + \bar{k}(-2v + 3u - 1).$$

$$\text{b) } A_{\Delta AOB} = \frac{1}{2} \cdot \|\overline{OA} \times \overline{OB}\|, \text{ iar } \overline{OA} \times \overline{OB} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \bar{i} - \bar{k}, \text{ deci}$$

$$\|\overline{OA} \times \overline{OB}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \Rightarrow A_{\Delta AOB} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

c) Eliminând parametrii  $u$  și  $v$  din ecuațiile parametrice, obținem  $\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 1 + uv, \end{cases}$

deci rezultă ecuația carteziană  $z = 1 + xy$ . Efectuăm rotația  $Oxyz \rightarrow Ox'y'z'$  de axă

$Oz = Oz'$  și unghi  $\pi/4$ , dată de relațiile  $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \\ z = z' \end{cases}$ , iar ecuația cuadricei

devine  $z' = 1 + \frac{x'^2 - y'^2}{2}$ . Translatând originea în punctul  $O''(0, 0, 1)$ , deci efectuând translația de reper dată de relațiile  $\begin{cases} x' = x'' \\ y' = y'' \\ z' = z'' + 1 \end{cases}$ , ecuația cuadricei relativ la reperul roto-translatat  $O''x''y''z''$  este  $2z'' = x''^2 - y''^2$  deci cuadrica este o șea (paraboloid hiperbolic).

d) Folosind punctul a), condiția de coliniaritate  $\overline{AB} \times \overline{AC} = \bar{0}$ , revine la relațiile

$$\begin{cases} -3uv + 2v - 2 = 0 \\ -2uv + 2u - 2 = 0 \\ -2v + 3u - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3uv - 2v + 2 = 0 \\ 2u - 2 = 0 \\ 3u - 2v = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 1 \\ v = 1 \\ uv = 0, \end{cases}$$

sistem incompatibil, deci nu există  $u, v \in \mathbb{R}$  a.î.  $A, B, C$  să fie coliniare.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2006-2007

**I. a)** Avem  $f(x, y) = \begin{cases} y^2 \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right) & y \neq 0; \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ . Atunci

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, 0) - f(a, 0)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{0 - 0}{x - a} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(a, y) - f(a, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \cdot \sin\left(\frac{a^2}{y^2}\right)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} y \cdot \sin\left(\frac{a^2}{y^2}\right) = 0.$$

b) Au loc egalitățile  $\alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(a, 0) - 0(x-a) - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y^2 \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ .

Dar pentru  $y \rightarrow 0, x \rightarrow a$  avem  $|\alpha(x, y)| = \frac{y^2 \cdot |\sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq |y| \cdot \left|\sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right)\right| \rightarrow 0$ , deci  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(a, 0)$ .

c) Avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right) \cdot \frac{2x}{y^2} = 2x \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right), y \neq 0;$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right) + y^2 \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right) \cdot \left(-\frac{2x^2}{y^3}\right) = 2y \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right) - 2\frac{x^2}{y} \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right), y \neq 0.$$

Dar limita  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} 2x \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$  nu există, deci  $\frac{\partial f}{\partial x}$  nu este continuă în  $(a, 0)$ . Doarece  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} 2y \cdot \sin\left(\frac{x^2}{y^2}\right) - 2\frac{x^2}{y} \cdot \cos\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$  nu există, rezultă că  $\frac{\partial f}{\partial y}$  nu este continuă în  $(a, 0)$ .

**II. a)**  $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z)$ . Obținem

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \cos x - \cos(x + y + z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \cos y - \cos(x + y + z) = 0 \Rightarrow \cos x = \cos y = \cos z = \cos(x + y + z). \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \cos z - \cos(x + y + z) = 0 \end{cases}$$

Dar funcția cosinus este injectivă pe  $(0, \pi) \Rightarrow x = y = z$ . Avem

$$\cos x = \cos 3x \Rightarrow \cos x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \Rightarrow 4 \cos x (\cos^2 x - 1) = 0$$

de unde rezultă variantele i)  $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ ; ii)  $\cos x = 1 \Rightarrow$  imposibil; iii)  $\cos x = -1 \Rightarrow$  imposibil. Deci singurul punct critic din  $D_f$  este  $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Avem

$$H_f = \begin{pmatrix} -\sin x + \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) \\ \sin(x + y + z) & -\sin y + \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) \\ \sin(x + y + z) & \sin(x + y + z) & -\sin z + \sin(x + y + z) \end{pmatrix},$$

deci  $H_f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ . Dar  $\begin{cases} \Delta_1 = -2 < 0 \\ \Delta_2 = 3 > 0 \\ \Delta_3 = -4 < 0 \end{cases}$ , deci  $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  este punct de maxim local.

b) Avem  $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{1}{n(n+1)})}{\cos(\frac{1}{n}) \cdot \cos \frac{1}{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})}{\cos \frac{1}{n} \cdot \cos \frac{1}{n+1}}$ , deci  
 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n} \cdot \cos \frac{1}{n+1} - \cos \frac{1}{n} \cdot \sin \frac{1}{n+1}}{\cos \frac{1}{n} \cdot \cos \frac{1}{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} - \tan \frac{1}{n+1}$ .

Fie

$$s_n = \sum_{k=1}^n \left( \tan \frac{1}{k} - \tan \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=1}^n \left( \tan \frac{1}{k} \right) - \sum_{k=1}^n \left( \tan \frac{1}{k+1} \right) = \tan 1 - \tan \left( \frac{1}{n+1} \right).$$

Atunci  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \tan 1 - \tan \left( \frac{1}{n+1} \right) \right) = \tan 1$ .

**III. a)**  $\begin{cases} M = (1, 1, 1), \quad N = (1, 2, 2) \\ P = (2, 3, 2), \quad Q = (3, 2, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{MN} = 0\bar{i} + 1\bar{j} + 1\bar{k} = \bar{j} + \bar{k} \\ \overline{MP} = 1\bar{i} + 2\bar{j} + 1\bar{k} = \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k} \\ \overline{MQ} = 2\bar{i} + 1\bar{j} + 0\bar{k} = 2\bar{i} + 2\bar{j}, \end{cases}$

deci

$$V_{MNPQ} = \frac{1}{6} |\langle \overline{MN}, \overline{MP} \times \overline{MQ} \rangle| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |(1 + 2 - 4)| = \frac{1}{6}.$$

b)  $f(x, y, z) = y + 2xz = 1$ . Obținem  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2z$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = 1$ ;  $\frac{\partial f}{\partial z} = 2x$ , deci

$$\frac{\partial f}{\partial x}(-1, 3, 1) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(-1, 3, 1) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(-1, 3, 1) = -2,$$

și deci ecuația planului tangent cerut este

$$(x+1)2 + (y-3)1 + (z-1) \cdot (-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 2z + 1 = 0.$$

**IV. a)**  $\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & a \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - a = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 = a \Rightarrow a \neq 0$ .

b)  $a = 1 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (1-\lambda)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 2. \end{cases}$

Pentru  $\lambda_1 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha + \beta = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha \in \mathbb{R} \\ \beta = -\alpha \end{cases}$ , de unde

vectorul propriu:  $\begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$ , iar vectorul ales pentru baza ortonormată este  $\begin{pmatrix} \frac{\alpha}{|\alpha|\sqrt{2}} \\ \frac{-\alpha}{|\alpha|\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ .

Pentru  $\lambda_2 = 2 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \gamma = \delta \in \mathbb{R}$ , deci vectorul propriu  $\begin{pmatrix} \gamma \\ \gamma \end{pmatrix}$ , iar vectorul ales pentru baza ortonormată este  $\begin{pmatrix} \frac{\gamma}{|\gamma|\sqrt{2}} \\ \frac{\gamma}{|\gamma|\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ .

Prin urmare, notând  $\varepsilon = \text{sign}(\alpha), \mu = \text{sign}(\gamma)$ , avem  $C = \varepsilon \cdot \mu \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ ;  $\varepsilon, \mu = \pm 1$ . Dar din condiția de orientare pozitivă, rezultă  $C_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$  și  $C_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ .

d)  $C_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}, \text{ deci } \theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}. \text{ Analog, } C_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}, \text{ deci } \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}. \text{ Verificăm ortogonalitatea matricelor:}$

$$C_1^t \cdot C_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ deci } C_1 \text{ ortogonală;}$$

$$C_2^t \cdot C_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ deci } C_2 \text{ ortogonală.}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2007-2008

**I. a)** Derivata funcției  $f(x) = \arcsin x$  este  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ . Dar  $(1-x)^\alpha = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \alpha (\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \cdot x^n$ ,  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ , deci

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{1}{2}-n\right)}{n!} \cdot x^n = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n!} \cdot x^n.$$

Efectuând substituția  $x \rightarrow x^2$ , rezultă  $(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot x^{2n} = f'(x)$ ,

deci  $f(x) = x + \sum_{n \geq 1} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$ . Dar  $f(0) = \arcsin 0 = 0$  conduce la

$$C = 0, \text{ și prin urmare } f(x) = x + \sum_{n \geq 1} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

b) Conform cu a),  $f(1) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ . Dar  $f(1) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$ , deci  $\sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 2n-1}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2} - 1$ .

**III.** a) Avem  $P : x + 2y + 2z = 0$ ; fie  $M(a, b, c)$  și  $M' = pr_P M$ . Ecuațiile perpendiculararei din  $M$  pe planul  $P$  sunt:  $\frac{x-a}{1} = \frac{y-b}{2} = \frac{z-c}{2} = t$ . Atunci

$$M'(x, y, z) : \begin{cases} x = a + t \\ y = 2t + b \\ z = 2t + c \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = (-a - 2b - 2c)/9 \\ x = (8a - 2b - 2c)/9 \\ y = (5b - 2a - 4c)/9 \\ z = (5c - 2a - 4b)/9. \end{cases}$$

Prin urmare  $f(a, b, c) = (\frac{8a-2b-2c}{9}, \frac{5b-2a-4c}{9}, \frac{5c-2a-4b}{9})$  și, evident,  $f$  este liniară.

Determinăm nucleul aplicației  $f$ :  $\begin{cases} 8a - 2b - 2c = 0 \\ 5b - 2a - 4c = 0 \\ 5c - 2a - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow b = c = 2a, a \in \mathbb{R}$ ,

deci  $\text{Ker } f = \{(a, 2a, 2a) \mid a \in \mathbb{R}\}$ ; o bază în  $\text{Ker } f$  este  $\{v_1 = (1, 2, 2)\}$ . Fie  $y = (y_1, y_2, y_3)$ ,  $y \in \text{Im } f$ . Atunci există  $x = (a, b, c)$ , a.î.

$$f(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} 8a - 2b - 2c = y_1 \\ 5b - 2a - 4c = y_2 \\ 5c - 2a - 4b = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow y_1 = -2y_2 - 2y_3, \quad y_2, y_3 \in \mathbb{R},$$

deci  $\text{Im } f = \{(2y_2 + 2y_3, y_2, y_3) \mid y_2, y_3 \in \mathbb{R}\} = \{y_2(2, 1, 0) + y_3(2, 0, 1) \mid y_2, y_3 \in \mathbb{R}\}$ ; prin urmare o bază în  $\text{Im } f$  este  $\{v_2 = (2, 1, 0), v_3 = (2, 0, 1)\}$ .

b) Matricea transformării liniare  $f$  este  $M_f = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ . Matricea reală  $M_f$  este simetrică, deci este diagonalizabilă. Altfel. Aflăm valorile proprii:

$$\det(M_f - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} \frac{8}{9} - \lambda & -\frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} - \lambda & -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{5}{9} - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda - 1)^2 = 0.$$

Toate cele trei rădăcini sunt reale, valorile proprii  $\lambda_1 = 1$  (dublă confundată), și  $\lambda_2 = 0$  (simplă), deci cu multiplicitatele algebrice 2, respectiv 1. Multiplicitățile lor geometrice sunt respectiv 2 și 1, deci  $f$  este diagonalizabilă.

c) Fie  $P : Ax + By + Cz = 0$  un plan care trece prin origine; aflăm proiecția unui punct  $M(a, b, c)$  pe planul  $P$ . Dreapta perpendiculară pe  $P$  ce conține punctul  $M$  are ecuațiile

$$\frac{x-a}{A} = \frac{y-b}{B} = \frac{z-c}{C} = t \Leftrightarrow \begin{cases} x = At + a \\ y = Bt + b \\ z = Ct + c \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

deci proiecția căutată  $\{(a, b, c)\} = P \cap D$  corespunde valorii  $t$  care satisfac ecuația

$$A(At + a) + B(Bt + b) + C(Ct + c) = 0 \Leftrightarrow t(A^2 + B^2 + C^2) = -Aa - Bb - Cc,$$

deci  $t = \frac{-Aa - Bb - Cc}{A^2 + B^2 + C^2}$ ; înlocuind în (5), obținem

$$(a, b, c) = \left( \frac{(B^2 + C^2)a - Bb - Cc}{A^2 + B^2 + C^2}, \frac{(A^2 + C^2)b^2 - Aa - Cc}{A^2 + B^2 + C^2}, \frac{(A^2 + B^2)c - Bb - Aa}{A^2 + B^2 + C^2} \right),$$

deci o aplicație liniară a cărei matrice este  $\frac{1}{A^2+B^2+C^2} \begin{pmatrix} B^2+C^2 & -B & -C \\ -A & A^2+C^2 & -C \\ -A & -B & A^2+B^2 \end{pmatrix}$ .

**III.** a) Avem  $\varphi(x) = \{x\} = x - [x]$ . Fie  $k \in \mathbb{Z}$ . Atunci

$$\varphi(x+k) = x+k - [x+k] = x+k - [x] - k = x - [x] = \varphi(x), \forall x \in \mathbb{R},$$

deci  $\varphi$  este periodică cu perioada  $T = p \in \mathbb{Z}$  și perioada principală  $T_* = 1$ . Calculăm  $I_n = \int_0^n \varphi(x) \cdot \cos(2n\pi x) dx$ . Avem

$$[x] = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x \in [1, 2) \\ \dots \\ n-1, & x \in [n-1, n) \\ n, & x = n \end{cases} \Rightarrow \varphi(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1) \\ x-1, & x \in [1, 2) \\ \dots \\ x-n+1, & x \in [n-1, n) \\ 0, & x = n \end{cases}$$

și deci, făcând abstracție de discontinuitatea în  $x = n$  a ultimului integrand, rezultă

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \varphi(x) \cdot \cos(2n\pi x) dx + \int_1^2 \varphi(x) \cdot \cos(2n\pi x) dx + \dots + \int_{n-1}^n \varphi(x) \cdot \cos(2n\pi x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} (x-k) \cos(2n\pi x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \left( (x-k) \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi} \Big|_k^{k+1} - \int_k^{k+1} \frac{\sin(2n\pi k)}{2n\pi} dx \right), \end{aligned}$$

$$\text{deci } I_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(2n\pi x)}{4n^2\pi^2} \Big|_k^{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1-1}{4n^2\pi^2} = 0.$$

b) Arătăm că funcțiile  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\varphi(kx)}{2^k}$  sunt periodice. Punctul a) implică

$$f_n(x+1) = \sum_{k=1}^n \frac{\varphi(kx+k)}{2^k} = \sum_{k=1}^n \frac{\varphi(kx)}{2^k} = f_n(x),$$

deci  $f_n$  este un sir de funcții periodice. Pe de altă parte, avem  $\left| \frac{\varphi(kx)}{2^k} \right| \leq \frac{1}{2^k}$ , iar seria  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$  este convergentă, deci seria  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi(kx)}{2^k}$  este uniform convergentă, și deci  $f_n$  este sir uniform convergent.

c) Datorită convergenței uniforme, pentru  $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , avem

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = f(a),$$

deci  $f$  este continuă în  $a$ , unde în ultima egalitate s-a folosit continuitatea în  $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  a sumanilor funcției  $f_n$ .

**IV.**  $AB = BA$ ,  $A^{2007} = I_3$ ,  $B^{2008} = I_3$ . a) Fie  $\lambda$  valoare proprie pentru  $A$  asociată vectorului propriu  $v \neq 0$ . Atunci se poate arăta ușor, prin inducție, că  $A^n v = \lambda^n v$ ,  $\forall n \geq 0$ . Pentru  $n = 2007$ , obținem  $A^{2007} v = \lambda^{2007} v$ . Dar  $A^{2007} = I_3$ , deci  $\lambda^{2007} = 1$ . Fie  $\mu$  valoare proprie pt  $B$  asociată vectorului propriu  $w \neq 0$ . Ca mai

sus, rezultă  $B^{2008}w = \mu^{2008}w$ . Dar  $B^{2008} = I_3$ , deci  $\mu^{2008} = 1$ . Prin urmare (deoarece  $\text{cmmdc}(2007, 2008) = 1$ ), singura valoare proprie comună a celor două matrice este 1.

b) Presupunem că  $P$  și  $Q$  nu sunt prime între ele, deci există  $\alpha$  rădăcină comună pt  $P$  și  $Q$ ; rezultă

$$\begin{cases} \alpha^{2007} = 1 & \Rightarrow \alpha = \cos \frac{2k\pi}{2007} + i \sin \frac{2k\pi}{2007}, \quad k \in \{0, \dots, 2006\} \\ (\alpha + 1)^{2008} = 1 & \Rightarrow \alpha + 1 = \cos \frac{2p\pi}{2008} + i \sin \frac{2p\pi}{2008}, \quad p \in \{0, \dots, 2007\} \end{cases}$$

deci  $\cos \frac{2k\pi}{2007} = \cos \frac{2p\pi}{2008} - 1$  și  $\sin \frac{2k\pi}{2007} = \sin \frac{2p\pi}{2008}$ . Notând  $\alpha = \frac{2k\pi}{2007}$  și  $\beta = \frac{2p\pi}{2008}$ , obținem  $\begin{cases} \sin \alpha = \sin \beta \\ \cos \alpha = \cos \beta - 1 \end{cases}$  de unde, prin ridicare la patrat și sumare, rezultă

$$\cos \beta = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \beta \in \left\{ 2m\pi \pm \frac{\pi}{3} \mid m \in \mathbb{Z} \right\} \cap \left\{ \frac{2k\pi}{2008} \mid k = \overline{0, 2007} \right\}.$$

Dar  $2m\pi \pm \frac{\pi}{3} = \frac{2k\pi}{2008} \Leftrightarrow 2m = \frac{k}{1004} \mp \frac{1}{3}$ ; deoarece  $2m \in \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$  iar  $\frac{k}{1004} \mp \frac{1}{3} \in (-2, 2)$ , rezultă  $m = 0 \Rightarrow k \in \{\pm \frac{1004}{3}\} \cap \overline{0, 2007} = \emptyset$ , deci sistemul nu are soluții iar  $P$  și  $Q$  nu au rădăcini comune, deci sunt prime între ele.

c) Deoarece matricile  $A$  și  $B$  comută, notând  $A + I_3 = U$ ,  $-B = V$ , avem

$$\begin{aligned} (A + I_3)^n \cdot x &= (-1)^n \cdot B^n \cdot x \Leftrightarrow ((A + I_3)^n - (-1)^n \cdot B^n) x = 0 \\ &\Leftrightarrow [(A + I_3)^n - (-B)^n] x = 0 \Leftrightarrow (A + I_3 + B)(U^{n-1} + U^{n-2} \cdot V + \dots + V^{n-1}) x = 0 \\ &\Leftrightarrow (U^{n-1} + U^{n-2} \cdot V + \dots + V^{n-1}) [(A + B + I_3) x] = 0. \end{aligned}$$

Dar a doua paranteză din membrul stâng este nulă, deci egalitatea din enunț are loc.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU" Faza locală, anul I, profil electric, 2008-2009

**I. 1)**  $A$  este inversabilă dacă și numai dacă  $\det A \neq 0$ . Dar  $\det A$  este produsul rădăcinilor complexe ale polinomului său caracteristic  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \in \mathbb{C}[\lambda]$ , deci dacă prin absurd  $A$  neinversabilă, atunci  $\det A = 0 \Rightarrow P_A(\lambda)$  admite rădăcina reală  $\lambda = 0$ , ceea ce contrazice ipoteza. Rezultă  $A$  inversabilă. Polinomul caracteristic al matricii  $A$  are doar rădăcini complexe conjugate de forma  $\lambda, \bar{\lambda} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ . Dacă

$$P_A(\lambda) = \prod_{k=1}^m (\lambda - \lambda_k)(\lambda - \bar{\lambda}_k), \quad n = 2m, \text{ atunci}$$

$$\begin{aligned} P_{A^{-1}}(\lambda^{-1}) &= \det(A^{-1} - \lambda^{-1}I) = \det(AA^{-1}) \det(\lambda A^{-1} - I) \cdot \lambda^{-n} = \\ &= \lambda^{-n} \cdot \det(A^{-1}) \cdot \det[A(\lambda A^{-1} - I)] = \lambda^{-n} \det(A^{-1}) \det(A - \lambda I). \end{aligned}$$

Cum  $\lambda = 0$  nu este rădăcină a lui  $P_A(\lambda)$ , pentru orice rădăcină  $\lambda$  a lui  $P_A(\lambda)$ , rezultă  $P_{A^{-1}}(\lambda^{-1}) = 0$ . Deci polinomul caracteristic al matricii  $A^{-1}$  are drept rădăcini inversele rădăcinilor matricii  $A$ , deci de forma  $\frac{1}{\lambda} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ .

**II.** a) Matricea  $T$  va avea pe coloane componentele unei baze a spațiului  $\mathbb{R}^3$ , formate din vectori proprii ai matricii  $A$ . Pentru a afla această bază, determinăm valorile proprii ale matricii  $A$ . Avem

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+1)^2(\lambda-5).$$

Deci  $P_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{-1, 5\}$ . Notând cu  $S_\lambda$  subspațiul propriu asociat valorii proprii  $\lambda$ , avem pentru  $\lambda = -1$ ,

$$\begin{aligned} v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in S_{-1} &\Leftrightarrow (A + I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a + b + c = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v = (a, b, -a-b)^t = a(1, 0, -1)^t + b(0, 1, -1)^t \in L(\{(1, 0, -1)^t, (0, 1, -1)^t\}). \end{aligned}$$

Pentru  $\lambda = 5$ , avem

$$\begin{aligned} v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in S_5 &\Leftrightarrow (A - 5I)v = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b + c = 0 \\ a - 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v = (a, a, a)^t = a(1, 1, 1)^t \in L(\{(1, 1, 1)^t\}). \end{aligned}$$

Deci  $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ , iar  $D = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ .

b) Se observă că  $A = TDT^{-1} = (TUT^{-1})^{2009}$ , de unde rezultă

$$D = U^{2009}, \quad U = \begin{pmatrix} \sqrt[2009]{-1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[2009]{5} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt[2009]{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[2009]{5} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt[2009]{5} \end{pmatrix}.$$

**III.** Avem  $a_1 = 1$ ;  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot a_n$ ;  $\sum_{n \geq 1} \underbrace{\frac{a_n}{n}}_{b_n} \cdot x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

a) Calculăm raza de convergență  $\rho$  a seriei de puteri. Obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = 0,$$

deci  $\rho = \infty$  iar domeniul de convergență este  $\mathbb{R}$ .

b) Fie  $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} \cdot x^n$ . Atunci

$$S'(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} \cdot n \cdot x^{n-1} = \sum_{n \geq 1} a_n \cdot x^{n-1} = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \dots \Rightarrow S'(0) = a_1 = 1.$$

**IV.** a) Avem  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}$ . Dar

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{-\frac{1}{2}x}{1!} + \cdots + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}x^n + \cdots,$$

deci  $(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{x^2}{2 \cdot 1!} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^4}{2^2 \cdot 2!} + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n!}x^{2n} + \cdots$ . Rezultă

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n!} x^{2n} \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n! (2n+1)} x^{2n+1}.$$

Notăm  $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n! (2n+1)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \Rightarrow \rho = 1$ , deci intervalul de convergență este  $I = (-1, 1)$ . Pentru  $x = -1$ , avem  $f(-1) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n! (2n+1)}$ . Dar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{2(n+1)(2n+3)}{(2n+1)^2} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(6n+5)}{(2n+1)^2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} > 1,$$

deci folosind criteriul Raabe-Duhamel, seria este convergentă. Analog, pentru  $x = 1$ , seria este convergentă. Deci multimea de convergență este  $[-1, 1]$ .

b) Notăm  $\sum_{n \geq 1} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^n \cdot (2n+1)!} = S$ . Dar

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n! (2n+1)} \cdot x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^n \cdot n! \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1) (2n+1)} \cdot x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2 \cdot 4 \cdots 2n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1) (2n+1)} \cdot x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}. \end{aligned}$$

Rezultă

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^{n+1} \cdot (2n+1)!} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2}{2^n \cdot (2n+1)!} = \frac{1}{2} (1 + S),$$

$$\text{deci } \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 + S) \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}S \Rightarrow S = \frac{\pi}{3} - 1.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2008-2009

**I.** a) Folosim

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\mathcal{L}'H}{\lim}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{3x^2} = \frac{1}{6} \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n - \sin a_n}{a_n^3} \right| = \frac{1}{6},$$

deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . Folosind criteriul comparației la limită, rezultă că seriile  $\sum_{n \geq 1} |a_n - \sin a_n|$  și  $\sum_{n \geq 1} |a_n|^3$  au aceeași natură.

b) Conform punctului a), deoarece  $\sum_{n \geq 1} |a_n|^3$  este convergentă rezultă că seria  $\sum_{n \geq 1} |a_n - \sin a_n|$  este convergentă, deci  $\sum_{n \geq 1} (a_n - \sin a_n)$  este absolut convergentă, și deci  $\sum_{n \geq 1} (a_n - \sin a_n)$  este convergentă. Dacă am presupune că  $\sum_{n \geq 1} a_n$  și  $\sum_{n \geq 1} \sin a_n$  nu au aceeași natură, atunci  $\sum_{n \geq 1} (a_n - \sin a_n)$  este divergentă, ceea ce este fals, deci  $\sum_{n \geq 1} a_n$  și  $\sum_{n \geq 1} \sin a_n$  au aceeași natură.

c) Fie  $a_n = \frac{n}{\sqrt{n^3+1}}$ . Observăm că  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $a_n \neq 0$  iar  $a_n < \frac{\pi}{2}$  implică  $\sin a_n > 0$ , deci

$$\sum_{n \geq 1} \left| (-1)^{n-1} \cdot \sin \left( \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} \right) \right| = \sum_{n \geq 1} \sin a_n.$$

Deoarece seria  $\sum_{n \geq 1} a_n^3 = \sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{(n^3+1)^{\frac{3}{2}}} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$  este convergentă, din criteriul de comparație cu inegalități, rezultă că  $\sum_{n \geq 1} a_n^3$  este convergentă și conform punctului b),  $\sum_{n \geq 1} \sin a_n$  are aceeași natură cu  $\sum_{n \geq 1} a_n$ . Avem  $\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{n \geq 1} \frac{n}{\sqrt{n^3+1}}$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{\sqrt{n^3+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3}}{\sqrt{n^3+1}} = 1 \neq 0$ , deci  $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{\sqrt{n^3+1}}$  și  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$  au aceeași natură. Dar  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$  este divergentă  $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$  este divergentă  $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \sin a_n$  este divergentă  $\Rightarrow$  seria  $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \cdot \sin \left( \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} \right)$  nu este absolut convergentă. Pentru convergența simplă, se observă că argumentul sinusului din seria  $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \cdot \sin \left( \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} \right)$  satisfacă  $0 < \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} < 1 < \frac{\pi}{2}$ , deci  $\sin \left( \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} \right)$  este sir descrescător și poate fi folosit criteriul lui Leibniz.

**III.** a) Avem  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} \neq 0$ , deoarece dacă alegem  $x_n = y_n = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ,  $f(x_n, y_n) = \frac{1/n^2}{2/n^2} = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$ , deci  $f$  nu este continuă în  $(0, 0)$ .

b) Calculăm  $g(t) = f(\varphi(t)) = \frac{(1-t)(1+t)}{(1-t^2)+(1+t)^2} = \frac{1-t^2}{2(1+t^2)}$ . Atunci  $g'(t) = \frac{-2t}{(1+t^2)^2}$ , deci  $g'(t) = 0$  implică  $t = 0$  punct critic (maxim), conform tabelului de mai jos.

$x$	−∞	0	+∞
$g'$	+	0	−
$g$	−1/2 ↗	1/2 ↘	−1/2

Rezultă că funcția  $g$  este crescătoare pe  $(-\infty, 0)$  și descrescătoare pe  $(0, +\infty)$ .

c)  $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{x/y}{(x/y)^2+1}$ , deci pentru  $h(t) = \frac{t}{t^2+1}$  avem  $f(x, y) = h\left(\frac{x}{y}\right)$ ,  $\forall y \neq 0$ .

**III.** a) Observăm că 0 este valoare proprie pentru  $T$  dacă și numai dacă  $\dim \text{Ker}(T - 0Id) > 0$ . Dar  $\text{Ker}(T - 0Id) = \text{Ker } T$ , iar

$$v \in \text{Ker}(T) \Leftrightarrow v = (\lambda + \mu, \lambda, \lambda - \mu) = \lambda \underbrace{(1, 1, 1)}_{v_1^t} + \mu \underbrace{(1, 0, -1)}_{v_2^t}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Deoarece  $\text{rang}[v_1, v_2] = 2$ , rezultă că  $\{v_1, v_2\}$  formează bază în  $\text{Ker } T$ , deci  $\dim \text{Ker } T = 2 > 0$ ; prin urmare 0 este valoare proprie pentru  $T$ , iar vectorii proprii asociati formează  $\text{Ker } T \setminus \{0\}$ .

b) Se observă că  $v = v_1$ ,  $w = v$ , deci  $v, w \in \text{Ker } T$ .

c) Avem  $\begin{cases} T(v) = T(w) = 0 \\ T(e_2) = (2, 2, -2) = 2(e_1 + e_2 - e_3) \end{cases}$ . Folosind liniaritatea lui  $T$ , rezultă

$$\begin{cases} T(e_1) + T(e_2) + T(e_3) = 0 \\ T(e_1) - T(e_3) = 0 \\ T(e_2) = 2(e_1 + e_2 - e_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} T(e_1) = T(e_3) = e_1 - e_2 + e_3 \\ T(e_2) = 2(e_1 + e_2 - e_3). \end{cases}$$

d) Matricea  $A$  a lui  $T$  relativ la  $B$  are pe coloane coeficienții vectorilor  $T(e_1), T(e_2)$  și  $T(e_3)$  relativ la  $B$ , deci  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ . Polinomul caracteristic asociat lui  $A$  este  $P_A = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 2 & -1 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 1 & -2 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$ , iar vectorii proprii  $v = (a, b, c)^t$  asociați valorilor proprii  $\{0, 2\}$  se obțin succesiv:

$$\begin{aligned} \lambda = 0 &\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow a - 2b + c = 0 \Leftrightarrow v = \begin{pmatrix} 2b - c \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v = b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b, c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\lambda = 2 \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + c = 0 \\ a - 2b - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

**IV.** a) Fie  $(x_n')$ ,  $(x_n'')$  ∈  $L$ . Atunci adunând egalitățile de mai jos și înmulțind prima egalitate cu  $\lambda$ , obținem:

$$\begin{cases} x_{n+1}' = \frac{5}{6}x_n' - \frac{1}{6}x_{n-1}' \\ x_{n+1}'' = \frac{5}{6}x_n'' - \frac{1}{6}x_{n-1}'' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_{n+1}' + x_n'') = \frac{5}{6}(x_n' + x_n'') - \frac{1}{6}(x_{n-1}' + x_{n-1}'') \\ (\lambda x_{n+1}') = \frac{5}{6}(\lambda x_n') - \frac{1}{6}(\lambda x_{n-1}') \end{cases}$$

pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Rezultă  $(x_n' + x_n'') \in L$ ,  $(\lambda x_n') \in L$ , deci  $L$  este subspațiu vectorial închis.

b) Avem

$$\begin{cases} \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{6}u_{n-1} = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{2^n} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-1}} \left( \frac{5}{12} - \frac{2}{12} \right) = \frac{1}{2^{n+1}} = u_{n+1} \\ \frac{5}{6}v_n - \frac{1}{6}v_{n-1} = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3^n} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{1}{3^{n-1}} \left( \frac{5}{18} - \frac{2}{18} \right) = \frac{1}{3^{n+1}} = v_{n+1}, \end{cases}$$

deci  $(u_n)_n, (v_n)_n \in L$ .

c)  $u, v$  sunt liniar independenti, ca vectori în  $S$ . Într-adevăr,  $\alpha u_n + \beta v_n = 0$ ,  $v_n \geq 1$  conduce pentru  $n \in \{1, 2\}$  la sistemul

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{3} = 0 \\ \frac{\alpha}{4} + \frac{\beta}{9} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0, \end{cases}$$

deci  $\{u, v\}$  bază în  $L$ . Atunci orice sir  $(z_n)_n \in L$  se descompune după această bază. În cazul nostru, relația  $z_n = \frac{\alpha}{2^n} + \frac{\beta}{3^n}$ ,  $n \geq 1$  se rescrie pentru  $n \in \{1, 2\}$ ,

$$\begin{cases} \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{3} = 1 \\ \frac{\alpha}{4} + \frac{\beta}{9} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha + 2\beta = 6 \\ 9\alpha + 4\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -4 \\ \beta = 9 \end{cases} \Rightarrow z_n = (-4)\frac{1}{2^n} + 9\frac{1}{3^n}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2009-2010

**I.** a) Fie  $\{i, j, k\}$  o bază ortonormată în  $V_3$ . Notând

$$\sigma = \|u - i\|^2 + \|v - j\|^2 + \|w - k\|^2,$$

avem de demonstrat implicația  $\sigma < 1 \Rightarrow$  familia  $F = \{u, v, w\}$  este liniar independentă. Presupunem prin absurd că deși  $\sigma < 1$ , familia  $F$  este liniar dependentă, deci există o combinație liniară nulă  $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$  în care cel puțin unul dintre coeficienții  $\alpha, \beta, \gamma$  este nenul, adică  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 > 0$ . Atunci avem

$$\alpha(u - i) + \beta(v - j) + \gamma(w - k) = -(\alpha i + \beta j + \gamma k).$$

Aplicând acestei relații norma din  $\mathbb{R}^3$  și folosind faptul că baza  $\{i, j, k\}$  este ortonormală, rezultă

$$\|\alpha(u - i) + \beta(v - j) + \gamma(w - k)\| = \|-(\alpha i + \beta j + \gamma k)\| = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2.$$

Utilizând apoi succesiv inegalitatea triunghiului, inegalitatea Cauchy-Schwartz pentru produsul scalar canonic din  $\mathbb{R}^3$  și ipoteza  $\sigma < 1$ , rezultă

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= \|\alpha(u - i) + \beta(v - j) + \gamma(w - k)\| \\ &\leq |\alpha| \cdot \|u - i\| + |\beta| \cdot \|v - j\| + |\gamma| \cdot \|w - k\| \\ &\leq (|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2) \cdot (\|u - i\|^2 + \|v - j\|^2 + \|w - k\|^2) \\ &= \sigma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) < \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2, \end{aligned}$$

deci s-a obținut o contradicție. Prin urmare familia  $F$  este liniar independentă.

b) Notăm  $c_1 = \cos(\widehat{a}, i)$ ,  $c_2 = \cos(\widehat{b}, j)$ ,  $c_3 = \cos(\widehat{c}, k)$ . Avem  $c_k \in [-1, 1]$ ,  $\forall k \in \overline{1, 3}$ , deci folosind ipoteza, rezultă:

$$\frac{5}{2} < c_1 + c_2 + c_3 \leq 2 + c_3 \Rightarrow c_3 > \frac{1}{2}.$$

Analog se arată că  $c_1, c_2 > \frac{1}{2}$ . Admitem prin absurd că familia  $F = \{a, b, c\}$  este liniar dependentă. Fie  $\pi$  subspațiul vectorial generat de  $F$ , asimilat cu un plan care conține originea. Fie  $i' = pr_{\pi}i$ . Avem  $(\widehat{i}, i') \leq (\widehat{i}, a)$ , deci

$$\cos(\widehat{i}, i') \geq \cos(\widehat{i}, a) = c_1.$$

Notând cu  $n$  versorul normal la  $\pi$ , avem de asemenea  $\cos(\widehat{i}, i') = \sin(\widehat{n}, i)$  și deci  $c_1 \leq \sin(\widehat{n}, i) \stackrel{not}{=} s_1$ . Analog rezultă relațiile omologe

$$c_2 \leq \sin(\widehat{n}, j) \stackrel{not}{=} s_2, \quad c_3 \leq \sin(\widehat{n}, k) \stackrel{not}{=} s_3.$$

Adunând cele trei relații obținute, rezultă  $s_1 + s_2 + s_3 \geq c_1 + c_2 + c_3 > \frac{5}{2}$ . Notând

$$k_1 = \cos(\widehat{n}, i), \quad k_2 = \cos(\widehat{n}, j), \quad k_3 = \cos(\widehat{n}, k),$$

din faptul că  $n$  este versor, rezultă  $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 1$ . Folosind egalitățile

$$s_j^2 + k_j^2 = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\},$$

rezultă  $s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = 3 - (k_1^2 + k_2^2 + k_3^2) = 2$ . Au deci loc relațiile

$$s_1 + s_2 + s_3 > \frac{5}{2}, \quad s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = 2. \quad (6)$$

Dar, folosind inegalitatea Cauchy-Schwartz pentru suma din stânga inegalității și apoi a doua egalitate, rezultă

$$1 \cdot s_1 + 1 \cdot s_2 + 1 \cdot s_3 \leq \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6}.$$

Folosind prima relație din (6), obținem  $\sqrt{6} \geq s_1 + s_2 + s_3 > \frac{5}{2}$ , de unde  $\sqrt{6} > \frac{5}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{6} > 5 \Leftrightarrow 24 > 25$ , contradicție. În concluzie familia de vectori  $\{a, b, c\}$  este liniar independentă.

**II.** Se observă că implicația inversă este imediată: dacă  $B = P(A) = \sum_{k=0}^m a_k A^k$ , atunci  $AB = \sum_{k=0}^m a_k A^{k+1} = BA$ . Pentru a demonstra implicația directă, presupunem adevărată egalitatea  $AB = BA$ . Notând cu  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  cele  $n$  valori proprii distințe ale matricii  $A$  și respectiv cu  $f_1, \dots, f_n$  generatorii celor  $n$  subspații proprii  $S_1, \dots, S_n$  asociate, se observă că ipoteza  $AB = BA$  implică

$$A(Bf_k) = BAf_k = B(\lambda_k f_k) = \lambda_k (Bf_k),$$

deci  $Bf_k \in S_k$ . Dar  $S_k = L(f_k)$ , și deci există  $\mu_k \in \mathbb{C}$  a.î.  $Bf_k = \mu_k f_k$ . Prin urmare  $\{f_1, \dots, f_n\}$  este bază diagonalizatoare atât pentru  $A$ , cât și pentru  $B$ . Notăm cu  $C$  matricea diagonalizatoare  $C = [f_1, \dots, f_n]$  și avem matricele diagonale asociate  $\tilde{A} = C^{-1}AC = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  și  $\tilde{B} = C^{-1}BC = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ . Se constată că deoarece valorile proprii  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$  sunt distincte, determinantul Vandermonde care are pe linii vectorii  $v_k = (\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \in \mathbb{C}^n$ ,  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  este nenul, deci vectorii  $\{v_0, \dots, v_{n-1}\}$  formează o bază în  $\mathbb{C}^n$ . Deci notând  $w = (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{C}^n$ , există scalarii  $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ , astfel încât  $w = a_0 v_0 + \dots + a_{n-1} v_{n-1}$  și deci

$$\tilde{B} = a_0 I_n + a_1 \tilde{A} + a_2 \tilde{A}^2 + \dots + a_{n-1} \tilde{A}^{n-1} \equiv P(\tilde{A}).$$

Înmulțind această relație cu  $C$  la stânga și cu  $C^{-1}$  la dreapta și folosind egalitatea  $C \tilde{A}^k C^{-1} = (C \tilde{A} C^{-1})^k, \forall k \in \{0, \dots, n-1\}$ , rezultă  $B = P(A)$ .

**III.** a) Notând cu  $\text{div}(m)$  numărul divizorilor unui număr natural nenul  $m$ , cu  $p_1, p_2, \dots, p_n$  primele  $n$  numere prime în ordine crescătoare și cu  $b_n = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ . Se observă că  $\{b_n\}_{n \geq 1}$  este un sir de numere naturale strict crescător și că avem  $\text{div}(b_{n^2}) = 2^{n^2}$ . Sirul  $\sqrt[n]{a_n}$  conține subșirul

$$\sqrt[n]{a_{b_{n^2}}} = \sqrt[n]{\text{div}(b_{n^2})} = \sqrt[n]{2^{n^2}} = 2^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty,$$

deci raza de convergență a seriei de puteri este  $R = 1/\sqrt[n]{|a_n|} = 0$ .

b) Integrând prin părți, obținem

$$a_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx = - \int_0^1 x^n (e^{-x})' dx = - \left( x^n e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx \right),$$

deci  $a_n = -\frac{1}{e} + n a_{n-1}$ . Prin calcul direct, obținem  $a_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{e-1}{e}$ . Se observă că  $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ , deoarece integrandul este funcție pozitivă continuă neidentic nulă, deci  $0 < a_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ . Sumând relațiile  $a_k = k a_{k-1} - \frac{1}{e}, k \in \{1, \dots, n\}$  înmulțite pentru fiecare  $k \in \{1, \dots, n-1\}$  respectiv cu  $n(n-1)(n-2) \cdots (k+1)$  obținem

$$\begin{aligned} a_n &= n! a_0 - \frac{1}{e} (1 + n + n(n-1) + n(n-1)(n-2) + \cdots + n(n-1) \cdots 3 \cdot 2) \\ &= n! a_0 - \frac{1}{e} \left( \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-1)!} + \cdots + \frac{1}{2!} + \frac{1}{1!} \right) n! = \frac{n!}{e} (e - \theta_n), \end{aligned}$$

unde

$$\theta_n = \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e.$$

Dar  $e - \theta_n$  este eroarea dintre suma seriei Taylor asociată funcției  $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$ , deci este restul Lagrange în  $x = 1$ , dat de  $R = \frac{f^{(n+1)}(x^*)}{(n+1)!} = \frac{e^{x^*}}{(n+1)!}, x^* \in [0, 1]$ .

Dar  $0 \leq x^* \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{(n+1)!} \leq R \leq \frac{e}{(n+1)!}$ , deci

$$\frac{1}{e(n+1)} \leq a_n \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

și deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . Prin trecere la limită în relația de recurență  $a_n = \frac{1}{e} + n \cdot a_{n-1}$ , rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_{n-1} = \frac{1}{e}$ , deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_{n-1}}{(n+1)a_n} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1/e}{1/e} \cdot 1 = 1,$$

și deci raza de convergență este  $R = 1$ .

c) Orice sir de numere reale  $\{x_n\}_{n \geq 1}$  este convergent dacă și numai dacă este sir Cauchy, deci dacă

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \text{ a.i. } \forall n_1, n_2 \geq n, |x_{n_2} - x_{n_1}| < \varepsilon.$$

Dar pentru  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$  avem

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} > 0, \text{ a.i. } \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists n_1 = n, n_2 = 2n \geq n, \text{ cu proprietatea}$$

$$|x_{n_2} - x_{n_1}| = \left| \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right| \geq \underbrace{\left| \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} \right|}_{n \text{ termeni}} = \frac{1}{2} \geq \varepsilon,$$

deci sirul nu este sir Cauchy, deci nu este convergent. Fiind sir crescător cu termeni pozitivi, rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) = \infty$ , deci

$$L = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \left| 1 + \frac{1/(n+1)}{a_n} \right| = 1,$$

și deci  $R = \frac{1}{L} = 1$ . Distingem trei cazuri:

(i) pentru  $x = 1$ , seria numerică obținută are termenul general  $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$ , și este serie divergentă deoarece  $\lim b_n = \lim a_n = \infty \neq 0$ , deci seria de puteri diverge;

(ii) pentru  $x = -1$ , seria de puteri devine  $S(-1) = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$ ; termenul

general al acestei serii,  $b_n = (-1)^n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$  produce sirul sumelor parțiale, format din subșirurile  $b_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$  și  $b_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$ , deci  $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  și prin urmare pentru  $x = -1$  seria de puteri nu este convergentă;

(iii) pentru  $|x| < 1$ , folosim indicația din enunț. Observăm că are loc egalitatea

$$\left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} \cdot x^{n-k},$$

de unde rezultă

$$S(x) \equiv \sum_{n \geq 1} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n = \left( \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} \right) \cdot \left( \sum_{n \geq 1} x^n \right).$$

Dar  $\sum_{n \geq 1} x^n = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{x}{1-x}$ , și  $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ , deci suma seriei este  $S(x) = -\frac{x \ln(1-x)}{1-x}$ .

**IV.** a) Se observă că funcția  $\varphi(t) = t^{2n+1}e^{-t^2}$  este impară, deci pentru  $x > 0$  avem  $\int_{-x}^x \varphi(t)dt = 0$  și deci  $f_n(x) = f_n(-x), \forall x \in \mathbb{R}$ . Efectuând schimbarea de variabilă  $u = t^2$ , unde  $t \in (-\infty, x]$ , și apoi integrând prin părți, obținem

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{\infty}^{x^2} \frac{u^n}{2} e^{-u} du = -\frac{1}{2n!} \int_{x^2}^{\infty} u^n e^{-u} du \\ &= -\frac{1}{2n!} \left( -u^n e^{-u} \Big|_{x^2}^{\infty} + n \int_{x^2}^{\infty} u^{n-1} e^{-u} du \right) = -\frac{x^{2n} e^{-x^2}}{2n!} + f_{n-1}(x), \\ \text{deci } f_n(x) &= -\frac{x^{2n} e^{-x^2}}{2n!} + f_{n-1}(x). \end{aligned}$$

b) Integrând în relația de recurență obținută și notând  $a_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ , rezultă egalitatea  $a_n = -b_n + a_{n-1}$ , unde  $b_n = \int_0^1 \frac{x^{2n} e^{-x^2}}{2 \cdot n!} dx$ . Sumând relațiile obținute din relația de recurență prin înlocuirea  $n \rightarrow 1, 2, 3, \dots, n$ , avem

$$\begin{aligned} a_n &= a_0 - \sum_{n=1}^n \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{2n}}{n!} e^{-x^2} dx = a_0 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} \cdot \left( \sum_{n=1}^n \frac{x^{2n}}{n!} \right) dx = \\ &= a_0 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} \cdot \left( -1 + \sum_{n=0}^n \frac{(x^2)^n}{n!} \right) dx. \end{aligned}$$

Se observă că suma tinde pentru  $n \rightarrow \infty$  la  $e^{x^2}$ , deci trecând la limită în egalitatea obținută, rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_0 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} \cdot \left( -1 + e^{x^2} \right) dx = a_0 - \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - e^{-x^2}) dx = a_0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

$$\begin{aligned} \text{Dar } a_0 &= \int_0^1 \left( \frac{1}{0!} \int_{-\infty}^x t e^{-t^2} dt \right) dx = - \int_0^1 \left( \frac{e^{-t^2}}{2} \Big|_{-\infty}^x \right) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} dx, \text{ și} \\ \text{deci } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2009-2010

**I.** a) Cum  $\frac{1}{n} \in (0, \frac{\pi}{2}), \forall n \geq 2$ , rezultă că seria este o serie numerică cu termeni pozitivi. Seria  $\sum_{k=2}^{\infty} \sin^{\alpha} \left( \frac{1}{n} \right)$  are aceeași natură cu  $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ , deci este divergentă pentru  $\alpha \leq 1$  și convergentă pentru  $\alpha > 1$ .

b) Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin(\frac{1}{n})}{\sin(\frac{1}{n+1})} \right| = 1$ , rezultă că raza de convergență este  $\rho = 1$ . Dacă  $x = 1$ , avem  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ , divergentă. Dacă  $x = -1$ , avem  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \sin \frac{1}{n}$ , convergentă (criteriul lui Leibniz). Rezultă că mulțimea de convergență este  $[-1, 1]$ .

**II.** a) Notăm  $t(x, y) = x^2 + y^2$ . Atunci:

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= f'(t) \frac{\partial t}{\partial x} = 2x f'(t), & \frac{\partial g}{\partial y} &= f'(t) \frac{\partial t}{\partial y} = 2y f'(t), \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= 2f'(t) + 4x^2 f''(t), & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= 2f'(t) + 4y^2 f''(t),\end{aligned}$$

de unde  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 2f'(t) + 4f''(t)$ .

b) Pentru funcția  $h(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = 0. \end{cases}$ , problema

derivabilității apare doar în punctul  $(0, 0)$ . Fie

$$\alpha(x, y) = \frac{h(x, y) - h(0, 0) - \frac{\partial h}{\partial x}(0, 0)x - \frac{\partial h}{\partial y}(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Avem  $\frac{\partial h}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h((x, 0) - h(0, 0))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$ ; analog  $\frac{\partial h}{\partial y}(0, 0) = 0$ , deci  $\alpha(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \left( \frac{1}{x^2 + y^2} \right)$ . Dar  $\lim_{x, y \rightarrow 0} \alpha(x, y) = 0$ , deci  $h$  derivabilă în origine.

**III.** a) Avem  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x^2} = 1$ .

b) Fie  $f(t) = \ln(1 + t)$ . Atunci  $f'(t) = \frac{1}{1 + t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot t^n$  (dezvoltare în serie

Maclaurin), deci  $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{t^{n+1}}{n+1}$ . Rezultatul cerut este criteriul lui Cauchy, încrucișând:

$$\begin{aligned}&\left| (-1)^{n+1} \cdot \frac{t^{n+2}}{n+2} + (-1)^{n+2} \cdot \frac{t^{n+3}}{n+3} + \dots + (-1)^{n+p+1} \cdot \frac{t^{n+p+1}}{n+p+1} \right| \\ &= \left| (-1)^{n+1} \cdot \left| \frac{t^{n+2}}{n+2} + (-1) \cdot \frac{t^{n+3}}{n+3} + \dots + (-1)^{p+1} \cdot \frac{t^{n+p+1}}{n+p+1} \right| \right| \\ &= \left| \frac{t^{n+2}}{n+2} + (-1) \cdot t^{n+3} \cdot \left( \frac{1}{n+3} - \frac{t}{n+4} \right) + \dots + (-1)^p \cdot t^{n+p} \cdot \left( \frac{1}{n+p} - \frac{t}{n+p+1} \right) \right| \stackrel{t \in [0, 1]}{\leq} \\ &\leq \frac{1}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.\end{aligned}$$

c) Cum  $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$ , pentru  $|x| < 1$ , înlocuind  $x$  cu  $x^2$ , obținem  
 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$ , pentru  $|x| < 1$ .

d) Folosind punctul b), obținem  $\ln(1+x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+2}}{n+1}$ , pentru  $x \in [-1, 1]$ , deci  $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \int_0^1 x^{2n} dx$ , și deci  $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(2n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{2}{2n+1} - \frac{1}{n+1} \right) = 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$ . Calculăm cele două sume care intervin în ultima diferență. Pentru a afla  $S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ , se observă că din c), rezultă  $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$  pentru  $x \in (-1, 1)$ , deci integrând obținem  $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int x^{2n} dx$ . Rezultă  $\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$ , pentru  $x \in (-1, 1)$ . Considerând egalitatea pentru  $x = 0$ , obținem  $C = 0$ , deci  $\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$  pentru  $x \in (-1, 1)$ . Folosind criteriul Leibniz, rezultă convergență seriei și pentru  $x \in \{-1, 1\}$ , și deci  $\arctg x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$  pentru  $x \in [-1, 1]$ . Pentru  $x=1$ , obținem  $S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$ . Pentru a afla  $S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$ , se observă că avem  $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$ , pentru  $x \in (-1, 1]$ , unde convergența pentru  $x = 1$  este asigurată de criteriul lui Leibniz. Atunci, pentru  $x = 1$  obținem  $S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \ln 2$ . Prin urmare,  $I = 2 \cdot S_1 - S_2 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \ln 2 = \frac{\pi}{2} - \ln 2$ .

Totuși această metodă nu permite aflarea rezultatului exact. Integrala  $\int_1^0 \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$

---

<sup>1</sup>Se poate verifica ușor că seriile care intervin se pot integra termen cu termen pe domeniul indicat

nu este impropriu (punctul a). Folosind integrarea prin părți, rezultă

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx &= \int_0^1 \left(\frac{-1}{x}\right)' \cdot \ln(1+x^2) dx = \\ &= -\frac{1}{x} \cdot \ln(1+x^2) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{2 \cdot x}{1+x^2} dx = \\ &= -\ln(2) + \underbrace{\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \cdot \ln(1+\epsilon^2)}_0 + 2 \cdot \arctg x = \frac{\pi}{2} - \ln(2). \end{aligned}$$

**IV.** a) Fie  $\lambda$  o valoare proprie a matricii  $A$  și  $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  un vector propriu asociat valorii proprii  $\lambda$ . Atunci avem

$$Av = \lambda v, \quad A^2v = A \cdot Av = \lambda Av = \lambda^2 v, \quad A^3v = \lambda^3 v.$$

Folosind relația din ipoteză aplicată vectorului  $v$ , obținem

$$A^3v = Av \Rightarrow \lambda^3v = \lambda v \Leftrightarrow (\lambda^3 - \lambda)v = 0.$$

Dar  $v \neq 0$ , deci  $\lambda^3 - \lambda = 0$ , și deci singurele valori proprii sunt rădăcinile ecuației  $\lambda(\lambda^2 - 1) = 0$ , deci  $\lambda \in \{0, \pm 1\}$ .

b) Deoarece matricea are valori proprii reale, ea este jordanabilă. Fie  $C$  matricea modală (diagonalizatoare) care are pe coloane coordonatele unei baze formate din vectori proprii și eventual vectori principali ai matricei  $A$ . Atunci  $J = C^{-1}AC$  are formă canonica Jordan și se observă că

$$J^3 = (CAC^{-1})^3 = CA^3C^{-1} = CAC^{-1} = J,$$

deci  $J^3 = J$ . Distingem trei cazuri: (i) dacă valorile proprii sunt distincte  $\{-1, 0, 1\}$ ; atunci, acestea fiind simple (de multiplicitate unu), matricea este diagonalabilă; (ii) dacă una dintre valorile proprii este dublă și prin absurd  $A$  nu este diagonalabilă, atunci  $J$  conține două celule Jordan, una dintre acestea având ordinul 2; în acest caz  $J = D + N$  unde  $D$  este matrice diagonală cu proprietatea  $D^3 = D$  (deoarece are pe diagonală valori proprii ale lui  $A$ , din multimea  $\{\pm 1, 0\}$ ), iar  $N$  este o matrice nenulă nilpotentă de ordinul doi ( $N^2 = 0$ ). Atunci

$$J^3 = J \Leftrightarrow (D + N)^3 = D + N \Leftrightarrow (3D^2 - I_3)N = O_3.$$

Dar matricea  $3D^2$  conține pe diagonală numerele 0 sau 3, deci  $(3D^2 - I_3)$  este o matrice diagonală inversabilă și deci  $N = O_3$ , contradicție; (iii) dacă  $A$  admite o unică valoare proprie triplă  $\lambda \in \{\pm 1, 0\}$ , atunci  $J$  conține o singură celulă Jordan; în acest caz  $J = D + N$  unde  $D = \lambda I_3$  este matrice diagonală cu proprietatea  $D^3 = D$ , iar  $N$  este o matrice nenulă nilpotentă de ordinul trei ( $N^3 = 0$ ). Atunci

$$J^3 = J \Leftrightarrow (D + N)^3 = D + N \Leftrightarrow (3D^2 - I_3)N + 3DN^2 = O_3.$$

Dar  $(3D^2 - I_3) = (3\lambda^2 - 1)I_3 \stackrel{not}{=} M$  este o matrice diagonală inversabilă și deci  $N = -3M^{-1}DN^2$ , unde matricea din stanga este nilpotentă de ordin trei, iar cea din

dreapta este fie nilpotentă de ordin doi (pentru  $\lambda \in \{\pm 1\}$ ), fie nulă (în cazul  $\lambda = 0$ ), deci contradicție. În concluzie, în toate cele trei cazuri,  $A$  este matrice diagonalizabilă.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil electric, 2010-2011

**I.** a) Polinomul caracteristic al matricei  $A$  este  $P(\lambda) = \lambda^2 - Tr(A)\lambda + \det(A)$ , deci teorema Cayley-Hamilton conduce la relația  $A^2 - Tr(A) \cdot A + \det(A) \cdot I_2 = O_2$ , unde  $O_2$  este matricea nulă de ordin 2, iar  $I_2$  este matricea unitate. Dar  $Tr(A) = 0$ , deci relația devine  $A^2 = -\det(A) \cdot I_2$  și deci aplicând urma în ambii membri, obținem  $Tr(A^2) = -2 \det(A)$ . Cum însă din ipoteză  $Tr(A^2) = 0$ , rezultă  $\det(A) = 0$ . Prin urmare  $A^2 = -2 \cdot 0 \cdot I_2 = O_2$ .

b) Se poate verifica imediat că urma oricărei matrice de forma  $[A, B]$  este nulă<sup>2</sup>:

$$\begin{aligned} Tr([A, B]) &= \sum_{i=1}^n ([A, B])_{ii} = \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}b_{ji} - b_{ij}a_{ji}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ji} - \sum_{i,j=1}^n b_{ij}a_{ji} \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ji} - \sum_{i,j=1}^n b_{ji}a_{ij} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ji} - \sum_{i,j=1}^n b_{ji}a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij}b_{ji} - b_{ji}a_{ij}) = 0, \end{aligned}$$

unde în al doilea termen s-au redenumit indicii ( $i \leftrightarrow j$ ) și apoi s-au permuat cele două sume.

Aplicând urma în ambii membri ai egalității  $[A, B] = A$ , rezultă egalitatea  $0 = Tr(A)$  (\*). Egalitatea din enunț se rescrie  $AB - BA = A$ . Amplificând egalitatea cu  $A$  la stânga, apoi la dreapta, sumând cele două egalități obținute și aplicând urma, obținem succesiv:

$$\begin{cases} A^2B - ABA = A^2 \\ ABA - BA^2 = A^2 \end{cases} \Rightarrow A^2B - BA^2 = 2A^2 \Leftrightarrow [A^2, B] = 2A^2,$$

deci  $Tr([A^2, B]) = 2Tr(A^2)$ . Urma din stânga fiind nulă, rezultă  $0 = Tr(A^2)$  (\*\*). Dar relațiile (\*) și (\*\*) sunt exact ipotezele punctului anterior a), deci  $A^2 = O_2$ .

**II.** a) Aria triunghiului cu formula lui Heron este  $\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ , unde  $p = (a+b+c)/2$ . Din inegalitatea mediilor, obținem

$$\sqrt[3]{(p-a)(p-b)(p-c)} \leq \frac{3p-a-b-c}{3} = \frac{p}{3} \Rightarrow (p-a)(p-b)(p-c) \leq \frac{p^3}{27}.$$

Prin urmare  $\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \leq \sqrt{p} \sqrt{\frac{p^3}{27}} = \frac{p^2}{3\sqrt{3}}$ , și aria maximă este  $\mathcal{A}_* = \frac{p^2\sqrt{3}}{9}$ , care se atinge pentru  $p-a = p-b = p-c$ , deci pentru cazul triunghiului echilateral ( $a = b = c$ ).

b) Consecință imediată a Teoremei lui Fermat.

c) Considerăm funcția dată în enunț,  $g(x, y) = e^{3x} + y^3 - 3e^x y$ . Unicul punct critic al acesteia este  $(0, 1)$  și se demonstrează ușor că este punct de minim local pentru  $g$ .

---

<sup>2</sup>Pentru cazul din problemă, având  $n = 2$  proprietatea se poate verifica direct, considerând două matrice pătratice arbitrar de ordinul doi.

Valoarea funcției în acest punct este  $g(0, 1) = -1$ . Dar luând, de exemplu,  $x = 0$  și  $y = -3$ , constatăm că  $g(0, -3) = -17 < -1 = g(0, 1)$ , deci  $(0, 1)$  nu este punct de minim global al funcției.

**III. a)** Demonstrăm echivalența prin dublă implicație.

”(i)  $\Rightarrow$  (ii)”. Fie  $\text{Ker } f = \text{Im } f$ . Atunci pentru orice  $v \in E$ , notând  $w = f(v)$ , avem  $f^2(v) = f(w)$ , unde  $w = f(v) \in \text{Im } f = \text{Ker } f$ , deci  $f(w) = 0$  și prin urmare  $f^2(v) = 0$ . Rezultă  $f^2 = 0$ , deci afirmația (ii)<sub>1</sub>. Se observă că deoarece  $\text{Ker } f = \text{Im } f$ , rezultă  $\dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f$ . Notăm cu  $m$  această dimensiune comună. Din teorema dimensiunii pentru transformări liniare, avem

$$\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f, \quad (7)$$

care se rescrie  $2n = m + m$ , deci  $m = n$  și prin urmare  $\dim \text{Im } f = n$ , deci afirmația (ii)<sub>3</sub>. Pe de altă parte,  $f \neq 0 \Leftrightarrow \text{Im } f \neq \{0\} \Leftrightarrow \dim \text{Im } f \neq 0$ . Dar  $\dim \text{Im } f = n \geq 1$ , ceea ce implică  $f \neq 0$ , deci rezultă afirmația (ii)<sub>2</sub>.

Implicația ”(ii)  $\Rightarrow$  (i)”. Fie satisfăcute proprietățile  $f^2 = 0$ ,  $f \neq 0$ ,  $\dim \text{Im } f = n$ . Pentru orice  $w = f(v) \in \text{Im } f$ , avem  $f(w) = f(f(v)) = f^2(v) = 0$ , deci  $w \in \text{Ker } f$ . Avem deci inclusiunea  $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$ . Însă din (7) rezultă

$$\dim \text{Ker } f = 2n - \dim \text{Im } f = 2n - n = n \Rightarrow \dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f = n.$$

Cum însă  $\text{Im } f$  este subspațiu vectorial în  $\text{Ker } f$ , având aceeași dimensiune rezultă că aceste spații coincid, deci (i).

b) Alegem  $E = \mathbb{R}^{2n}$  și aplicația liniară

$$f(w) = (y, 0), \quad \forall w = (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_x; \underbrace{y_1, \dots, y_n}_y) \in \mathbb{R}^{2n} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n.$$

Se pot verifica ușor următoarele: (i)  $\text{Ker } f = \text{Im } f = \{(x; 0_n) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ , (ii)<sub>1</sub>  $f^2((x; y)) = f((y, 0_n)) = (0_n; 0_n) = 0_{2n}$ , deci  $f^2 = 0$ ; (ii)<sub>2</sub>:  $f \neq 0$  deoarece, spre exemplu,  $f(0_n; \underbrace{1, \dots, 1}_{1_n}) = (1_n, 0_n) \neq 0_{2n}$ ; (ii)<sub>3</sub>: din relația (7) și din teorema dimensiunii rezultă  $\dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f = n$ .

**IV. a)** Se folosește dezvoltarea binomială a lui  $(1 - x)^\alpha$ , în care se ia  $\alpha = -\frac{1}{2}$  și  $x \rightarrow x^2$ .

b) Dezvoltarea cerută se determină integrând termen cu termen seria de la punctul a). Pentru convergența uniformă, folosim inegalitatea

$$\sum_{n \geq 1} \left| \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{1}{2n+1},$$

unde convergență seriei din membrul drept rezultă din Criteriul lui Duhamel.

c) Pentru demonstrarea egalității, folosim o metodă elementară. Notăm cu  $I_n$  integrala cerută. Integrând prin părți, avem

$$I_n = \int_0^1 x^{2n} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -x^{2n} \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 + 2n \int_0^1 x^{2n-1} \sqrt{1-x^2} dx = 2nI_{n-1} - 2nI_n,$$

de unde  $I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$ . Cum  $I_1 = \frac{2}{3}$ , rezultă formula dorită.

d) Din punctul b), avem  $\arcsin x - x = \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \dots 2n-1}{2 \cdot 4 \dots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ .

Atunci  $\int_0^1 \frac{\arcsin x - x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \dots 2n-1}{2 \cdot 4 \dots 2n(2n+1)} \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx$ , sau, echivalent,

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \dots 2n-1}{2 \cdot 4 \dots 2n(2n+1)} \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Dar, la punctul c), am aflat că  $\int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2 \cdot 4 \dots 2n}{1 \cdot 3 \dots 2n+1}$ , și înlocuind mai sus, obținem

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \dots 2n-1}{2 \cdot 4 \dots 2n(2n+1)} \cdot \frac{2 \cdot 4 \dots 2n}{1 \cdot 3 \dots 2n+1} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

e) Calculăm  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2}$ . Această sumă poate fi scrisă ca  $\frac{1}{4} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$ ,

de unde  $\frac{3}{4} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$ . De la punctul d), stim că  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} =$

$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$  această ultimă integrală, făcând schimbarea de variabilă  $\arcsin x = t$ , are valoarea  $\frac{\pi^2}{8}$ . Așadar,  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24}$ . Suma cerută este  $\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{6}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2010-2011

**I. a)** Avem  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ ,  $x \in (-1, 1)$ . Cum însă  $\left(\ln \frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n$ ,

integrând termen cu termen, obținem  $\ln \frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ,  $x \in (-1, 1)$ .

**b)** Folosind a), rezultă  $\ln \frac{1}{1-x} - x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^n}{n} = \sum_{k \geq 1} \frac{x^{n+k}}{n+k}$ ,  $x \in (-1, 1)$ .

**c)** Obținem succesiv

$$\sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} x^{n+k} = \sum_{n \geq 1} x^n \sum_{k \geq 1} x^k = \sum_{n \geq 1} x^n \left( \frac{1}{1-x} - 1 \right) = \frac{1}{1-x} \sum_{n \geq 1} x^{n+1} = \frac{x^2}{(1-x)^2}.$$

**d)** Se poate observa direct că  $\sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} \frac{x^{n+k}}{n+k} = \frac{1}{1-x} - \ln \frac{1}{1-x}$ . Altfel. Notăm cu

$S(x)$  seria cerută. Pornim de la  $\int \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} x^{n+k} dx = \int \frac{x^2}{(1-x)^2} dx$  folosind rezultatul

de la punctul c). Obținem  $\sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 1} \frac{x^{n+k+1}}{n+k+1} = x + 2\ln(1-x) - \frac{1}{1-x}$ , sau

$$\sum_{n \geq 1} \left( \sum_{k \geq 1} \frac{x^{k+n}}{k+n} - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = S(x) - \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+1}}{n+1} = S(x) - \left( \ln \frac{1}{1-x} - x \right),$$

de unde  $S(x) = \ln(1-x) + \frac{1}{1-x}$ .

**III.** a) Obținem  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^3}$ . Nedeterminarea este de tipul  $\frac{0}{0}$  și folosind regula lui L'Hospital, avem  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2}-1}{-x} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2}-1}{-x^2} = \frac{-x^2}{x} = 0$ . Analog, rezultă  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ .

b) Se pune problema diferențiabilității Fréchet în punctul  $(0,0)$ . Calculăm limita  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-e^{-x^2-y^2}-x^2-y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ . Notând  $t = x^2+y^2$ , această limită se rescrie  $\lim_{t \searrow 0} \frac{1-e^{-t}-t}{t^{\frac{3}{2}}} = 0$ , deci  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(0,0)$ .

c) Folosim dezvoltarea în serie  $e^x = \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!}$ , și obținem  $e^{-x^2} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k}}{k!}$  și  $1 - e^{-x^2} = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k}}{k!}$ , deci  $\frac{1-e^{-x^2}}{x^2} = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k-2}}{k!}$ .

**III.** a) Prin calcul direct, obținem  $\partial D = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$ , unde

$$\gamma_1 : x = t, y = 0, t \in [0,3]; \quad \gamma_2 : y = t, x = 0, t \in [0,3]; \quad \gamma_3 : x = t, y = -3-t, t \in [0,3].$$

b)  $x = -1, y = -1$  este punct de minim global al funcției și se află în interiorul lui  $D$ .

c) Sunt trei situații care apar la afilarea extremului condiționat. Pentru  $x = 0$ , avem  $L_1(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda x$  și obținem  $(0, -\frac{1}{2})$  punct de minim local. Pentru  $y = 0$ , avem  $L_2(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda y$  și obținem  $(-\frac{1}{2}, 0)$  punct de minim local. Pentru  $x + y + 3 = 0$ ,  $L_3(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda(x + y + 3)$  și obținem  $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$  punct de minim local.

**IV.** a) Fie  $x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$ . Aflăm nucleul transformării  $T$ :

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2t \\ x_2 = t, t \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow x = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

și obținem o bază a nucleului  $B_{\text{Ker } T} = \{(-2,1)^t\}$ , deci  $\dim \text{Ker } T = 1$ . Pentru imaginea lui  $T$ , notăm  $B_0 = \{e_1 = (1,0)^t, e_2 = (0,1)^t\} \subset \mathbb{R}^2$ , și obținem generatorii imaginii  $T(e_1) = (1,2)^t \neq 0_{\mathbb{R}^2}$  și  $T(e_2) = (2,4)^t = 2 \cdot (1,2)^t = 2T(e_1)$ . Deci o bază a imaginii este  $B_{\text{Im } T} = \{T(e_1) = (1,2)^t\}$ , și deci  $\dim \text{Im } T = 1$ .

b) Matricea lui  $A$  relativ la  $B_1$  este  $[A]_{B_1} = [A]_{\{e_2, e_1\}} = [T(e_2), T(e_1)]_{\{e_2, e_1\}}$ . Avem

$$\begin{cases} T(e_2) = (2, 4)^t = 4e_2 + 2e_1 \\ T(e_1) = (1, 2)^t = 2e_2 + 1e_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [T(e_2)]_{B_1} = (4, 2)^t \\ [T(e_1)]_{B_1} = (2, 1)^t \end{cases} \Rightarrow [T]_{B_1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

*Altfel.* Notăm  $C = [B_1]_{B_0} = [e_2, e_1]_{B_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  și  $A' = [T]_{B_1}$ . Folosind relația  $A' = C^{-1}AC$ , rezultă

$$[T]_{B_1} = A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) Observăm că  $B_2$  este bază în spațiul  $\mathbb{R}^2$ , deoarece matricea sa relativ la  $B_0$ ,  $[B_2]_{B_0} = [(1, 2)^t, (2, -1)^t] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$  este nesingulară ( $\det[B_2]_{B_0} = -5 \neq 0$ ). Atunci matricea de trecere de la  $B_1$  la  $B_2$  este

$$C_{B_1 B_2} = [B_1]_{B_0}^{-1} [B_2]_{B_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

*Altfel.* Pentru a obține matricea de schimbare de bază  $C_{B_1 B_2}$ , descompunem baza nouă  $B_2$  după cea veche  $B_1$  și formăm din coeficienții descompunerii coloanele matricei:

$$\begin{cases} (1, 2) = a(0, 1) + b(1, 0) \\ (2, -1) = c(0, 1) + d(1, 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2, & b = 1 \\ c = -1, & d = 2 \end{cases} \Rightarrow C_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

d) Folosind relația  $A' = C^{-1}AC$  de schimbare a matricei lui  $T$  de la baza  $B_0$  la baza  $B_2$ , obținem

$$[T]_{B_2} = [B_2]_{B_0}^{-1} [T]_{B_0} [B_2]_{B_0} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

*Altfel.* Exprimăm imaginile prin  $T$  ale vectorilor noii baze  $B_2 = \{(1, 2), (2, -1)\}$  relativ la  $B_2$ , iar coeficienții descompunerilor formează coloanele matricei operatorului liniar  $T$  relativ la baza  $B_2$ :

$$\begin{cases} T((1, 2)) = a(1, 2) + b(2, -1) \\ T((2, -1)) = c(1, 2) + d(2, -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5, & b = 0 \\ c = 0, & d = 0 \end{cases} \Rightarrow [T]_{B_2} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

e) Notăm  $D = [T]_{B_2} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Matricea  $D$  este însă formă diagonală a matricei  $A$ , cu valorile proprii  $\{5, 0\}$  aflate pe diagonala acesteia, iar baza  $B_2$  are calitatea de bază diagonalizatoare pentru endomorfismul  $T$ .

f) Știm că polinomul caracteristic al lui  $T$  nu depinde de baza relativ la care se consideră matricea endomorfismului, deci

$$P_T(\lambda) = P_A(\lambda) = P_D(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda.$$

Folosind teorema Cayley-Hamilton, rezultă  $P_T(A) = O_2$ , deci  $A^2 - 5A = O_2$ . Prin urmare  $A^2 = 5A$ , deci  $A^k = 5^{k-1}A$ ,  $\forall k \geq 2$ . Atunci

$$\begin{aligned} \langle A^n \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle &= \langle 5^{n-1}A \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle = 5^{n-1} \langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle \\ &= 5^{n-1} \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle = 5^{n-1} \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2011-2012

**I.** a) Studiem absolut convergența seriei cu criteriul raportului. Obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{1+x^{2n}}{1+x^{2n+2}} = \begin{cases} |x|, & |x| < 1 \\ 1, & |x| = 1 \\ \frac{1}{|x|}, & |x| > 1. \end{cases}$$

Rezultă că seria este absolut convergentă, deci convergentă, pentru  $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ . Pentru  $x = 1$ , seria este evident divergentă și pentru  $x = -1$  convergența seriei rezultă din criteriul lui Leibniz.

b) Pentru  $x \in (0, y]$ , folosind  $x^{2n} + 1 \geq 1$ , rezultă  $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n-1}}{(n+1)(x^{2n}+1)} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{y^{n-1}}{n+1}$ .

Dar  $y < 1$ , deci seria din membrul drept converge. Prin urmare seria dată este uniform convergentă pentru orice  $y \in (0, 1)$ . Pentru  $x = 0$ , seria este 0.

c) Conform punctului b) seria este uniform convergentă pe  $(0, 1)$ , deci are loc egalitatea  $\int_0^1 f(x)dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x^{2n}} dx$ . Cu schimbarea de variabilă  $x^n = t$ , rezultă  $\int_0^1 f(x)dx = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ .

**II.** a) Folosind regula de derivare a produsului de funcții, din definiția lui  $\psi$  rezultă:

$$\psi'(x) = (x^{-a}\varphi(x))' = (-a)x^{-a-1}\varphi(x) + x^{-a}\varphi'(x) = (-a)x^{-a-1}\varphi(x) + x^{-a-1} \cdot x\varphi'(x).$$

Folosind relația din enunț, obținem  $\psi'(x) = (-a)x^{-a-1}\varphi(x) + x^{-a-1} \cdot a\varphi(x) = 0$ . Deci  $\psi$  având derivata nulă, este constantă pe intervalul conex  $(0, \infty)$ , și deci  $\psi(x) = c$ ,  $\forall x > 0$ . Atunci din relația care definește funcția  $\psi$ , rezultă  $c = x^{-a}\varphi(x)$ , și prin urmare  $\varphi(x) = c \cdot x^a$ .

b) i)  $V(a)$  este o submulțime în spațiul vectorial  $W = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ , considerat cu operațiile din enunț. Calitatea de spațiu vectorial a lui  $V(a)$  decurge din cea de subspațiu vectorial în  $W$ , ceea ce se verifică imediat:

- Dacă  $f, g \in V(a)$ , din  $f, g$  derivabile rezultă  $f + g$  derivabilă, iar prin sumare obținem

$$\begin{cases} xf'(x) = af(x) \\ xg'(x) = ag(x) \end{cases} \Rightarrow x(f+g)'(x) = a(f+g)(x), \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci } f+g \in V(a).$$

- Dacă  $k \in \mathbb{R}$  și  $f \in V(a)$ , din  $f$  derivabilă, rezultă  $kf$  derivabilă, iar prin înmulțire cu  $k$ , rezultă

$$xf'(x) = af(x) \Rightarrow x(kf)'(x) = a(kf)(x), \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci } kf \in V(a).$$

Rezultă  $(V(a), +, \cdot_{\mathbb{R}})$  spațiu vectorial cu operațiile definite în enunț, induse din  $W$ .

ii) Fie  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$  și  $f \in V(a)$ . Atunci din relația  $xf'(x) = af(x), \forall x \in \mathbb{R}$ , pentru  $x = 0$  obținem  $0 = af(0)$ . Dar  $a \neq 0$ , deci  $f(0) = 0$ . Fie  $f \in V(a)$ . Pentru  $x > 0$  s-a obținut la punctul a) forma funcției  $f$ ,  $f(x) = cx^a$ , unde  $c \in \mathbb{R}$ . Pentru  $x < 0$ , după schimbarea de variabilă  $x' = -x$  și cu un rationament similar celui de la punctul a), obținem  $f(x) = c(-x)^{-a}$ , unde  $c \in \mathbb{R}$ . Deci  $V(a)$  conține acele funcții derivabile care au forma

$$f(x) = \begin{cases} c_1(-x)^a, & \text{pentru } x < 0 \\ c_2, & \text{pentru } x = 0 \\ c_3x^a, & \text{pentru } x > 0 \end{cases}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Se observă că pentru  $a = 0$ , obținem  $f'(x) = 0$ , deci  $f(x) = c, \forall x \in \mathbb{R}$ . Pentru  $a \neq 0$ , punând condiția de derivabilitate, avem

- pentru  $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$ , rezultă  $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ , deci  $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$  și  $V(a) = \{0\}$ ;
- pentru  $a = 1$ , rezultă  $c_1 = -c_3$  și  $c_2 = 0$ , deci  $f(x) = cx, \forall x \in \mathbb{R}$ ;
- pentru  $a > 1$  avem  $c_2 = 0$ , iar  $c_{1,3} \in \mathbb{R}$ .

Se observă că pentru  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ , avem  $f'(0) = 0$ .

iii) Pentru  $a = 2 > 1$ , avem  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ ; și obținem

$$V(2) = \{c_1 \cdot f_1 + c_3 \cdot f_2 \mid c_1, c_3 \in \mathbb{R}\} = \text{Span}(\{f_1, f_2\}),$$

unde

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2, & \text{pentru } x \leq 0 \\ 0, & \text{pentru } x > 0 \end{cases}, \quad f_2(x) = \begin{cases} 0, & \text{pentru } x \leq 0 \\ x^2, & \text{pentru } x > 0, \end{cases}$$

și deci  $\dim V(2) = 2$ .

Pentru  $a = 1$ , rezultă  $c_1 = -k, c_3 = k, k \in \mathbb{R}$  și  $c_2 = 0$ ; obținem

$$V(1) = \{kf_0 \mid k \in \mathbb{R}\} = \text{Span}(f_0), \text{ pentru } f_0(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci } \dim V(1) = 1.$$

Pentru  $a = 1/2 \in (0, 1)$ , obținem  $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ , deci  $f = 0$ , iar  $V(1/2) = \{0\}$ , de unde rezultă  $\dim V(1/2) = 0$ .

**III. a)** Fie  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , unde  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  care satisfac condiția din enunț.

Egalitatea se rescrie

$$\begin{aligned} AB = BA &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 2a + c, & 2a + 3b = 2b + 3d \\ 2c + d = a + 3c, & 2c + 3d = b + 3d \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} b = 2c \\ c = d - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2(s-t) \\ s-t \\ s \end{pmatrix} \Leftrightarrow B = \begin{pmatrix} t & 2(s-t) \\ s-t & s \end{pmatrix}, \quad t, s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Polinomul caracteristic al matricei  $B$  este

$$P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} t-\lambda & 2(s-t) \\ s-t & s-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (s+t)\lambda + (5st - 2s^2 - 2t^2).$$

Ecuația caracteristică  $P_B(\lambda) = 0$  conduce la rădăcinile  $\lambda_1 = 2t - s$ ;  $\lambda_2 = 2s - t$ ,  $s, t \in \mathbb{R}$ , valori proprii simple, deci  $B$  este diagonalizabilă. Dar  $P_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$  are rădăcinile reale  $\hat{\lambda}_1 = 1$ ,  $\hat{\lambda}_2 = 4$ . Se observă că egalând valorile proprii ale matricelor  $B$  și  $A$ , avem

$$\begin{cases} \lambda_1 = \hat{\lambda}_1 \\ \lambda_2 = \hat{\lambda}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2t - s = 1 \\ 2s - t = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ s = 3, \end{cases}$$

deci pentru  $t = 2, s = 3$ , avem  $\lambda_1 = \hat{\lambda}_1 = 1$  și  $\lambda_2 = \hat{\lambda}_2 = 4$ , deci valorile proprii ale celor două matrice coincid.

*Altfel.* Printre matricele  $B$  care comută cu  $A$  se află și matricea  $A$ , deoarece  $A$  comută cu ea însăși ( $A \cdot A = A \cdot A$ ). Deci existența unei matrice de tip  $B$  cu valori proprii identice cu ale lui  $A$  este asigurată chiar de matricea  $A$ . Se mai observă că înlocuind  $t = 2, s = 3$  în expresia generică a matricelor  $B$ , se obține chiar matricea  $A$ .

b) Considerăm aplicațiile  $f_{\pm} = \frac{1}{2}(f \pm k) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , unde  $k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  este projectorul pe subspațiul  $\text{Ker } f$  asociat descompunerii în sumă directă din enunț,  $k(x) = x_1$ , pentru  $x = x_1 + x_2$  cu  $x_1 \in \text{Ker } f, x_2 \in \text{Im } f$  unic determinați de  $x$ . Se verifică ușor că  $f_{\pm}$  sunt liniare. Deoarece  $f_{\pm}$  sunt endomorfisme ale spațiului vectorial *finit-dimesnional*  $\mathbb{R}^n$ , deci pentru a arăta că sunt automorfisme este suficient de probat injectivitatea acestora<sup>3</sup>. Este suficient deci de arătat că nucleul acestora este subspațiu nul. Spre exemplu, pentru  $f_+$  probăm egalitatea  $\text{Ker } f_+ = \{0\}$  prin dublă incluziune. Deoarece  $\text{Ker } f_+$  este subspațiu vectorial, rezultă  $\{0\} \subset \text{Ker } f_+$ . Pentru inclusiunea inversă, folosim faptul că suma din enunț este directă ( $\text{Im } f \cap \text{Ker } f = \{0\}$ ). Pentru  $x \in \mathbb{R}^n$ , avem

$$\begin{aligned} x \in \text{Ker } f_+ &\Leftrightarrow f_+(x) = 0 \Leftrightarrow (f+k)(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = -k(x) \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\} \\ &\Rightarrow f(x) = k(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker } f \text{ și } k(x) = 0 \Rightarrow x = k(x) = 0 \Rightarrow x \in \{0\}, \end{aligned}$$

deci  $\text{Ker } f_+ \subset \{0\}$ . Prin urmare  $\text{Ker } f_+ = \{0\}$ , iar  $f_+$  injectivă, de unde bijecțivitatea lui  $f_+$  pe baza observației de mai sus. Pentru  $f_-$  se procedează analog.

**IV.** a) Fie  $\mathcal{M} = d_1 \cap d_2 \subset \mathbb{R}^3$ . Această mulțime este descrisă de sistemul de ecuații liniare cu parametru

$$\begin{cases} x - y = 0, & x + y - z = 0 \\ x - z = 0, & x + y + z = \lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = z = 0 \\ 0 = \lambda. \end{cases}$$

Sistemul este compatibil doar pentru  $\lambda = 0$  - având în acest caz soluția unică  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ , deci  $\mathcal{M} = \{O(0, 0, 0)\}$ , drepte concurente în origine. Pentru  $\lambda \neq 0$ , sistemul este incompatibil, nu are soluție, iar intersecția celor două drepte este vidă ( $\mathcal{M} = \emptyset$ , dreptele nu se intersectează). În acest caz, vectorii directori ai celor două drepte (dați de exemplu de produsele vectoriale ale vectorilor normali la planele

<sup>3</sup>Această proprietate a endomorfismelor injective pe spații finit dimensionale rezultă imediat din teorema dimensiunii pentru transformări liniare,  $\underbrace{\dim \mathbb{R}^n}_n = \underbrace{\dim \text{Ker } f}_0 + \dim \text{Im } f$ , de unde rezultă surjectivitatea constănd egalitatea dimensiunii imaginii cu cea a codomeniului  $\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^n = n$ .

ce le determină), sunt:

$$\bar{v}_1 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \equiv (1, 1, 2), \quad \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \equiv (1, -2, 1),$$

și deoarece

$$\bar{v}^\perp = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \equiv (5, 1, -3) \neq (0, 0, 0),$$

rezultă că vectorii directori  $\bar{v}_1$  și  $\bar{v}_2$  nu sunt colineari, deci dreptele nu sunt paralele.

b) Dreapta căutată este perpendiculara comună  $d^\perp$  a dreptelor  $d_1$  și  $d_2$ , drepte care pentru  $\lambda = 1$  sunt disjuncte și neparallele (deci  $d^\perp$  există și este unică). Atunci  $d^\perp = \pi_1 \cap \pi_2$ , unde

$$\begin{cases} \pi_1 \text{ este determinat de vectorii liberi } \bar{v}_1, \bar{v}^\perp \text{ și de un punct } A_1 \in d_1 \\ \pi_2 \text{ este determinat de vectorii liberi } \bar{v}_2, \bar{v}^\perp \text{ și de un punct } A_2 \in d_2. \end{cases}$$

Alegem  $A_1(0, 0, 0) \in d_1$  și  $A_2(0, 1, 0) \in d_2$ . Atunci ecuațiile căutate sunt:

$$d^\perp : \begin{cases} \pi_1 : \begin{vmatrix} x - 0 & y - 0 & z - 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & -3 \end{vmatrix} \Leftrightarrow 5x - 13y + 4z = 0 \\ \pi_2 : \begin{vmatrix} x - 0 & y - 1 & z - 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \end{vmatrix} \Leftrightarrow 5x + 8y + 11z - 8 = 0, \end{cases}$$

și deci perpendiculara comună este dată de ecuațiile  $d^\perp : \begin{cases} 5x - 13y + 4z = 0 \\ 5x + 8y + 11z - 8 = 0. \end{cases}$

## CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2011-2012

**I.** a) Obținem  $\lim_{x \searrow 0} x^{1/x} = \lim_{x \searrow 0} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{-\infty} = 0$ , și  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^0 = 1$ .

b) i) Prin calcul direct, rezultă  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2)^{1/x^2}}{x}$ . Avem o nedeterminare de tipul  $\frac{0}{0}$ . Vom calcula cele două limite laterale. Astfel

$$\begin{cases} \lim_{x \searrow 0} \frac{(x^2)^{1/x^2}}{x} = \lim_{x \searrow 0} x^{\frac{2}{x^2}-1} = e^{\lim_{x \searrow 0} (2-x^2)\frac{\ln x}{x^2}} = e^2 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{x \nearrow 0} \frac{(x^2)^{1/x^2}}{x} = -\lim_{x \nearrow 0} \frac{(x^2)^{1/x^2}}{-x} = -\lim_{y \searrow 0} \frac{(y^2)^{1/y^2}}{y} = 0. \end{cases}$$

Rezultă  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ ; analog,  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ .

ii) Calculăm  $\lim_{x,y \rightarrow 0} \frac{(x^2+y^2)^{\frac{1}{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ . Notând  $x^2+y^2 = t$ , obținem  $\lim_{t \searrow 0} t^{\frac{1}{t}-\frac{1}{2}} = 0$ , deci funcția este diferențiabilă Fréchet în  $(0,0)$ .

iii) Pentru  $(x,y) \neq (0,0)$ , rezultă  $\frac{\partial f}{\partial x} = (x^2+y^2)^{\frac{1}{x^2+y^2}} \cdot \frac{2x}{(x^2+y^2)^2} (1-\ln(x^2+y^2))$ .

**II.** a) Obținem  $\ln'(x^2+1) = \frac{2x}{x^2+1} = 2x \sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$ ,  $x \in (-1,1)$ , de unde

$$\ln(x^2+1) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{n+1}.$$

b) Intervalul de convergență al seriei de la punctul a) este  $x \in (-1,1)$ , dar cum în  $\pm 1$  seria este convergentă (criteriul lui Leibniz), rezultă că mulțimea de convergență este  $[-1,1]$ . Seria este uniformă convergentă pe  $[-r,r]$ ,  $\forall r \in (0,1)$ .

c) Avem  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{24} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$ , de unde rezultă

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

d) Calculul intregralei conduce la

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx &= \sum_{n \geq 0} \int_0^1 (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)(n+1)} dx = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{(2n+2)(n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{2} \left( \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} - \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} \right) = \frac{\pi^2}{24}. \end{aligned}$$

**III.** a) Punctele critice sunt  $(0,0)$  și  $(1,1)$ .  $(0,0)$  este punct de minim local iar  $(1,1)$  nu este punct de extrem.

b) Pentru  $x = 0$  sau  $y = 0$  (pe frontieră) funcția  $f$  definește funcția  $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) = t^2 e^{-t}$ . Avem  $g'(t) = te^t(2-t)$ , care se anulează pentru  $t \in \{0, 2\}$  (puncte critice pentru  $g$ ). Cum  $g'$  este strict pozitivă pentru  $t \in (0, 2)$ ,  $g$  este strict crescătoare pe acest interval. Analog,  $g$  este strict descrescătoare pentru  $t \in (2, \infty)$ , deci  $g$  admite un maxim local în  $t = 2$  și  $g_{max} = g(2) = \frac{4}{e^2} = f(2, 0) = f(0, 2)$ . Deci  $f$  nu are puncte de maxim local în interiorul domeniului considerat, deci nici de maxim global. Pe frontieră ( $x = 0$  sau  $y = 0$ ) avem  $f_{max} = f(0, 2) = f(2, 0) = \frac{4}{e^2}$ , iar  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = 0$  și  $\lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$ , deci  $f_{max} = f(0, 2) = f(2, 0) = \frac{4}{e^2}$  pe domeniul considerat.

$$c) f(x, y) \leq \frac{4}{e^2}, \forall x, y \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{4}{e^2}, \forall x, y \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}, \forall x, y \geq 0.$$

**IV. a)** Verificăm calitatea de subspațiu vectorial pentru  $U \subset M_{3,1}(\mathbb{R})$ .

- dacă  $u = (2\alpha, -\alpha, \beta)^t$ ,  $v = (2\alpha', -\alpha', \beta')^t \in U$ , atunci

$$u + v = (\underbrace{2(\alpha + \alpha')}_{2\alpha''}, \underbrace{-(\alpha + \alpha')}_{-\alpha''}, \underbrace{(\beta + \beta')}_{\beta''})^t \in U.$$

- dacă  $k \in \mathbb{R}$  și  $u = (2\alpha, -\alpha, \beta)^t$ , atunci  $k \cdot u = (\underbrace{2(k\alpha)}_{2\alpha''}, \underbrace{-(k\alpha)}_{-\alpha''}, \underbrace{(k\beta')}_{\beta''})^t \in U$ .

Vectorii din  $U$  se descompun după doi generatori:

$$(2\alpha, -\alpha, \beta)^t = \alpha \underbrace{(2, -1, 0)^t}_{u_1} + \beta \underbrace{(0, 0, 1)^t}_{u_2} \in \text{Span}(u_1, u_2),$$

iar matricea componentelor celor doi vectori  $[u_1, u_2] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  are rangul 2, deci familia  $\{u_1, u_2\}$  este liniar independentă. Rezultă că o bază în  $U$  este  $B_U = \{u_1, u_2\}$ .

b) Polinomul caracteristic al matricei  $A$  este

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 6 & 0 \\ -3 & -5 - \lambda & 0 \\ -3 & -6 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2).$$

Atunci  $P_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{1, -2\} \subset \mathbb{R}$ , iar valorile proprii ale matricei  $A$  sunt  $\lambda_1 = 1$  (valoare proprie dublă) și  $\lambda_2 = -2$  (valoare proprie simplă). Aflăm subspațiile proprii asociate celor două valori proprii.

Pentru  $\lambda = 1$ , rezolvăm sistemul caracteristic

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a + 2b = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t \\ t \\ s \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R},$$

deci subspațiul propriu este  $S_{\lambda=1} = \text{Span}(\{\underbrace{(-2, 1, 0)^t}_{v_1}, \underbrace{(0, 0, 1)^t}_{v_2}\})$ .

Pentru  $\lambda = -2$ , obținem sistemul caracteristic

$$\begin{pmatrix} 6 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0 \\ a + 2b - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R},$$

deci subspațiul propriu este  $S_{\lambda=-2} = \text{Span}(\underbrace{\{1, -1, -1\}}_{v_3})$ .

c) Se observă că  $u_1 = -v_1$  și  $u_2 = v_2$ , deci  $au_1 + bu_2 = (-a)v_1 + bv_2$ , deci  $\text{Span}(u_1, u_2) = \text{Span}(v_1, v_2)$  și prin urmare  $U$  coincide cu subspațiul propriu  $S_{\lambda=1}$ .

d) Se constată că avem  $\det([v_1, v_2, v_3]) = 1 \neq 0$ , deci familia  $B = \{v_1, v_2, v_3\}$  este bază formată din vectori proprii ai matricei  $A$  pentru spațiul  $\mathbb{R}^3$ . Prin urmare  $A$  este diagonalizabilă, cu matricea diagonalizatoare  $C = [v_1, v_2, v_3] = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ , matricea diagonală asociată  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ , și are loc relația  $D = C^{-1}AC$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil electric, 2012-2013

**I.** a) Utilizând proprietățile determinanților, avem:

$$\det(A^2 + I_n) = \det(A + iI_n) \cdot \det(A - iI_n) = \det(A + iI_n) \cdot \overline{\det(A + iI_n)} = |\det(A + iI_n)|^2 \geq 0.$$

b) Căutăm inversa  $B^{-1}$  a matricei  $B$  de forma  $B^{-1} = I_n + aA + bA^2$ , unde  $a, b \in \mathbb{R}$ . Folosind egalitatea  $A^3 = 0_n$ , care implică  $A^4 = 0_n$ , relația  $BB^{-1} = I_n$  se rezcrie

$$\underbrace{(I_n + A + \frac{1}{2}A^2)}_B \underbrace{(I_n + aA + bA^2)}_{B^{-1}} = I_n \Leftrightarrow (a+1)A + (a+b+\frac{1}{2})A^2 = 0_n.$$

Identificând coeficienții celor două matrice cu 0 obținem sistemul liniar  $\begin{cases} a+1=0 \\ a+b+\frac{1}{2}=0 \end{cases}$  deci  $a = -1$ ,  $b = \frac{1}{2}$ . Prin urmare  $B^{-1} = I_n - A + \frac{1}{2}A^2$ . Se arată că

$$B \cdot \left( \frac{1}{2}A^2 - A + I_n \right) = \left( \frac{1}{2}A^2 - A + I_n \right) \cdot B = I_n.$$

Așadar, matricea  $B$  este inversabilă și  $B^{-1} = \frac{1}{2}A^2 - A + I_n$ .

**II.** Fie  $m = \dim \text{Ker } T = \dim \text{Im } T$ . Pentru  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  folosind teorema dimensiunii pentru transformări liniare  $\dim \mathbb{R}^2 = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T$ , și obținem  $2 = m + m$ , deci  $m = 1$ . Dar  $\text{Im } T = \text{Ker } T$  implică  $T^2(v) = 0, \forall v \in \mathbb{R}^2$ , deci dacă  $A$  este matricea transformării  $T$  în baza canonică, atunci  $A^2 = 0$ . În plus,  $\dim \text{Im } T = 1$  implică rang  $A = 1$ , deci  $A$  singulară, cu cel puțin un coeficient nenul. Dacă  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , obținem

$$A^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + bc = 0, & d^2 + bc = 0 \\ b(a+d) = 0, & c(a+d) = 0. \end{cases}$$

Distingem cazurile: (i)  $b = 0 \Rightarrow a = d = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R}^*$ ; (ii)  $c = 0 \Rightarrow a = d = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R}^*$ ; (iii)  $d = -a \Rightarrow bc + a^2 \neq 0$ . Dacă  $b = 0$ , atunci  $a = d = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R}^*$ , deci se obține cazul (i); dacă  $b \neq 0$ , atunci  $c = -\frac{a^2}{b}$  și  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$ . Se observă că pentru  $a = 0$ , cazul (iii)

produce cazul (ii). În final, obținem matricele  $M_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$ ,  $c \in \mathbb{R}$ ;  $M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $b \in \mathbb{R}^*$ . Transformările  $T$  corespunzătoare sunt:  $T(x, y) = (0, cx)$ ,  $c \neq 0$ , și  $T(x, y) = \left(ax + by, -\frac{a}{b}(ax + by)\right)$ ,  $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^*$ . Pentru  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , folosind teorema dimensiunii pentru transformări liniare, obținem  $3 = 2m$ , deci contradicție ( $3$  nu este număr par). Deci nu există asemenea endomorfisme în  $\mathbb{R}^3$ .

**III.** a) Evident,  $f_0(x) = -\frac{1}{2}e^{-x^2}$ , iar  $f_n(x) = f_{n-1}(x) - \frac{x^{2n} \cdot e^{-x^2}}{2n!}$ .

b) Cu ajutorul relației de recurență, găsim

$$f_n(x) = f_0(x) - \frac{e^{-x^2}}{2} \left( \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{n!} \right) = -\frac{e^{-x^2}}{2} \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (x^2)^k \right).$$

Tinând cont că  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (x^2)^k = e^{x^2}$ , deducem că  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = -\frac{1}{2}$ .

c) Obținem  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = -\frac{1}{2}$ .

**IV.** a) Funcția  $f$  nu este continuă în  $(0, 0)$ , are derivatele parțiale în origine egale cu 0 și nu este diferențiabilă în origine.

b) Avem  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^n dt$ . Dacă  $n = 2k + 1$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , obținem  $I_n = \frac{k! \cdot 2^k}{(2k+1)!!}$ .

c) Sirul de funcții  $(g_n)$  converge uniform la funcția nulă  $g(x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2012-2013

**I.** a) Raza de convergență a seriei de puteri este 1. Pentru  $y = 1$  seria este divergentă iar pentru  $y = -1$  seria este convergentă (Leibniz), deci multimea de convergență este  $y \in [-1, 1]$ .

b) Cum  $\ln(1 - y) = \sum_{n \geq 1} \frac{y^n}{n}$ ,  $y \in [-1, 1)$ , rezultă că  $\ln(1 - \cos x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\cos^n x}{n}$ , pentru  $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ .

c) Avem  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{ctg} \frac{x}{2}$  nu există.

**II.** a) Derivatele parțiale sunt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, b) - f(0, b)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{b}{x}}{x} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(0, y) - f(0, b)}{y - b} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{0}{y - b} = 0.$$

b) Cum  $\left| \frac{x^2 \sin \frac{y}{x}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{x^2}{|x|} = x|x|$  și tinde la 0 când  $x \rightarrow 0$  și  $y \rightarrow b$ , rezultă că  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(0, b)$ .

c) Avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} 2x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  Funcția  $\frac{\partial f}{\partial x}$  este continuă în  $(0, 0)$  și discontinuă în punctele  $\{(0, b) \mid b \neq 0\}$ . Pe de altă parte,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} x \cos \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  iar  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{y}{x} = 0$ , deci avem continuitate.

**III.** a) Vârfurile triunghiului  $D$  (considerate în sens trigonometric) sunt  $O(0, 0)$ ,  $A(\pi, 0)$ ,  $B(0, \pi)$ . Atunci cele trei laturi  $OA$ ,  $AB$ ,  $BO$  ale frontierei admit, spre exemplu, următoarele parametrizări:

$$\begin{cases} \gamma_{OA}(t) = (t, 0), t \in [0, \pi] \\ \gamma_{AB}(t) = (-t, \pi + t), t \in [-\pi, 0] \\ \gamma_{BO}(t) = (0, -t), t \in [-\pi, 0]. \end{cases}$$

b) Pentru determinarea punctelor critice ale funcției  $f$  rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} -\sin x + \sin(x + y) = 0 \\ -\sin y + \sin(x + y) = 0, \end{cases}$$

de unde  $x = y$  și  $\sin(2x) = \sin x$ . Obținem  $\sin x = 0$  sau  $\cos x = \frac{1}{2}$ . Alegem doar punctele aflate în  $D$  și avem două puncte staționare:  $(0, 0)$  și  $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ . Primul nu este punct de extrem local al funcției, dar cel de-al doilea este punct de minim local, iar  $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$  este punct de maxim local.

c) Avem  $\min_{(x,y) \in D} f = -1$ , iar  $\max_{(x,y) \in D} f = \frac{3}{2}$ .

**IV.** a) Folosind liniaritatea lui  $T$  și descompunerile  $u_1 = 2e_1 + 0e_2 + 1e_3 + 3e_4$ ,  $u_2 = 0e_1 + 1e_2 + 3e_3 + 2e_4$ , prima relație din enunț se scrie relativ la baza  $B$ :

$$T(u_1) = u_2 \Leftrightarrow 2T(e_1) + 0T(e_2) + 1T(e_3) + 3T(e_4) = 0e_1 + 1e_2 + 3e_3 + 2e_4$$

$$\Leftrightarrow [T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4)]_B \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Rescriind analog celelalte relații, sistemul format din relațiile date în enunț se scrie condensat

$$\underbrace{[T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4)]_B}_{[T]_B} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{M=[u_1, u_2, u_3, u_4]_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{N=[u_2, u_3, u_4, u_1]_B}.$$

Deci matricea transformării  $T$  relativ la baza  $B$  este

$$[T]_B = N \cdot M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ \frac{29}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{17}{15} & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Se observă că  $F$  este bază în  $\mathbb{R}^4$ , deoarece matricea  $[F]_B$  asociată acestei familii relativ la baza canonica  $B$  a spațiului este nesingulară:

$$\det[F]_B = \det[u_1, u_2, u_3, u_4]_B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 23 \neq 0.$$

Rescriem egalitățile din enunț relativ la baza  $F$ , ținând cont de liniaritatea lui  $T$ :

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} T(u_1) = u_2 \\ T(u_2) = u_3 \\ T(u_3) = u_4 \\ T(u_4) = u_1 \end{array} \right. &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} T(u_1) = 0 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4 \\ T(u_2) = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 1 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4 \\ T(u_3) = 0 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 1 \cdot u_4 \\ T(u_4) = 1 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} [T(u_1)]_F = (0, 1, 0, 0)^t \\ [T(u_2)]_F = (0, 0, 1, 0)^t \\ [T(u_3)]_F = (0, 0, 0, 1)^t \\ [T(u_4)]_F = (1, 0, 0, 0)^t \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow [T]_F = [T(F)]_F = [T(u_1), T(u_2), T(u_3), T(u_4)]_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

c) Determinăm polinomul caracteristic al endomorfismului  $T$  utilizând oricare dintre matricele asociate ( $P_T(\lambda) = P_{A=[T]_B}(\lambda) = P_{[T]_F}(\lambda)$ ):

$$P_T(\lambda) = \det([T]_F - \lambda I_4) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^4 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1).$$

Sigurele rădăcini reale ale polinomului (valorile proprii ale matricei reale  $A$ ) sunt  $\lambda_1 = 1$  și  $\lambda_2 = -1$ . Aflăm subspațiile proprii asociate celor două valori proprii.

Pentru  $\lambda = 1$ , rezolvăm sistemul caracteristic asociat

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{[T]_F - \lambda_1 I_4} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + d = 0 \\ a - b = 0 \\ b - c = 0 \\ c - d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \in \mathbb{R},$$

deci subspatiul propriu asociat valorii proprii  $\lambda = 1$  este  $S_{\lambda=1} = \text{Span}(\underbrace{\{(1, 1, 1, 1)^t\}}_{v_1})$ .

Pentru  $\lambda = -1$ , rezolvăm sistemul caracteristic asociat

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{[T]_F - \lambda_2 I_4} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + d = 0 \\ a + b = 0 \\ b + c = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \in \mathbb{R},$$

deci  $S_{\lambda=-1} = \text{Span}(\underbrace{\{(-1, 1, -1, 1)^t\}}_{v_2})$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2013-2014

**I.** 1) a) Obținem succesiv  $A + I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\det(A + I) = 10 \neq 0$ , deci matricea  $A + I$  este nesingulară.

b) Înmulțind la stânga și la dreapta cu matricea inversabilă  $(I + A)$ , se obține relația echivalentă  $(I + A)(I - A) = (I - A)(I + A)$ , care (ținând cont că matricele  $I$  și  $A$  comută) se rescrie ca  $I - A^2 = I - A^2$ , o identitate.

c) Folosim următoarele egalități evidente:

$$\left\{ \begin{array}{ll} A^t = -A, I^t = I, & (B^t)^{-1} = (B^{-1})^t \\ (BC)^t = C^t B^t, & (B + C)^t = B^t + C^t \\ (BC)^{-1} = C^{-1} B^{-1}, & (B + C)^{-1} = B^{-1} + C^{-1} \end{array} \right.$$

și obținem  $I - A$  inversabilă, cu inversa

$$(I - A)^{-1} = [(I + A)^t]^{-1} = [(I + A)^{-1}]^t,$$

iar transpusa matricei  $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$  este

$$Q^t = [(I + A)^{-1}]^t (I - A)^t = [(I + A)^t]^{-1} (I + A) = (I - A)^{-1} (I + A),$$

deci, folosind egalitatea b) rezultă  $Q^t Q = (I - A)^{-1} (I + A) (I - A) (I + A)^{-1}$ , egalitate care se rescrie

$$Q^t Q = (I - A)^{-1} (I + A) (I + A)^{-1} (I - A) = (I - A)^{-1} (I - A) = I.$$

2) Folosim egalitatea  $Q^t Q = I$ . Fie  $\lambda \in \mathbb{C}$  valoare proprie a matricei  $Q$ , privită ca matrice cu coeficienți complecsi, și fie  $v \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  un vector propriu de normă 1 asociat valorii proprii  $\lambda$ . Atunci, aplicând conjugarea complexă și transpunerea, și ținând cont că matricea  $Q$  este reală ( $Q = \bar{Q}$ ), rezultă

$$Qv = \lambda v \Rightarrow Q\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v} \Rightarrow \bar{v}^t Q^t = \bar{\lambda}\bar{v}^t.$$

Înmulțind apoi termen cu termen la stânga prima egalitate cu membrii ultimei egalități și folosind relațiile  $Q^t Q = I$  și  $\bar{v}^t v = \|v\|^2 = 1$ , rezultă

$$\bar{v}^t Q^t Q v = \bar{\lambda}\bar{v}^t \lambda v \Leftrightarrow \bar{v}^t v = \bar{\lambda}\lambda \bar{v}^t v \Leftrightarrow 1 = |\lambda|^2 \cdot 1 \Leftrightarrow |\lambda| = 1,$$

deci toate valorile proprii ale matricei  $Q$  au modulul egal cu 1. Se observă că  $\lambda \in \mathbb{R}$  implică  $\lambda \in \{\pm 1\}$ , deci valorile proprii *reale* ale lui  $Q$  nu pot fi decât  $\pm 1$ . Pentru matricea  $Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4/5 & -3/5 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & 0 \end{pmatrix}$  din problemă, polinomul caracteristic asociat

$$P_Q(\lambda) = \det(Q - \lambda I_3) = -\frac{1}{5}(\lambda - 1)(5\lambda^2 + 8\lambda + 5)$$

are singura rădăcină reală  $\lambda = 1$ . Rezolvând sistemul caracteristic, obținem subspațiul propriu

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4/5 & -8/5 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & -1 \end{pmatrix}}_{Q-I_3} \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}_v = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{0_{\mathbb{R}^3}} \Leftrightarrow v = s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, s \in \mathbb{R} \Rightarrow S_{\lambda=1} = \text{Span}(\{(2, 1, 2)^t\}).$$

3) Singura proprietate care a mai rămas de demonstrat este  $\det(A + I) \neq 0$ . Matricea  $A$  este antisimetrică de ordin trei, deci are forma  $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$ .

Atunci  $\det(A + I_3) = \left| \begin{array}{ccc} 1 & a & b \\ -a & 1 & c \\ -b & -c & 1 \end{array} \right| = 1 + \underbrace{a^2 + b^2 + c^2}_{\geq 0} > 0$ , și prin urmare  $\det(A + I_3) \neq 0$ .

*Altfel.* Demonstrăm proprietatea prin reducere la absurd. Fie  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C}$  cele trei rădăcini *complexe* ale polinomului caracteristic  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$ . Folosim egalitatea  $A^t = -A$  și faptul că  $A$  are ordin impar  $n = 3$ ; obținem

$$\det A = \det A^t = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A,$$

deci  $\det A = 0$ , și cum  $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ , rezultă prima valoare proprie  $\lambda_1 = 0$ . Dacă prin absurd matricea  $A + I = A - (-I)$  ar fi singulară, atunci am avea  $P_A(-1) = 0$  și deci a doua valoare proprie va fi  $\lambda_2 = -1$ . Din antisimetria matricei  $A$ , rezultă imediat  $\text{Tr}(A) = 0$ , iar din egalitatea  $\text{Tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + (-1) + \lambda_3$  obținem a treia valoare proprie  $\lambda_3 = 1$ . Pe de altă parte, folosind din nou antisimetria matricei  $A$ , exprimăm în două moduri diferite invariantul  $J$  al matricei  $A$ ,

$$J = \left| \begin{array}{cc} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} 0 & a_{13} \\ -a_{13} & 0 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{cc} 0 & a_{23} \\ -a_{32} & 0 \end{array} \right| = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1,$$

ceea ce conduce la egalitatea

$$a_{12}^2 + a_{13}^2 + a_{23}^2 = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0 \Leftrightarrow \underbrace{a_{12}^2 + a_{13}^2 + a_{23}^2}_{\geq 0} + 1 = 0,$$

o contradiction. Rezultă că matricea  $A + I$  este nesingulară.

**II. a)** Obținem  $\arcsin x = x + \sum_{n \geq 1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$  (a se vedea problema IV, faza locală, anul I, profil electric, 2010-2011).

b) Seria cerută este  $\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$ .

**III. a)** Impunem condiția ca  $v(x, y)$  să fie armonică, deci  $\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ . (a se vedea problema I b), faza locală, anul II, profil mecanic, 2006-2007).

b) Avem  $\varphi(\frac{y}{x}) = C_1 \arctg \frac{y}{x} + C_2$ ,  $C_1, C_2$  constante reale. (a se vedea problema I b), faza locală, anul II, profil mecanic, 2006-2007).

**IV. a)** Matricea  $C = [c_1, c_2, c_3]$  de trecere la baza ortonormată  $B' = \{c_1, c_2, c_3\}$  satisface relația  $x = Cy$ , deci  $y = C^{-1}x = C^t x$ , deci  $y = Qx$  implică  $Q = C^t$ . Aflăm

baza  $B'$  formată din versori proprii ortogonali. Matricea fiind simetrică, valorile proprii sunt cele trei rădăcini reale ale polinomului caracteristic

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2) \cdot [\lambda-(2+\sqrt{2})] \cdot [\lambda-(2-\sqrt{2})].$$

Rezolvând sistemele caracteristice asociate, obținem

$$\begin{cases} (A - 2I)v = 0 & \Leftrightarrow v \in \text{Span } \{(-1, 0, 1)^t\} \\ [A - (2 + \sqrt{2})I]v = 0 & \Leftrightarrow v \in \text{Span } \{(1, \sqrt{2}, 1)^t\} \\ [A - (2 - \sqrt{2})I]v = 0 & \Leftrightarrow v \in \text{Span } \{(1, -\sqrt{2}, 1)^t\} \end{cases}$$

Normând generatorii celor trei subspații mutual ortogonale, rezultă baza ortonormată, matricea  $C = [c_1, c_2, c_3]$  de trecere la această bază și matricea  $Q = C^t$

$$B' = \left\{ c_1 = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^t, c_2 = \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right)^t, c_3 = \left( \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right)^t \right\},$$

$$\text{deci } Q = [c_1, c_2, c_3]^t = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

b) Folosind egalitatea  $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix}$ , se observă că funcția de optimizat se rescrie în noua bază ortonormată în funcție de noua variabilă  $y \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  după cum urmează:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^t Ax}{x^t x} = \frac{(Qy)^t A(Qy)}{(Qy)^t (Qy)} = \frac{y^t Q^t A Q y}{y^t y} = \frac{y^t Q^{-1} A Q y}{y^t y} \\ &= \frac{y^t \cdot \text{diag}(2, 2+\sqrt{2}, 2-\sqrt{2}) \cdot y}{y^t y} = \frac{2y_1^2 + (2+\sqrt{2})y_2^2 + (2-\sqrt{2})y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = g(y). \end{aligned}$$

Matricea  $Q$  fiind nesingulară, folosind egalitatea  $y = Qx$  se observă că  $x = 0 \Leftrightarrow y = 0$ , deci  $g : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Mai mult, notând  $z_k = \frac{y_k^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}$ ,  $k \in \overline{1, 3}$ , în funcția  $g$  obținem noua funcție de optimizat

$$h : D = \{z = (z_1, z_2, z_3)^t \in \mathbb{R}^3 \mid z_k \geq 0, \forall k \in \overline{1, 3}, z_1 + z_2 + z_3 = 1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(y) = az_1 + bz_2 + cz_3 = h(z),$$

unde  $a = 2$ ,  $b = 2 + \sqrt{2}$ ,  $c = 2 - \sqrt{2}$ , definită pe interiorul închis al unui triunghi din  $\mathbb{R}^3$ , ale cărui vârfuri sunt tăieturile pe cele trei axe de coordonate ale planului  $z_1 + z_2 + z_3 = 1$ . Folosind relațiile care definesc domeniul  $D$ , putem rescrie problema de extrem în raport cu primele două variabile  $(z_1, z_2)$

$$\max_{(z_1, z_2) \in D'} az_1 + bz_2 + c(1-z_1-z_2), \text{ unde } D' = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2 \mid z_1 \geq 0, z_2 \geq 0, z_1 + z_2 \leq 1\}.$$

Se observă că extremul acestei probleme de programare liniară se atinge în colțul  $(z_1, z_2) = (0, 1) \in D'$ , deci în punctele corespunzătoare  $y_* = (y_1, y_2, y_3) = (0, s, 0)$ ,  $s \neq 0$ , în care se atinge valoarea de maxim local  $g(y_*) = b = 2 + \sqrt{2}$ . Valoarea corespunzătoare a argumentului  $x_*$  al funcției inițiale  $f$  este

$$x_* = Qy_* = C^t \cdot s(0, 1, 0)^t = s(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})^t, \quad s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2013-2014

**I. a)** Prin calcul direct obținem  $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3A$ . Au loc egalitățile

$$A^n = A \cdot A^{n-1} = A \cdot 3^{n-2}A = 3^{n-2}A^2 = 3^{n-2} \cdot 3A = 3^{n-1}A, \quad \forall n \geq 2,$$

deci s-a demonstrat prin inducție egalitatea  $A^n = 3^{n-1}A, \forall n \geq 2$ .

**b)** Dezvoltând în serie exponentială matricei  $A$  și folosind egalitatea demonstrată la punctul a), obținem succesiv

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} A^n = I + tA + \sum_{n \geq 2} \frac{t^n}{n!} A^n = I + tA + \sum_{n \geq 2} \frac{t^n \cdot 3^{n-1}}{n!} A \\ &= I + tA + \frac{1}{3} \cdot \sum_{n \geq 2} \frac{(3t)^n}{n!} A = I + tA + \frac{1}{3} \cdot [(1 + 3t + \sum_{n \geq 2} \frac{(3t)^n}{n!})A - (1 + 3t)A] \\ &= I + tA + \frac{1}{3} \cdot [e^{3t}A - (1 + 3t)A] = I - \frac{1}{3}A + \frac{e^{3t}}{3}A = I + \frac{e^{3t} - 1}{3}A. \end{aligned}$$

**c)** Fie  $x = (x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3$ . Atunci  $Ax = (x_1 + x_2 + x_3) \cdot (1, 1, 1)^t$ . Prin calcul direct, folosind biliniaritatea produsului scalar real, rezultă  $\langle Ax, Ax \rangle = 3(x_1 + x_2 + x_3)^2$ .

**d)** Folosind monotonia strict crescătoare funcțiilor pătrat și radical, obținem

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2 &= \sup\{\sqrt{\langle Ax, Ax \rangle} \mid \|x\|_2 = 1\} = \sup\{\sqrt{3(x_1 + x_2 + x_3)^2} \mid \|x\|_2 = 1\} \\ &= \sqrt{3} \sqrt{\sup\{(x_1 + x_2 + x_3)^2 \mid \|x\|_2 = 1\}}. \end{aligned}$$

Avem deci de maximizat lagrangianul  $L(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2$  supus la legătura

$$\|x\|_2 = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = 1 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1.$$

Folosind ultima egalitate, problema de extrem revine la a calcula

$$\sup\{1 + 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0\}.$$

Această problemă de extrem este cu legături, deci asociem lagrangianul extins

$$\tilde{L}(x; \lambda) = 1 + 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) + \lambda \cdot (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1).$$

Pentru a afla punctele critice, calculăm diferențiala totală

$$d_{x;\lambda} \tilde{L} \equiv (2(x_2 + x_3) + \lambda \cdot x_1, 2(x_3 + x_1) + \lambda \cdot x_2, 2(x_1 + x_2) + \lambda \cdot x_3; x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1).$$

Egalând cele patru componente cu 0, rezultă sistemul

$$\begin{cases} 2(x_2 + x_3) + \lambda \cdot x_1 = 0 \\ 2(x_3 + x_1) + \lambda \cdot x_2 = 0 \\ 2(x_1 + x_2) + \lambda \cdot x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Sumând primele trei ecuații, obținem  $(\lambda + 4)(x_1 + x_2 + x_3) = 0$ . Distingem două cazuri:

(i) Dacă  $\lambda = -4$ , din subsistemul liniar rezultă  $x_1 = x_2 = x_3 = t \in \mathbb{R}$ , care înlătură în ultima ecuație implică  $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ , deci rezultă punctele critice  $p_{\pm} = \pm(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ .

(ii) Dacă  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ , din subsistemul liniar rezultă  $\lambda = 2$ , deci apare o nouă mulțime de puncte critice  $\Gamma$  formată din tripletele  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  care satisfac sistemul

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Observăm că  $\Gamma$  nu conține puncte de extrem, deoarece toate tripletele  $x \in \Gamma$  satisfac  $Ax = 0$ , deci  $\sqrt{\langle Ax, Ax \rangle} = 0$ , pe când, spre exemplu,  $x = p_+ \notin \Gamma$  satisfac condiția  $\|x\|_2 = 1$ , și produce o valoare superioară a lagrangianului față de valoarea nulă,  $\sqrt{\langle Ax, Ax \rangle} = 1 > 0$ ; prin urmare tripletele din  $\Gamma$  produc valori inferioare comparativ cu  $p_+$ , deci nu sunt puncte de maxim. Verificăm că punctele critice  $A_{\pm}$  sunt puncte de maxim pentru lagrangian. Matricea derivatelor parțiale de ordinul doi (hessiană) asociată lagrangianului în punctele  $A_{\pm}$  este  $H := \text{Hess}(L)|_{A_{\pm}} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$  și are minorii principali

$$\Delta_1 = -4, \Delta_2 = \left| \begin{matrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{matrix} \right| = 12, \Delta_3 = \det H = 0,$$

deci conform criteriului Sylvester, produce o formă pătratică negativ semidefinită, și deci  $A_{\pm}$  sunt puncte de maxim local pentru lagrangian. Valoarea comună a lagrangianului în aceste puncte este  $L(p_{\pm}) = 3$  și deci  $\|A\| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$ .

*Altfel (soluție geometrică).* Calculul valorii  $\|A\|_2$  revine la rezolvarea problemei de extrem

$$\|A\|_2 = \sqrt{3} \cdot \sup\{|x_1 + x_2 + x_3| \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\},$$

deci afăreaa valorii maxime a modulului parametrului  $a \in \mathbb{R}$  pentru care intersecția dintre planul variabil  $\pi : x_1 + x_2 + x_3 = a$  și sfera  $\Sigma : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$  este nevidă. Distanța de la centrul sferei  $O(0, 0, 0)$  la plan este  $d = |a|/\sqrt{3}$  și variază în intervalul  $[0, r]$ , unde  $r = 1$  este raza sferei. Deci  $d$  atinge valoarea maximă atunci când planul este tangent sferei în capetele  $p_{\pm}$  ale diametrului sferei care are direcția  $\bar{n} \equiv (1, 1, 1)$  perpendiculară pe planul  $\pi$ . Intersectând sfera cu dreapta  $x_1 = x_2 = x_3$  de direcție  $\bar{n}$  ce trece prin centrul sferei (dreapta suport a acestui diametru), obținem  $p_{\pm} = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ . Pe de altă parte, egalitatea  $d = r$  se scrie  $|a|/\sqrt{3} = 1$ , deci  $a = \pm\sqrt{3}$ , și deci  $\|A\|_2 = \sqrt{3} \cdot |\pm\sqrt{3}| = 3$ , extrem atins în punctele  $p_{\pm}$ .

**III. a)** Fie  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = z^4 - x^4 - y^4$ . Cum  $f \in \mathcal{C}^\infty$ , este necesar ca  $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$ , deci  $z \neq 0$ .

b) Derivând relația dată în raport cu  $x$ , obținem

$$4z^3 \frac{\partial z}{\partial x} - 4x^3 = 0, \quad (8)$$

de unde  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^3}{z^3}$ . Analog, derivând relația dată în raport cu  $y$ , rezultă

$$4z^3 \frac{\partial z}{\partial y} - 4y^3 = 0, \quad (9)$$

și  $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y^3}{z^3}$ . Relația cerută  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$  este echivalentă cu  $x^4 + y^4 = z^4$ , care este adevărată prin ipoteză.

c) Din  $z^4(1,0) = 1$  rezultă  $z(1,0) = \pm 1$ . Avem  $\frac{\partial z}{\partial x}(1,0) = \frac{1}{\pm 1} = \pm 1$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}(1,0) = 0$ , de unde  $df(1,0)(x-1,y) = \pm(x-1)$ . Derivând (8) în raport cu  $x$ , rezultă

$$12z^2 \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 4z^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 12x^2 = 0, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{12x^2 - 12z^2 \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2}{4z^3},$$

iar  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1,0) = \frac{12 \cdot 1 - 12 \cdot 1}{\pm 4} = 0$ . Derivând (9) în raport cu  $y$ , rezultă  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(1,0) = 0$ . Avem  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x^3}{z^3}$ , și  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-3x^3}{z^4} \frac{\partial z}{\partial y}$ , deci  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1,0) = 0$ . Prin urmare  $d^2 f(1,0)(x-1,y) = 0$ , iar polinomul Taylor cerut este  $\pm(1 + (x-1))$ .

**III.** a) Pentru  $x \neq 0$ , funcția se rescrie  $f(x,y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^{2k} x^3 = x^3 \cos \frac{y}{x}$ .

b) Derivatele parțiale cerute sunt  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ .

c) Deoarece  $\left| \frac{x^3 \cos \frac{y}{x}}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \frac{|x^3|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{|x|^3}{|x|} \leq x^2$  tinde către 0 când  $(x,y) \rightarrow (0,0)$ , rezultă că funcția  $f$  este diferențiabilă Fréchet.

**IV.** a) Prin calcul direct, rezultă:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^4 = O_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Pentru  $v = (0,0,0,1)^t \in \mathbb{R}^4$ , obținem succesiv

$$Av = (0,0,1,0)^t, \quad A^2v = (0,1,0,0)^t, \quad A^3v = (1,0,0,0)^t,$$

iar matricea  $M = [v, Av, A^2v, A^3v] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  asociată familiei  $\mathcal{F} = \{v, Av, A^2v, A^3v\}$  este nesingulară ( $\det M = 1 \neq 0$ ), deci  $\mathcal{F}$  este bază în  $\mathbb{R}^4$ , în particular familie liniar independentă.

c) Fie combinația liniară nulă

$$k_0v + k_1T^1v + \dots + k_{p-1}T^{p-1}v = 0,$$

unde  $k_0, \dots, k_{p-1} \in \mathbb{R}$ . Înănd cont că  $T^k = 0$ ,  $\forall k \geq p$  și aplicând succesiv egalității de mai sus transformările  $T^{p-1}, T^{p-2}, \dots, T^1, T^0 = Id$ , obținem anularea

coeficienților combinației liniare ( $k_0 = 0, k_1 = 0, \dots, k_{p-1} = 0$ ), deci cei  $p$  vectori  $\{v, T v, T^2 v, \dots, T^{p-1} v\}$  sunt liniar independenți.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul I, profil electric, 2014-2015

**III.** a) Se obțin valorile proprii  $\{1, -2, -2\}$  cu vectorii proprii asociati  $u_1 = (1, 1, 1)^t$ ,  $u_2 = (1, 0, -1)^t$ ,  $u_3 = (1, -1, 0)$ , care determină matricea diagonalizatoare  $T = [u_1, u_2, u_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ , iar  $T^{-1}AT = \text{diag}(1, -2, -2)$ .

b) A fiind simetrică, cele două subspații proprii,  $S_{\lambda=1} = \text{Span}(u_1)$  și  $S_{\lambda=-2} = \text{Span}(u_2, u_3)$  sunt ortogonale. Ortogonalizăm familia  $\{u_2, u_3\}$  și obținem familia ortogonală  $\{v_2 = u_2 = (1, 0, -1)^t; v_3 = (1, -2, 1)^t\}$ . Normând familia ortogonală formată din vectori proprii  $\{u_1, v_2, v_3\}$  obținem vectorii  $\{w_1, w_2, w_3\}$  care formează coloanele matricei ortogonale diagonalizatoare  $C = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$ .

c) Se observă că  $\langle v, e_k \rangle$  este exact componenta  $k$  a vectorului  $v$ . Deci dorim ca prima componentă a lui  $f_1$  să fie pozitivă, a doua componentă a lui  $f_2$  să fie nulă, iar a treia componentă a lui  $f_3$  să fie negativă. Înținând cont de aceste cerințe, se observă că următorul triplet de vectori satisface aceste condiții:  $f_1 = w_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^t$ ,  $f_2 = w_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$  și  $f_3 = -w_3 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})^t$ , formând baza diagonalizatoare ortonormată  $\mathcal{B}_2 = \{f_1, f_2, f_3\}$  cerută.

**IV.** a) Egalitatea  $AD = DA$  se rescrie sub forma  $\lambda_i a_{ij} = \lambda_j a_{ij}$ , pentru orice  $i, j \in \overline{1, n}$ . Pentru  $i = j$  acestea devin identități, iar pentru  $i \neq j$ , obținem

$$\lambda_i a_{ij} = \lambda_j a_{ij} \Leftrightarrow (\lambda_i - \lambda_j) a_{ij} = 0,$$

și cum  $\lambda_i \neq \lambda_j$  pentru  $i \neq j$ , rezultă  $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$ , deci coeficienții ex-diagonali ai matricei  $A$  sunt nuli. Rezultă  $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ , deci  $A$  este matrice diagonală.

b) Pentru implicația i)  $\Rightarrow$  ii), fie  $XY = YX$ . Deoarece  $X$  și  $Y$  sunt simetrice, rezultă că sunt diagonalizabile și avem  $C'^{-1}XC' = D'$  și  $C''^{-1}YC'' = D''$ , sau altfel scris,  $X = C'D'C'^{-1}$  și  $Y = C''D''C''^{-1}$ . Atunci

$$XY = YX \Leftrightarrow C'D'C'^{-1} \cdot C''D''C''^{-1} = C''D''C''^{-1} \cdot C'D'C'^{-1}.$$

Dacă  $X$  are valori proprii distințe atunci egalitatea se rescrie (pentru cazul când  $Y$  are această proprietate se procedează analog, grupând diferit):

$$XY = YX \Leftrightarrow D'C'^{-1}C''D''C''^{-1}C' = C'^{-1}C''D''C''^{-1}C'D' \Leftrightarrow D'A = AD',$$

unde am notat  $A = C'^{-1}C''D''C''^{-1}C'$ , deci  $A$  este în condițiile afirmației de la punctul a). Prin urmare notăm  $A = \Delta$ , matrice diagonală. Rezultă  $C'^{-1}C''D''C''^{-1}C' = \Delta \Leftrightarrow C'^{-1}YC' = \Delta$ . Deci, notând  $C' = Z$ , avem  $Z^{-1}YZ = \Delta$ . Dar  $C'^{-1}XC' = D'$  și deci  $Z^{-1}XZ = D'$  și prin urmare  $Z = C'$  diagonalizează simultan matricele  $Y$  și  $X$ .

Reciproc, dacă  $Z^{-1}XZ = D'$  și  $Z^{-1}YZ = D''$ , atunci  $X = ZD'Z^{-1}$  și  $Y = ZD''Z^{-1}$ , deci, ținând cont că matricee diagonale comută, obținem

$$XY = ZD'Z^{-1} \cdot ZD''Z^{-1} = ZD'D''Z^{-1} = ZD''D'Z^{-1}ZD''Z^{-1} \cdot ZD'Z^{-1} = YX.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil mecanic, 2014-2015

**IV.** a) Se verifică ușor cele două axiome de subspațiu vectorial: (i)  $\forall M, N \in S(A, B) \Rightarrow M + N \in S(A, B)$ ; (ii)  $\forall M \in S(A, B), \forall k \in \mathbb{R} \Rightarrow kM \in S(A, B)$ .

b) Orice soluție  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  a ecuației matriceale  $AM = MB$  este de forma  $M = tG, t \in \mathbb{R}$ , unde  $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , deci  $S(A, B) = \text{Span}(G)$ .

c) Singura soluție  $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ p & q & r \end{pmatrix}$  a ecuației matriceale  $AM = MB$  este matricea nulă, deci  $S(A, B) = \{O\}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul I, profil electric, 2015-2016

**II.** a) Fie  $\lambda \in \mathbb{R}$  o valoare proprie reală asociată matricei  $A$  (în caz că o asemenea valoare proprie există). Atunci există un vector propriu  $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  asociat lui  $\lambda$  pentru  $A$ , deci  $Av = \lambda v$ , din care rezultă imediat  $A^{2015}v = \lambda^{2015}v$ . Din ipoteză avem  $A^{2015} = I_3$ , egalitate care aplicată lui  $v$  conduce succesiv la

$$A^{2015}v = I_3v \Leftrightarrow \lambda^{2015}v = v \Leftrightarrow (\lambda^{2015} - 1)v = 0,$$

și cum  $v \neq 0$  rezultă

$$\lambda^{2015} = 1. \quad (10)$$

Pentru același  $\lambda \in \mathbb{R}$  privit ca valoare proprie a lui  $B$ , există un vector  $w \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$  pentru care  $Aw = \lambda w$ , care împreună cu ipoteza din enunț  $B^{2016} = I_3$ , conduce la

$$B^{2016}w = I_3w \Leftrightarrow \lambda^{2016}w = w \Leftrightarrow (\lambda^{2016} - 1)w = 0,$$

și cum  $w \neq 0$  rezultă

$$\lambda^{2016} = 1. \quad (11)$$

Se observă că  $\lambda \neq 0$  (altfel (10) conduce la contradicția  $0 = 1$ ). Împărțind egalitățile (11) la (10), rezultă  $\lambda = 1$ . *Altfel.* Rădăcinile complexe ale ecuației (10) sunt rădăcinile de ordin 2015 ale unității  $\{\cos \frac{2k\pi}{2015} + i \sin \frac{2k\pi}{2015} \mid k \in \overline{1, 2015}\}$  care conțin doar o singură valoare reală,  $\lambda = 1$ . Rădăcinile ecuației (11) sunt rădăcinile de ordin 2016 ale unității  $\{\cos \frac{2k\pi}{2016} + i \sin \frac{2k\pi}{2016} \mid k \in \overline{1, 2016}\}$ , care conțin doar valorile reale,  $\lambda \in \{\pm 1\}$ . Deci din (10) și (11) se obține unică valoare reală comună a celor două seturi de rădăcini complexe.  $\lambda = 1$ . *Notă.* Există cazuri când cele două matrice, deși satisfac condițiile din enunț și au toate rădăcinile polinomului caracteristic real, NU au valori proprii comune (de ex.  $A = I_3$ ,  $B = -I_3$ ).

b) Înținând cont de ipotezele  $(A + B + I_3)v \neq 0$ ,  $v \neq 0$ ,  $AB = BA$ , demonstrăm prin inducție egalitatea  $P_n : (A + I_3)^n v = (-1)^n B^n v$ ,  $\forall n \geq 1$ . Primul pas de inducție este imediat:  $P_1 : (A + I_3)^1 v = (-1)^1 B^n v \Leftrightarrow (A + B + I_3)v = 0$ , adevărat conform ipotezei. Pentru pasul  $P_n \rightarrow P_{n+1}$ , presupunem adevărat  $P_n : (A + I_3)^n v = (-1)^n B^n v$  și arătăm că are loc  $P_{n+1} : (A + I_3)^{n+1} v = (-1)^{n+1} B^{n+1} v$ . Pentru început observăm că din egalitatea  $AB = BA$  rezultă egalitățile  $AB^n = B^n A$  și apoi  $(A + I)B^n = B^n(A + I)$ ,  $\forall n \geq 1$  (eventual prin inducție). Atunci, folosind egalitățile  $P_n$ ,  $P_1$  și relațiile de mai sus, membrul stâng din egalitatea  $P_{n+1}$  se scrie:

$$\begin{aligned}(A + I_3)^{n+1} v &= (A + I_3)(A + I_3)^n v = (A + I_3)(-1)^n B^n v = (-1)^n (A + I_3)B^n v \\ &= (-1)^n B^n (A + I_3)v = (-1)^n B^n (-1)Bv = (-1)^{n+1} B^{n+1} v,\end{aligned}$$

deci rezultă egalitatea  $P_{n+1}$ , iar pasul al doilea de inducție este încheiat. Prin urmare egalitatea din enunț are loc pentru orice  $n \geq 1$ .

**V.** Arătăm întâi echivalența a)  $\Leftrightarrow$  b). Se verifică imediat incluziunile  $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2$  și  $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$  (\*). De asemenea, se poate verifica imediat (prin reducere la absurd) afirmația (\*\*): "Dacă două subspații vectoriale sunt incluse unul în altul și au aceeași dimensiune finită, atunci ele coincid." Aplicăm teorema dimensiunii pentru transformări liniare, pentru  $f$  și pentru  $f^2$ :

$$\begin{cases} n = \dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f \\ n = \dim \text{Im } f^2 + \dim \text{Ker } f^2. \end{cases} \quad (12)$$

Dacă  $\text{Im } f^2 = \text{Im } f$ , prin scăderea acestor egalități rezultă  $\dim \text{Ker } f = \dim \text{Ker } f^2$ . Din (\*) avem  $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2$ , deci folosind afirmația (\*\*), rezultă  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$ , adică a)  $\Leftrightarrow$  b). Analog se demonstrează că din  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$  rezultă  $\text{Im } f^2 = \text{Im } f$ , adică b)  $\Rightarrow$  a)

Arătăm echivalența b)  $\Leftrightarrow$  c). Pentru implicația b)  $\Rightarrow$  c), presupunem că  $\text{Ker } f^2 = \text{Ker } f$ . Testăm întâi calitatea de sumă directă a subspațiilor  $\text{Im } f$  și  $\text{Ker } f$ . Fie  $x \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f$ . Din  $x \in \text{Im } f$  rezultă că există  $v \in V$  a.i.  $x = f(v)$ , și aplicând  $f$ , rezultă  $f(x) = f^2(v)$ . Dar  $x \in \text{Ker } f$ , deci egalitatea devine  $0 = f^2(v)$ , și deci  $v \in \text{Ker } f^2 = \text{Ker } f$ , de unde  $f(v) = 0$ . Dar  $f(v) = x$ , și deci  $x = 0$ . Prin urmare,  $x \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f \subset \{0\}$ . Incluziunea inversă se verifică imediat, deci  $x \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ , iar subspațiile formează sumă directă. Verificăm că suma lor coincide cu  $V$ . Folosind teorema dimensiunii, teorema Grassmann și  $\dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f) = 0$ , avem

$$\begin{aligned}n &= \dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f = \dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f) + \dim(\text{Ker } f + \text{Im } f) \\ &= 0 + \dim(\text{Ker } f \cap \text{Im } f),\end{aligned}$$

deci  $\dim(\text{Ker } f + \text{Im } f) = n = \dim V$  și  $\text{Ker } f + \text{Im } f \subset V$ . Aplicând (\*\*), rezultă  $\text{Ker } f + \text{Im } f = V$ . În concluzie  $\text{Ker } f$  și  $\text{Im } f$  sunt subspații suplementare, deci are loc c).

Pentru reciproca c)  $\Rightarrow$  b), presupunem că are loc egalitatea d), și demonstrăm pentru început inclusiunea  $\text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f$ . Fie  $x \in \text{Ker } f^2$ , deci  $f^2(x) = 0$ . Notând  $v = f(x)$ , observăm că  $v \in \text{Im } f$  și  $f(v) = f^2(x) = 0$ , deci  $v \in \text{Ker } f$ . Prin urmare, folosind calitatea de sumă directă din ipoteză, avem  $v \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ , și deci

$v = 0$ , de unde  $f(x) = 0$ , care implica  $x \in \text{Ker } f$ . Prin urmare  $\text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f$ . Incluziunea inversă fiind imediată, rezultă  $\text{Ker } f^2 = \text{Ker } f$ , adică b), și deci c)  $\Rightarrow$  b). Concluzie că b)  $\Leftrightarrow$  c).

Din tranzitivitatea echivalenței și a)  $\Leftrightarrow$  b)  $\Leftrightarrow$  c) rezultă și a)  $\Leftrightarrow$  c). Astfel, cele trei afirmații din enunț sunt echivalente.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul I, profil mecanic, 2015-2016

**IV.** a) Se verifică direct egalitatea  $TT^t = I_2$ . Prin calcul direct, sau folosind egalitatea  $TT^t = I_2$ ,  $T$  reală și distributivitatea produsului cu scalari în spațiul vectorial complex  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ , se obține:  $(T + iT)(T + iT)^* = (T + iT)(T^t - iT^t) = [(1+i)T] \cdot [(1-i)T^t] = (1+i)(1-i)TT^t = 2I_2$ .

b) Valorile proprii ale matricei  $T + iT$  sunt:  $\{(1+i)(\cos(\frac{\pi}{4} \pm t) + i \sin(\frac{\pi}{4} \pm t))\} = \{\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4} \pm t) + i \sin(\frac{\pi}{4} \pm t))\}$ . Se observă că avem  $T + iT \in \mathcal{M}(\mathbb{C}) \setminus \mathcal{M}(\mathbb{R})$ , deci valorile proprii complexe nereale ale matricei  $T + iT$  nu sunt obligatoriu conjugate, în perechi. De asemenea, se observă că enunțul cere existența a cel puțin o valoare proprie reală, și nu ca toate (ambele) valori proprii să fie reale. Anularea părților imaginare ale valorilor proprii conduce la ecuațiile  $\sin(\frac{\pi}{4} + t) = 0$  și  $\sin(\frac{\pi}{4} - t) = 0$ , care au în intervalul  $[0, 2\pi)$  soluțiile  $t \in \{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$ , respectiv  $t \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\}$ . Reuniunea acestora este  $\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$ . Notă. Se observă că nu există  $t \in [0, 2\pi)$  astfel încât toate valorile proprii ale matricei  $T + iT$  să fie reale. Variantă. Prin calcul direct, se obține polinomul caracteristic al matricei  $T + iT$ ,  $P(\lambda) = \lambda^2 - 2(1+i) \cdot \cos t \cdot \lambda + 2i$ . Dacă  $\lambda \in \mathbb{R}$  este o valoare proprie reală, atunci prin înlocuire în ecuația caracteristică, rezultă  $\lambda(\lambda - \cos t) + 2i(1 - 2\lambda \cos t) = 0$ , iar anularea celor doi termeni conduce la egalitățile  $\begin{cases} \lambda(\lambda - \cos t) = 0 \\ 1 - 2\lambda \cos t = 0 \end{cases}$ . Din a doua egalitate pentru  $\cos t \neq 0$  (singurul caz convenabil) rezultă  $\lambda = \frac{1}{2\cos t} \neq 0$ , care înlocuită în prima egalitate conduce la  $\cos^2 t = \frac{1}{2}$ , de unde soluțiile căutate din  $[0, 2\pi)$  sunt  $t \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$ .

c) Valorile proprii ale matricei  $T$  sunt  $\{\cos t \pm i \sin t\}$ . Acestea trebuie să fie ambele reale, deci  $\sin t = 0$ . Valorile  $t \in [0, 2\pi)$  care satisfac această ecuație sunt  $t \in \{0, \pi\}$ , care conduc respectiv la matricele diagonale  $\pm I_2$  (deci condiția necesară ca rădăcinile polinomului caracteristic să fie reale este și suficientă pentru diagonalizare).

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2002-2003

**I. a)** Obținem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} s_n(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{x}{k(k+1)}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{x}{k(k+1)}} \cdot \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = s_n(0), \end{aligned}$$

deci  $s_n$  este continuă în  $x = 0$ .

b) Fie  $x \in [0, 1]$ . Vom folosi pentru demonstrarea convergenței uniforme a sirului  $(s_n)_n$  criteriul lui Cauchy. Dacă  $x = 0$ , atunci

$$|s_{n+p}(0) - s_n(0)| = \left| 1 - \frac{1}{n+p+1} - 1 + \frac{1}{n+1} \right| = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} \right| < \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Dacă  $x \in (0, 1]$ , atunci:

$$\begin{aligned} |s_{n+p}(x) - s_n(x)| &= \left| \frac{1}{x} \sum_{k=n+1}^{n+p} \ln\left(1 + \frac{x}{k(k+1)}\right) \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{1}{x} \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{x}{k(k+1)} \right| = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

când  $n \rightarrow \infty$ , unde s-a folosit inegalitatea  $\ln(1 + \alpha) \leq \alpha$ ,  $\alpha > 0$ . Rezultă că pe intervalul  $[0, 1]$ , seria  $(s_n)_n$  converge uniform.

c) Stim că

$$(\ln(1+y))' = \frac{1}{1+y} = 1 - y + y^2 - y^3 + \dots \Rightarrow \ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} + \dots, |y| < 1.$$

Atunci  $\ln\left(1 + \frac{x}{k(k+1)}\right) = \frac{x}{k(k+1)} - \frac{x^2}{2k^2(k+1)^2} + \frac{x^3}{3k^3(k+1)^3} - \dots$ , deci

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \cdot \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{x}{k(k+1)}\right) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \frac{x}{2k^2(k+1)^2} + \frac{x^2}{3k^3(k+1)^3} - \dots = \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} - x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k^2(k+1)^2} + x^2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k^3(k+1)^3} - \dots, \end{aligned}$$

deci

$$\begin{aligned} s(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} - x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k^2(k+1)^2} + x^2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k^3(k+1)^3} - \dots \right) = \\ &= 1 - x \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2(k+1)^2} + x^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k^3(k+1)^3} - \dots \end{aligned}$$

Atunci  $\frac{s(x)-s(0)}{x} = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2(k+1)^2} + x \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k^3(k+1)^3} - \dots$

Notând  $E(x) = \frac{s(x)-s(0)}{x} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2(k+1)^2}$ , obținem

$$E(x) = x \cdot \left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k^3(k+1)^3} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{4k^4(k+1)^4} + \dots \right).$$

Atunci  $\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0$ , deci  $s'(0) + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2(k+1)^2}}_{\text{conv.}} = 0$  și prin urmare funcția  $s$  este derivabilă în  $x = 0$ .

**III.** a)  $a_0 \in (0, 1)$ ,  $a_n = \ln(1 + a_{n-1})$ ,  $n \geq 1$ . Demonstrăm prin inducție proprietatea  $P(n)$ :  $a_n \in (0, 1)$ ,  $\forall n \geq 0$ . Avem  $P(0)$ :  $a_0 \in (0, 1)$  (adevărat). Aratăm  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ . Fie  $P(n)$  adevarată; aratăm  $P(n+1)$ :  $a_{n+1} \in (0, 1)$ . Dar  $a_{n+1} = \ln(1 + a_n) \in (0, \ln 2) \subset (0, 1)$ , deci  $P(n+1)$  are loc. Prin urmare avem  $a_n \in (0, 1)$ ,  $\forall n \geq 0$ , deci  $\{a_n\}$  unde  $n \in \mathbb{N}^*$  este sir mărginit. Studiem monotonia sirului și avem:  $a_{n+1} - a_n = \ln(1 + a_n) - a_n = \ln(\frac{1+a_n}{e^{a_n}})$ . Dar  $e^x \geq x + 1$ ,  $\forall x \geq 0$ , deci

$$e^{a_n} \geq a_n + 1 \Leftrightarrow \frac{a_n + 1}{e^{a_n}} \leq 1 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1 + a_n}{e^{a_n}}\right) \leq 0 \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n \leq 0,$$

deci  $\{a_n\}$  sir descrescător. Prin urmare sirul este convergent. Fie  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Trecând la limită în relația de recurență, rezultă  $l = \ln(1 + l) \Rightarrow e^l = 1 + l$ , deci  $l = 0$ . În final obținem

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - \ln(1 + x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(x+1)} = \frac{1}{2}.$$

b) Folosind punctul a), rezultă că seriile  $\sum_{n \geq 0} a_n^2$  și  $\sum_{n \geq 0} (a_n - a_{n+1})$  au aceeași natură, conform criteriului de comparație. Dar

$$\sum_{n \geq 0} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 - a_n) = a_0 \in (0, 1),$$

deci  $\sum_{n \geq 0} (a_n - a_{n+1})$  este convergentă și deci și seria  $\sum_{n \geq 0} a_n^2$  este convergentă.

**III.** a) Pentru  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ , obținem  $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

b)  $A^n - I_n = A^n - I_n^n = (A - I_n)(A^{n-1} + A^{n-2} + \dots + A + I_n)$ . Dar  $A^n = 0$ , deci  $(I_n - A)((A^{n-1} + A^{n-2} + \dots + A + I_n)) = I_n$ ; prin urmare  $I_n - A$  este inversabilă și  $(I_n - A)^{-1} = A^{n-1} + A^{n-2} + \dots + A + I_n$ .

**IV.** a) Fie  $A$  matricea lui  $f$  în bază canonică. Fie  $\lambda$  valoare proprie a lui  $f$ , iar  $X \neq 0$  un vector propriu asociat. Atunci

$$AX = \lambda X \Rightarrow A^2X = \lambda^2 X \Rightarrow AX = \lambda^2 X \Rightarrow (\lambda - \lambda^2)X = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}.$$

Dacă  $v$  este un vector propriu corespunzător lui  $\lambda = 0$ , atunci

$$Av = 0 \Leftrightarrow f(v) = v \Leftrightarrow v \in \text{Ker } f,$$

deci subspațiul propriu corespunzător lui  $\lambda = 0$  este  $\text{Ker } f$ . Dacă  $v$  este un vector propriu corespunzător lui  $\lambda = 1$ , atunci  $Av = v \Leftrightarrow f(v) = v \Leftrightarrow v \in \text{Im } f$ . Reciproc, fie  $v \in \text{Im } f$  deci există  $u \in \mathbb{R}^n$  astfel încât  $v = f(u)$ . Folosind  $f = f^2$ , rezultă

$f(u) = f^2(u)$ , deci  $v = f(v) \Leftrightarrow f(v) = 1 \cdot v$  și deci  $v$  este vector propriu corespunzător lui  $\lambda = 1$ . Din dubla incluziune demonstrată mai sus rezultă că subspațiul vectorilor proprii corespunzător  $\lambda = 1$  este  $\text{Im } f$ .

b) Fie  $v \in \text{Ker } f + \text{Im } f \Rightarrow \begin{cases} f(v) = 0 \\ f(v) = v \end{cases} \Leftrightarrow v = 0$ , deci  $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ , incluziunea inversă fiind banală. Are loc evident incluziunea  $\text{Ker } f + \text{Im } f \subset \mathbb{R}^n$ . Demonstrăm incluziunea inversă: fie  $v \in \mathbb{R}^n$ , atunci

$$f(v - f(v)) = f(v) - f^2(v) = (f - f^2)(v) = 0$$

și deci  $v - f(v) \in \text{Ker } f$ . Am obținut astfel

$$v = (v - f(v)) + f(v) \in \text{Ker } f + \text{Im } f$$

și deci  $\mathbb{R}^n \subset \text{Ker } f + \text{Im } f$ . Deoarece rădăcinile complexe ale polinomului caracteristic asociat lui  $f$  sunt toate reale, rezultă că  $f$  este jordanizabilă. Dacă  $J_* = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$  este o celulă Jordan dintr-o matrice Jordan  $J$  asociată lui  $f$  iar  $C$  este matricea de trecere de la bază inițială la bază jordanizatoare, din  $J^2 = (CAC^{-1})(CAC^{-1}) = CA^2C^{-1} = CAC^{-1} = J$ , rezultă  $J^2 = J$ . Pe de altă parte, în caz că ordinul celulei  $J_*$  este  $\geq 2$ , observăm că  $J_*^2 \neq J_*$ , deoarece

$$J_*^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda^2 \end{pmatrix} \neq J_*$$

Deci toate celulele Jordan sunt de ordinul 1; prin urmare  $f$  este diagonalizabilă.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2002-2003

**I. a)** Se observă că deoarece  $\alpha > 0$ , folosind regula l'Hospital și substituția  $t = \frac{1}{x^2}$ , avem:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^\alpha} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^{\alpha/2}}{e^t} = 0.$$

b) Folosind punctul a) pentru  $\alpha = 1$ , obținem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{-1/y^2}}{y} = 0.$$

c) Fie  $\alpha(x,y) = \frac{f(x,y) - f(0,0) - 0(x-0) - 0(y-0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ . Notăm  $\sqrt{x^2+y^2} = t$  și obținem, folosind punctul a) pentru  $\alpha = 1$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha(x,y) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{e^{-1/t^2}}{t} = 0$ . Rezultă că  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(0,0)$ .

d) Avem dezvoltarea în serie

$$f(x,0) = e^{-1/x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{x^2})^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n! \cdot x^{2n}}, \quad x \neq 0,$$

deci

$$\begin{aligned} \int_1^{100} f(x, 0) dx &= \int_1^{100} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n! \cdot x^{2n}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \int_1^{100} x^{-2n} dx = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \left. \frac{x^{-2n+1}}{-2n+1} \right|_1^{100} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (1-2n)} \cdot (100^{-2n+1} - 1). \end{aligned}$$

Limitând eroarea (restul), obținem

$$\left| \frac{(-1)^n}{n! (1-2n)} \right| = \frac{1}{n! (2n-1)} < 10^{-3} \Rightarrow n! (2n-1) > 1000,$$

deci  $n_{\min} = 5$ . Rezultă  $\int_1^{100} f(x, 0) dx \simeq \sum_{n=0}^5 \frac{(-1)^n}{n! (1-2n)} (100^{-2n+1} - 1)$ .

**II.** a) Pentru  $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ , obținem  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ , deci raza de convergență este  $\rho = 1$ . Pe frontiera mulțimii  $(-1, 1)$ , avem cazurile:

- i) Pentru  $x = -1$ , seria devine  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n}$  divergentă.
- ii) Pentru  $x = 1$ , seria devine  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$  convergentă (crit. Leibniz).

În concluzie, mulțimea de convergență este  $(-1, 1]$ . Studiem convergența uniformă seriei cu criteriul lui Cauchy. Avem

$$\begin{aligned} |f_{n+1}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| &= \left| (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+2}}{n+2} + \dots + (-1)^{n+p-1} \frac{x^{n+p}}{n+p} \right| = \\ &= |x|^{n+1} \cdot \left| \frac{1}{n+1} - \frac{x}{n+2} + \frac{x^2}{n+3} - \dots + (-1)^{p-1} \frac{x^p}{n+p} \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{1}{n+1} - \frac{x}{n+2} + \frac{x^2}{n+3} - \dots + (-1)^{p-1} \frac{x^p}{n+p} \right|. \end{aligned}$$

Dacă  $p = 2k + 1$ , atunci

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1}{n+1} - \frac{x}{n+2} + \frac{x^2}{n+3} - \dots + (-1)^{p-1} \frac{x^p}{n+p} \right| = \\ &= \left( \frac{1}{n+1} - \frac{x}{n+2} \right) + \dots + \left( \frac{x^{2k-1}}{n+2k-1} - \frac{x^{2k}}{n+2k} \right) + \frac{x^{2k+1}}{n+2k+1} = \\ &= \frac{1}{n+1} - \left( \frac{x}{n+2} - \frac{x^2}{n+3} \right) - \dots - \left( \frac{x^{2k}}{n+2k} - \frac{x^{2k+1}}{n+2k+1} \right) < \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Analog se tratează cazul  $p = 2k$ . În concluzie, seria este uniform convergentă pe  $[0, 1]$ .

b)  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ ,  $x \in (-1, 1]$ . Pentru  $x \in (-1, 1)$  avem

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x},$$

deci  $S(x) = \int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) + C$ . Dar  $S(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ , și prin urmare  $S(x) = \ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$ . Pentru  $x = 1$ ,  $\lim_{x \nearrow 1} S(x) = S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ .

c) Descompunem în fracții simple termenul general al seriei:

$$\frac{1}{n(n+2)^2} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2} + \frac{C}{(n+2)^2} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 4A+2B+C=0 \\ 4A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1/4 \\ B=-1/4 \\ C=-1/2, \end{cases}$$

deci seria se rescrie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+2)^2}.$$

$$\text{Dar } S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \ln 2, \text{ iar}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - 1 + \frac{1}{2} = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} - 1 + \frac{1}{4} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{3}{4},$$

$$\text{deci } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)^2} = \frac{1}{4} \ln 2 - \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{1}{8} - \frac{\pi^2}{24} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{24}.$$

d) Calculăm integrala improprie

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1+x) dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ \varepsilon > 0}} \int_{\varepsilon}^1 \ln x \cdot \ln(1+x) dx = \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ \varepsilon > 0}} \int_{\varepsilon}^1 \ln x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot x^n dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ \varepsilon > 0}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \underbrace{\int_{\varepsilon}^1 \ln x \cdot x^n dx}_{I_{n, \varepsilon}}. \end{aligned}$$

Calculăm  $I_{n, \varepsilon}$  folosind integrarea prin părți:

$$\begin{aligned} I_{n, \varepsilon} &= \int_{\varepsilon}^1 \ln x \cdot \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' dx = \ln x \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} dx = \\ &= \ln \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \Big|_{\varepsilon}^1 = \ln \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{\varepsilon^{n+1}}{(n+1)^2}, \end{aligned}$$

deci

$$\begin{aligned} I &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ \varepsilon > 0}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left( \ln \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{\varepsilon^{n+1}}{(n+1)^2} \right) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left( 0 - \frac{1}{(n+1)^2} + 0 \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)^2}, \end{aligned}$$

serie convergentă conform criteriului Leibniz, deci integrala este convergentă.

Pentru a calcula suma seriei obținute, descompunem termenul general al acesteia în fracții simple:

$$\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{(n+1)^2} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B+C=0 \\ A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=-1, \end{cases}$$

și deci  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$ . Obținem

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = -\ln 2 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = - \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - 1 \right) = -\ln 2 + 1 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = - \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} - 1 \right) = -\frac{\pi^2}{12} + 1 \end{cases}$$

deci  $I = -\ln 2 + \ln 2 - 1 + \frac{\pi^2}{12} - 1 = \frac{\pi^2}{12} - 2$ .

**III. a)**  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Determinăm forma diagonală a matricii  $A$ . Aflăm

valorile proprii rezolvând ecuația caracteristică:

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (2 + \lambda)^2(1 - \lambda) = 0;$$

obținem  $\lambda_1 = -2$ , ( $m_{\lambda_1} = 2$ );  $\lambda_2 = 1$ , ( $m_{\lambda_2} = 1$ ). Vectorii proprii asociați se determină rezolvând sistemul caracteristic, pentru fiecare valoare proprie în parte.

i) Pentru  $\lambda_1 = -2$ , avem  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a + b + c = 0$ ; alegem

vectorii proprii liniar independenți  $v_1 = (1, 0, -1)^t$ ;  $v_2 = (1, -1, 0)^t$ .

ii) Pentru  $\lambda_2 = 1$ , avem  $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b + c = 0 \\ a - 2b + c = 0 \\ a + b - 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$a = b = c$ ; alegem un vector propriu  $v_3 = (1, 1, 1)^t$ .

Atunci matricele diagonală și modală (de schimbare de bază) sunt, respectiv

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ și } C = [v_1, v_2, v_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Tinând cont de egalitățile echivalente  $D = C^{-1}AC \Leftrightarrow A = CDC^{-1}$ , rezultă

$$\begin{aligned} A^n &= CD^nC^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n \cdot 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n \cdot 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 \\ (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 \\ (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 & (-1)^{n+1} \cdot 2^n + 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

*Metoda 2.* Se observă că  $A = U - 2I_3$ , unde  $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , și că  $UI_3 = I_3U$ , deci  $A^n = (U - 2I_3)^n = \sum_{k=0}^n U^{n-k}(-2I_3)^k = \sum_{k=0}^n (-2)^k U^{n-k}$ . Se poate verifica ușor prin inducție că avem  $U^k = 3^{k-1}U$ ,  $\forall k \geq 1$ . Deci

$$A^n = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (-2)^k 3^{n-k-1} \cdot U}_{T} + (-2)^n \cdot I_3.$$

Prin calcul direct, obținem

$$T = \frac{1}{3} \left( \sum_{k=0}^{n-1} 3^{n-k} (-2)^k + (-2)^n - (-2)^n \right) = \frac{1}{3} \left( \sum_{k=0}^n 3^{n-k} (-2)^k \right) - \frac{(-2)^n}{3},$$

deci  $T = \frac{1}{3}(3-2)^n - \frac{(-2)^n}{3}$  iar  $A^n = \frac{1-(-2)^n}{3}U + (-2)^n I_3$ .

b)  $e^A = C \cdot e^D \cdot C^{-1}$ , iar  $e^D = \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & e^1 \end{pmatrix}$ .

c) valorile proprii au fost calculate la punctul a).

d) Se observă că  $C^{-1}A^nC = D^n = \begin{pmatrix} (-1)^n \cdot 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n \cdot 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , deci

valorile proprii ale matricei  $A^n$  sunt  $\{(-1)^n \cdot 2^n, 1\}$ . Conform criteriului Sylvester,  $A^n$  definește o formă pătratică pozitiv definită dacă și numai dacă aceste valori proprii sunt strict pozitive, deci pentru  $n$  par.

**IV.** a)  $T(A) = A^t$ . Avem

$$T(\alpha A + \beta B) = (\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t = \alpha \cdot T(A) + \beta \cdot T(B), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

deci  $T$  este aplicație liniară.

b) Notăm

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Atunci

$$\begin{cases} T(e_{11}) = e_{11} = 1 \cdot e_{11} + 0 \cdot e_{12} + 0 \cdot e_{21} + 0 \cdot e_{22} \Rightarrow [T(e_{11})]_B = (1, 0, 0, 0)^t \\ T(e_{12}) = e_{21} = 0 \cdot e_{11} + 0 \cdot e_{12} + 1 \cdot e_{21} + 0 \cdot e_{22} \Rightarrow [T(e_{12})]_B = (0, 0, 1, 0)^t \\ T(e_{21}) = e_{12} = 0 \cdot e_{11} + 1 \cdot e_{12} + 0 \cdot e_{21} + 0 \cdot e_{22} \Rightarrow [T(e_{21})]_B = (0, 1, 0, 0)^t \\ T(e_{22}) = e_{22} = 0 \cdot e_{11} + 0 \cdot e_{12} + 0 \cdot e_{21} + 1 \cdot e_{22} \Rightarrow [T(e_{22})]_B = (0, 0, 0, 1)^t, \end{cases}$$

$$\text{deci } [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

c) Polinomul caracteristic asociat matricei  $B$  este

$$P(\lambda) = \det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1),$$

deci valorile proprii sunt  $\lambda_1 = 1$  ( $\mu_1 = 3$ );  $\lambda_2 = -1$  ( $\mu_2 = 1$ ). Determinăm vectorii proprii:

$$\text{i) Pentru } \lambda = 1, \text{ avem } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow b = c; \quad a, c, d \in \mathbb{R}, \text{ deci}$$

$$(a, b, c, d) = a(1, 0, 0, 0) + c(0, 1, 1, 0) + d(0, 0, 0, 1), \quad a, c, d \in \mathbb{R}.$$

Se observă că

$$[e_{11}] = (1, 0, 0, 0)^t, \quad [e_{12} + e_{21}] = (0, 1, 1, 0)^t, \quad [e_{22}] = (0, 0, 0, 1)^t,$$

deci o bază în spațiul propriu  $S_{\lambda=1}$  asociat este  $\{e_{11}, e_{12} + e_{21}, e_{22}\}$ .

ii) Pentru  $\lambda = -1$ , avem

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow (a, b, c, d) = (0, b, -b, 0) = b(0, 1, -1, 0), \quad b \in \mathbb{R}.$$

Se observă că  $[e_{12} - e_{21}] = (0, 1, -1, 0)^t$ , deci o bază în  $S_{\lambda=-1}$  este  $\{e_{22}\}$ .

d)  $W = \{A \in V \mid T(A) = A\}$ . Avem

$$T(A) = A \Leftrightarrow A^t = A \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow b = c,$$

de unde rezultă  $W = \{A \in V \mid A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}\}$ . O bază în  $W$  este prin urmare  $\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$ , deci  $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$ .

Metoda 2. Se observă că  $W = S_{\lambda=1}$ , deci o bază în acest subspațiu este

$$B_{S_{\lambda=1}} = \left\{ e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_{12} + e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2003-2004

**I. a)** Notăm  $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}$ . Atunci  $s_\alpha(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n x^n$  și raza de convergență a seriei de puteri este  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha - n} \right| = 1$ . Folosind relația din enunț pentru  $x \rightsquigarrow t$ , cu  $|t| \leq |x| < \rho$  și integrând, obținem

$$(1+t) \cdot s_\alpha'(t) = \alpha \cdot s_\alpha(t) \Leftrightarrow \frac{s_\alpha'(t)}{s_\alpha(t)} = \frac{\alpha}{1+t} \Rightarrow \int_0^x \frac{s_\alpha'(t)}{s_\alpha(t)} dt = \alpha \int_0^x \frac{1}{1+t} dt \Leftrightarrow$$

$$\ln(s_\alpha(x)) = \alpha \cdot \ln(1+x) \Leftrightarrow s_\alpha(x) = (1+x)^\alpha,$$

deci  $s_\alpha$  este o funcție care se dezvoltă în serie de puteri pe intervalul  $(-\rho, \rho)$ , unde  $\rho = 1$ .

b) Pentru  $\alpha = -\frac{1}{2}$ , avem

$$a_n = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \dots (\frac{1}{2} - n)}{n!} = \frac{(-1)^n \cdot 1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2^n \cdot n!} = \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!}.$$

c) Se știe că  $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot x^n$ , pentru  $|x| < 1$ . Înlocuind  $x \rightarrow x^2$ , obținem  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot x^{2n}$ , și apoi, înlocuind  $x \rightarrow a \sin x$ , rezultă

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2 \sin^2 x}} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot a^{2n} \cdot (\sin x)^{2n}.$$

Atunci integrala din enunț devine

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1+a^2 \sin^2 x}} dx = \frac{\pi}{2} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot a^{2n} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx.$$

Pentru calculul lui  $I_n$  facem schimbarea de variabilă  $\sin^2 x = t$  (deci  $x = \arcsin \sqrt{t}$ ,

$dx = \frac{1}{\sqrt{1-t}} \cdot \frac{1}{2} \cdot t^{-1/2} dt$  și obținem

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 t^n (1-t)^{-1/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot t^{-1/2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{n-\frac{1}{2}} (1-t)^{-1/2} dt = \frac{1}{2} \cdot B\left(n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(n + \frac{1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(n+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(n + \frac{1}{2}) \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}}{n!} = \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2^2 \cdot n!} \cdot \left(n - \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^2 \cdot n!} \cdot \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n - \frac{3}{2}\right) = \dots = \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2^2 \cdot n!} \cdot \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \dots \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi(2n-1)(2n-3)\dots 1}{2^{n+3} \cdot n!} = \frac{\pi(2n-1)!!}{2^{n+3} \cdot n!}. \end{aligned}$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1+a^2 \sin^2 x}} &= \frac{\pi}{2} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot a^{2n} \cdot \frac{\pi(2n-1)!!}{2^{n+3} \cdot n!} = \\ &= \frac{\pi}{2} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \cdot [(2n-1)!!]^2}{2^{2n+3} \cdot (n!)^2} \cdot a^{2n}. \end{aligned}$$

**II.** a) Studiem extremele funcției  $f_{ab}(x, y) = ax + by^2$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Punctele critice sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} \frac{\partial f_{ab}}{\partial x} \equiv a = 0 \\ \frac{\partial f_{ab}}{\partial y} \equiv 2by = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \text{ sau } y = 0. \end{cases}$$

Dacă  $a = 0, b = 0$ , atunci  $f_{ab}(x, y) = 0$  constantă. Dacă  $a = 0, b \in \mathbb{R}$  atunci punctele critice sunt de forma  $(x, 0)$ . În aceste puncte, hessiana funcției  $f$  este  $H_{f_{ab}}(x, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2b \end{pmatrix}$ , deci  $d^2 f_{ab}(x, 0) = 2b \cdot dy^2$ . Dacă  $b > 0$ , atunci avem o infinitate de puncte de minim local; dacă  $b < 0$ , atunci avem o infinitate de puncte de maxim local.

b) Avem  $f_{1,1}(x, y) = x + y^2$ ; ținând cont de restricția  $x^2 + y^2 - 1 = 0$ , obținem lagrangianul extins  $\mathcal{L}(x, y) = x + y^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ . Punctele critice satisfac sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2\lambda} \\ y(1 - \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Dacă  $\lambda = 1$ , atunci  $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Dacă  $\lambda \neq 1$ , atunci  $y = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}$ . Distingem deci următoarele cazuri:

i)  $(x, y) \in \left\{ \left( \frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\}$ ,  $\lambda = 1$ . Matricea hessiană asociată este

$$H_{\mathcal{L}}(1/2; \pm \sqrt{3}/2) = \begin{pmatrix} -2\lambda & 0 \\ 0 & 2-2\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

deci  $d^2\mathcal{L}\left(\frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2dx^2$ ; prin urmare  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  și  $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  sunt puncte de maxim local.

ii)  $(x, y) = (1, 0)$ ,  $\lambda \in \{\pm \frac{1}{2}\}$ . Matricea hessiană asociată este  $H_{\mathcal{L}}(1, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , deci  $d^2\mathcal{L}(1, 0) = -dx^2 + dy^2$ , și deci  $(1, 0)$  nu este punct de extrem local.

iii)  $(x, y) = (-1, 0)$ ,  $\lambda \in \{\pm \frac{1}{2}\}$ . Matricea hessiană este  $H_{\mathcal{L}}(-1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ; minorii Jacobi sunt  $\begin{cases} \Delta_1 = 1 > 0 \\ \Delta_2 = 3 > 0 \end{cases}$ , deci  $(-1, 0)$  este punct de minim local.

c) Fie  $\mathcal{L}_{ab}(x, y) = ax + by - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ . Punctele critice se obțin din sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}_{ab}}{\partial x} = a - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_{ab}}{\partial y} = b - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2\lambda} \\ y(b - \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

Dacă  $y = 0$  atunci  $x = \pm 1 \Rightarrow \frac{a}{2\lambda} = \pm 1 \Rightarrow a = \pm 2\lambda$ , deci  $\lambda = \pm \frac{a}{2}$ .

Dacă  $\lambda = b$  atunci  $x = \frac{a}{2\lambda} = \frac{a}{2b}$ , iar  $x^2 + y^2 = 1$  implică  $\frac{a^2}{4b^2} + y^2 = 1$ , deci

$$y^2 = 1 - \frac{a^2}{4b^2} \Rightarrow y = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4b^2}}$$

Matricea hessiană asociată lagrangianului este  $H_{\mathcal{L}_{ab}}(x, y) = \begin{pmatrix} -2\lambda & 0 \\ 0 & 2(b-\lambda) \end{pmatrix}$ , iar în punctele critice avem

$$H_{\mathcal{L}_{ab}}(1, 0) = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & 2b-a \end{pmatrix}, H_{\mathcal{L}_{ab}}(-1, 0) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 2b+a \end{pmatrix}, H_{\mathcal{L}_{ab}}\left(\frac{a}{2b}, \pm \sqrt{1 - \frac{a^2}{4b^2}}\right) = \begin{pmatrix} -2b & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Distingem cazurile:

- i)  $b \neq 0$ ,  $a \neq 0$ ,  $a \neq \pm 2b$ ; pe lângă două puncte de extrem  $\left(\frac{a}{2b}, \pm \sqrt{1 - \frac{a^2}{4b^2}}\right)$  mai există un punct de extrem în multimea  $\{(\pm 1, 0)\}$ .
- ii)  $b \neq 0$ ,  $a \neq 0$ ,  $a = \pm 2b$ ; există exact două puncte de extrem:  $(\pm 1, 0)$ .
- iii)  $b \neq 0$ ,  $a = 0$ ; există 4 puncte de extrem:  $(\pm 1, 0)$  și  $(0, \pm 1)$ .
- iv)  $b = 0$ ,  $a = 0$ ; nu există puncte de extrem.
- v)  $b = 0$ ,  $a \neq 0$ ; există exact două puncte de extrem:  $(\pm 1, 0)$ .

Condiția pentru exact 2 puncte de extrem local este ( $b = 0$  și  $a \neq 0$ ) sau ( $b \neq 0$ ,  $a \neq 0$  și  $a \in \{\pm 2b\}$ ).

**III. a)** Avem  $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ . Atunci

$$\begin{aligned} L &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, x_1 - x_2 = 0\} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2, x_3 = 3x_1\} \\ &= \{x_1 \cdot (1, 1, 3) \mid x_1 \in \mathbb{R}\} = \text{Span}(\{(1, 1, 3)\}). \end{aligned}$$

Rezultă  $y \in L^\perp \Leftrightarrow x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3 = 0$ ,  $\forall x_1 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x_1(y_1 + y_2 + 3y_3) = 0$ ,  $\forall x_1 \in \mathbb{R}$ , deci  $y \in L^\perp \Leftrightarrow y_1 + y_2 + 3y_3 = 0$ .

Demonstrăm că  $L \cap L^\perp = \{0\}$ . Fie  $y = (y_1, y_2, y_3) \in L \cap L^\perp$ . Atunci

$$\begin{cases} y \in L \Leftrightarrow (y_1, y_2, y_3) = (y_1, y_1, 3y_1) \\ y \in L^\perp \Leftrightarrow y_1 + y_2 + 3y_3 = 0. \end{cases}$$

Din cele două condiții rezultă  $11y_1 = 0$ , deci  $y_1 = 0 \Rightarrow y = 0$ , iar  $L \cap L^\perp = \{0\}$ . Fie  $x \in \mathbb{R}^3$ . Atunci avem descompunerea

$$x = (a, a, 3a) + (x_1 - a, x_2 - a, x_3 - 3a). \quad (13)$$

Pentru ca  $(x_1 - a, x_2 - a, x_3 - 3a) \in L^\perp$ , este necesar ca

$$x_1 - a + x_2 - a + 3(x_3 - 3a) = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 + 3x_3 = 11a,$$

deci  $a = \frac{x_1 + x_2 + 3x_3}{11}$ . Prin urmare orice  $x \in \mathbb{R}^3$  se scrie unic ca  $x = y + z$ , unde  $y \in L$ ,  $z \in L^\perp$ . Rezultă  $\mathbb{R}^3 \subset L + L^\perp$ . Se observă că incluziunea inversă este banală, deci  $L + L^\perp = \mathbb{R}^3$ , și deoarece  $L \cap L^\perp = \{0\}$ , cele două subspații sunt suplementare.

b) Căutăm o bază pentru nucleul aplicației  $T(x) = 11(x - pr_L x)$ . Folosind descompunerea (13), rezultă

$$pr_L x = (a, a, 3a) = \left( \frac{x_1 + x_2 + 3x_3}{11}, \frac{x_1 + x_2 + 3x_3}{11}, \frac{3(x_1 + x_2 + 3x_3)}{11} \right),$$

deci

$$\begin{aligned} T(x) &= 11 \left( \frac{10x_1 - x_2 - 3x_3}{11}, \frac{10x_2 - x_1 - 3x_3}{11}, \frac{2x_3 - 3x_1 - 3x_2}{11} \right) \\ &= (10x_1 - x_2 - 3x_3, 10x_2 - x_1 - 3x_3, 2x_3 - 3x_1 - 3x_2). \end{aligned}$$

Aflăm  $\text{Ker } T$ ; impunem  $T(x) = 0$ , ce conduce la sistemul omogen compatibil simplu nedeterminat (rangul sistemului este 2):

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 10x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \\ 10x_2 - x_1 - 3x_3 = 0 \\ 2x_3 - 3x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = x_1 \\ x_3 = 3x_1, x_1 \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 3a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R},$$

deci  $\text{Ker } T = L$  și  $B = \{(1, 1, 3)\}$  este o bază în  $\text{Ker } T$ .

c)  $T$  nu este injectivă, deoarece  $\text{Ker } T \neq \{0\}$ .

d) Matricea formei pătratice

$$g(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 10x_2^2 - 6x_2x_3 + 2x_3^2$$

este  $A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & -3 \\ -1 & 10 & -3 \\ -3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ . Aplicăm metoda valorilor proprii. Avem

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 10 - \lambda & -1 & -3 \\ -1 & 10 - \lambda & -3 \\ -3 & -3 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda - 11)^2 = 0,$$

deci valorile proprii sunt  $\lambda_1 = 11$ , ( $m_{\lambda_1} = 2$ );  $\lambda_2 = 0$ , ( $m_{\lambda_2} = 1$ ), iar forma canonică este  $g(x) = 11x_1'^2 + 11x_2'^2$ .

**IV.** a) Avem  $\det A = 2 - a$ , deci  $\det A = 0 \Leftrightarrow a = 2$ . În acest caz există minorul nenul  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang } A = 2 \Rightarrow \dim \text{Ker } T = \dim \mathbb{R}^3 - \text{rang}(A) = 3 - 2 = 1$ . În concluzie,  $\dim \text{Ker } T = 1 \Leftrightarrow a = 2$ .

b) Nucleul este caracterizat de sistemul liniar omogen

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -x_1 \\ x_2 = -x_1, \quad x_1 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

deci  $\text{Ker } T = \{(x_1, -x_1, -x_1) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}$ . O bază în  $\text{Ker } T$  este  $\{(1, -1, -1)\}$ , iar o bază ortonormată în  $\text{Ker } T$  este  $\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}$ . Fie  $(y_1, y_2, y_3) \in \text{Im } T$ . Atunci

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = y_1 \\ x_1 + x_3 = y_2 \\ x_1 + x_2 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow y_1 = y_3 + y_2, \quad y_2, y_3 \in \mathbb{R}.$$

Obținem  $\text{Im } T = \{(y_1, y_2, y_3) \mid y_1 = y_2 + y_3, y_2, y_3 \in \mathbb{R}\}$ , deci o bază în  $\text{Im } T$  este  $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ ; ortonormăm această bază, folosind procedeul Gram-Schmidt; obținem:

$$\begin{cases} v_1' = v_1 = (1, 0, 1) \\ v_2' = v_2 - pr_{v_1'} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, v_1' \rangle}{\langle v_1', v_1' \rangle} v_1' = (1, 1, 0) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) = \\ = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) \cdot 2 = (1, 2, -1). \end{cases}$$

Normând, obținem

$$v_1'' = \frac{1}{\|v_1'\|} v_1' = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad v_2'' = \frac{1}{\|v_2'\|} v_2' = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right),$$

deci o bază ortonormată a spațiului  $\text{Im } T$  este  $B_{\text{Im } T}' = \{v_1'', v_2''\}$ .

c) Polinomul caracteristic al matricii  $A$  este

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} a - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1) [-\lambda^2 + \lambda(a + 1) + 2 - a].$$

Din condiția ca  $\lambda = 2$  să fie valoare proprie, rezultă  $P(2) = 0 \Leftrightarrow 3a = 0 \Leftrightarrow a = 0$ .

Prin urmare, matricea  $A$  are coeficienții:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Atunci

$$B = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

matrice simetrică ( $B = B^t$ ), care determină o formă pătratică. Minorii Jacobi ai matricii  $B$  sunt

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = 4 - 1 = 3 > 0, \quad \Delta_3 = 8 + 1 + 1 - 2 - 2 - 2 = 4 > 0,$$

deci  $B = A^2$  determină o formă pătratică pozitiv definită.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2004-2005

**I. a)** Pentru matricea  $[f_1] = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ , polinomul caracteristic asociat este  

$$P_1(\lambda) = \det([f_1] - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 4-\lambda & -1 \\ -2 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-3)^2(\lambda-9),$$

deci  $P_1(\lambda) = 0$  conduce la valorile proprii  $\lambda_1 = 3$  ( $\mu_{\lambda_1} = 2$ ),  $\lambda_2 = 9$  ( $\mu_{\lambda_2} = 1$ ).

Analog, pentru  $[f_2] = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ , avem

$$P_2(\lambda) = \det([f_2] - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 2 \\ 2 & -\lambda & -2 \\ 2 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda+4),$$

Ecuatia caracteristica  $P_2(\lambda) = 0$  produce valorile proprii  $\lambda_1 = 2$  ( $\mu_{\lambda_1} = 2$ ),  $\lambda_2 = -4$  ( $\mu_{\lambda_2} = 1$ ).

b) Avem  $\det[f_1] = 81$ . Fie  $g$  operatorul rădăcină pătrată căutat, care satisface egalitatea  $g^2 = f_1$ . Se observă că spectrul lui  $f_1$  este format din valori pozitive  $\sigma([f_1]) = \{3, 3, 9\}$ , deci  $f_1$  admite rădăcină pătrată. Mai exact, fie  $B$  este baza diagonalizatoare a lui  $f_1$  de la punctul a), iar  $[f_1]_B = D = C^{-1}[f_1]C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$  este matricea lui  $f_1$  relativ la această bază, unde  $C$  este matricea de schimbare de bază. Atunci operatorul  $g$  a cărui matrice relativ la  $B$  este  $[g]_B = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  satisface egalitatea  $[g]_B^2 = [f_1]_B$ . Dar ultima egalitate este independentă de bază, deci  $g^2 = f_1$ .

Pe de altă parte, observăm că  $\det[f_2] = -16$ . Dacă ar exista  $g$  astfel încât  $g^2 = f_2$ , atunci am avea  $-16 = \det[f_2] = \det[g^2] = (\det[g])^2 > 0$ , deci  $-16 > 0$ , contradicție. Rezultă că  $f_2$  nu admite rădăcină pătrată.

c) Căutăm  $X$  pentru operatorul  $f_1$ . Determinăm matricea  $C$  a vectorilor proprii:  
Pentru  $\lambda_1 = 3$ , avem

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b - 2c = 0 \\ 2a + 2b - c = 0 \\ -2a - b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow c = 2a + b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

iar  $v_1 = (0, 1, 1)^t$ ,  $v_2 = (1, 0, 2)^t$  formează o bază a spațiului propriu. Analog, pentru  $\lambda_2 = 9$  avem

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -1 \\ -2 & -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -a + b - c = 0 \\ 2a - 5b - c = 0 \\ -2a - b - 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2c \\ b = -c \\ c \in \mathbb{R} \end{cases},$$

iar  $v_3 = (2, 1, -1)^t$  formează o bază a subspațiului propriu. Rezultă matricea diagonalizatoare  $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$  și matricea diagonală  $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ . Atunci  $A_{f_2} = CDC^{-1}$ , deci

$$X^2 = CDC^{-1} = CDC^{-1}CDC^{-1} = (CDC^{-1})^2 \Rightarrow X = \pm(CDC^{-1}).$$

Alegem

$$X = CDC^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 42 & 15 & -15 \\ 12 & 18 & -6 \\ -12 & -6 & 18 \end{pmatrix}.$$

**III. a)** Avem  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\int_0^x |\sin(uy)| du}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|\sin(xy)|}{1} = 0 = f(0, 0)$ ,

deci  $f$  este continuă în origine.

b)  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$ .

c) Fie  $\alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 0 \cdot x - 0 \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\int_0^x |\sin(uy)| du}{x\sqrt{x^2 + y^2}}$ . Atunci

$$|\alpha(x, y)| = \left| \frac{\int_0^x |\sin(uy)| du}{x\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \left| \frac{\int_0^x |\sin(uy)| du}{x^2} \right|,$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\int_0^x |\sin(uy)| du}{x^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|\sin(xy)|}{2x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|\sin(xy)|}{|xy|} \cdot \frac{y}{2} \cdot (\pm 1) = 0,$$

deci  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha(x, y) = 0$  și prin urmare  $f$  este diferențială Fréchet în  $(0, 0)$ .

e)  $(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)$ , deci există  $k \in \mathbb{N}$  astfel încât  $k\pi \leq xy \leq k\pi + \frac{\pi}{2}$ ; atunci conform cu d), avem  $\frac{2k}{k\pi + \frac{\pi}{2}} \leq f(x, y) \leq \frac{2k+1}{k\pi}$ ; trecând la limită  $k \rightarrow \infty$ , rezultă inegalitățile  $\frac{2}{\pi} \leq \lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y) \leq \frac{2}{\pi}$ . În concluzie,  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} f(x, y) = \frac{2}{\pi}$ .

**III.** Calculăm invariantei  $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -5 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & -3 & 25 \end{vmatrix} = 16 \neq 0$  și  $\delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ,

deci conica este nedegenerată, nu are centru și este gen parabolic, prin urmare este o parabolă. Pentru reprezentarea grafică a conicei în sistemul de coordinate  $xOy$ , obținem vârful  $V'(2, 1)$  la intersecția conicei cu axa de simetrie a acesteia:

$$\begin{cases} g(x, y) = 0 \\ 1 \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + (-1) \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - y + 3)^2 - 16(x - 1) = 0 \\ 4x - 4y - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Translatând sistemul de coordonate în  $O'' = V$  ( $xOy \rightarrow x''O''y''$ ) ecuația conicei devine  $x''^2 - 2x''y'' + y''^2 - 8x'' - 8y'' = 0$ . Făcând rotația de unghi

$$\theta = \arctg\left(-\frac{a_{11}}{a_{12}}\right) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$$

a noului sistem de coordonate  $(x''O''y'' \rightarrow x'O'y', O' = O'')$  descrisă de relațiile

$$\begin{cases} x'' = (x' - y')/\sqrt{2} \\ (x' + y')/\sqrt{2}, \end{cases}$$

ecuația conicei se rescrie:  $y'^2 = 4\sqrt{2}x'$ . Deci graficul conicei relativ la sistemul de coordonate roto-translatat  $x'O'y'$  se află în semiplanul  $x' \geq 0$  (vezi desenul).




Figura 1.

**IV. a)** Fie  $\varepsilon_0 = e^{-1}$ ;  $n_0 \geq n$ ;  $p = n_0! + 1 \in \mathbb{N}$ ,  $x = 1$ . Demonstrăm inegalitatea

$$\Sigma := |f_{n_0}(1) + f_{n_0+1}(1) + \dots + f_{n_0+p}(1)| \geq e^{-1}.$$

Se observă că

$$\begin{aligned} |f_{n_0}(1) + f_{n_0+1}(1) + \dots + f_{n_0+p}(1)| &= e^{-1} \left( \frac{1}{n_0!} + \frac{1}{(n_0+1)!} + \dots + \frac{1}{(n_0+p)!} \right) \\ &> e^{-1} \cdot \frac{p}{n_0!} = e^{-1} \cdot \frac{n_0! + 1}{n_0!} = e^{-1} \left( 1 + \frac{1}{n_0!} \right) \geq e^{-1}, \end{aligned}$$

deci suma  $\Sigma$  nu este uniform convergentă pe  $[0, +\infty)$ .

b) Fie  $p = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^n}$ ,  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ . Atunci

$$\begin{aligned} 2p \sin\left(\frac{x}{2^n}\right) &= \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \sin \frac{x}{2^n} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{x}{2^{n-2}} \cdot \sin \frac{x}{2^{n-2}} = \dots = \frac{1}{2^{n-1}} \sin x, \end{aligned}$$

deci  $p = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}}$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} p = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x \cdot \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\sin x}{x}$ .

c) Fie  $f_n(x) = \frac{1}{2^n} \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$ . Dacă  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , atunci  $|f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \cdot \left| \frac{x}{2^n} \right| < \frac{\pi/2}{2^{2n}} = \frac{\pi}{2^{2n+1}}$ .

Cum  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi}{2^{2n+1}}$  este convergentă, rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  absolut și uniform convergentă pe  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

d)  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} f(x)dx = \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}} \underbrace{\int_{\pi/6}^{\alpha} f(x)dx}_{I_{\alpha}}$ ,  $\alpha < \frac{\pi}{2}$ . Pentru  $I_{\alpha}$ ,  $\sum_{n \geq 1} f_n$  este uniform convergentă pe intervalul  $[\frac{\pi}{6}, \alpha]$ , deci

$$\begin{aligned} \int_{\pi/6}^{\alpha} f(x)dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\pi/6}^{\alpha} f_n(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\pi/6}^{\alpha} \frac{1}{2^n} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2^n}\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{6 \cdot 2^n}}^{\frac{\alpha}{2^n}} \operatorname{tg} y dy = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} -\ln(\cos y) \Big|_{\frac{\pi}{6 \cdot 2^n}}^{\frac{\alpha}{2^n}} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \ln(\cos \frac{\pi}{6 \cdot 2^n})}_{S_1} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \ln(\cos \frac{\alpha}{2^n})}_{S_2}, \end{aligned}$$

unde

$$\begin{aligned} S_1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{6 \cdot 2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}} \right) = \ln \left( \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}} \right) = \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \right) \\ S_2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \cos \alpha \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \dots \cdot \cos \frac{\alpha}{2^{n-1}} \right) = \ln \left( \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\frac{\alpha}{2}} \right). \end{aligned}$$

Atunci

$$\begin{aligned} I &= \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}} I_{\alpha} = \lim_{\substack{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ \alpha < \frac{\pi}{2}}} \left( \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \right) - \ln \left( \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\frac{\alpha}{2}} \right) \right) = \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \right) - \ln \left( \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}} \right) = \\ &= \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \right) - \ln \left( \frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4} \right) = \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \right) - \ln \left( \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) = \ln \left( \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \right). \end{aligned}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2004-2005

**I.** a) Avem  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d$ . Sistemul care are drept

soluții punctele critice ale funcției  $f$ , este  $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + a = 0 \\ 2y + b = 0 \\ 2z + c = 0. \end{cases}$

b) Punctele critice ale funcției sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + b = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 2z + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{a}{2} = -1 \\ y = -\frac{b}{2} = -2 \\ z = -\frac{c}{2} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \\ c = -6. \end{cases}$$

Avem  $f(-1, -2, 3) = 0 \Leftrightarrow 14 + d = 0 \Leftrightarrow d = 14$ . Deoarece  $H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , rezultă

$$d^2f(-1, -2, 3) = 2(dx^2 + dy^2 + dz^2) > 0,$$

deci  $(-1, -2, 3)$  este punct de minim al funcției  $f$  pentru  $a = 2, b = 4, c = -6, d = 14$ .

c) Restrângem pătratele în  $f$  și obținem:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z + 14 = (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2.$$

d) i) Fie  $g(x, y, z) = f(x, y, z) - 1 = (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 - 1$ . Verificăm ipotezele teoremei funcțiilor implicate pentru  $g(x, y, z)$  în raport cu  $z$  și cu punctul  $(-1, -2, 2)$ :

- $g(-1, -2, 2) = 0 + 0 + 1 - 1 = 0$ .
- $g \in C^1$ .
- $\frac{\partial g}{\partial z} = 2(z-3) \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial z}(-1, -2, 2) = -2 \neq 0$ .

Conform teoremei, există o vecinătate  $U \in \vartheta((-1, -2))$ , o vecinătate  $V \in \vartheta(2)$  și o funcție unică  $z = z(x, y)$  astfel încât  $z(-1, -2) = 2$ ,  $z(x, y) \in V$  și  $g(x, y, z(x, y)) = 0$ ,  $\forall (x, y) \in U$ .

ii) Avem  $dz(-1, -2) = \frac{\partial z}{\partial x}(-1, -2)dx + \frac{\partial z}{\partial y}(-1, -2)dy$ . Derivând relația

$$g(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z + 11 = 0$$

în raport cu  $x$ , rezultă:

$$2(x+1) + 2(z-3)\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x+1}{z-3},$$

deci  $\frac{\partial z}{\partial x}(-1, -2) = 0$ . Procedând analog în raport cu  $y$ , avem  $2(y+2) + 2(z-3)\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ , deci  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y+2}{z-3}$  și  $\frac{\partial z}{\partial y}(-1, -2) = 0$ . Prin urmare  $dz(-1, -2) = 0$ .

iii)  $x+1 + (z-3)\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ . Derivând această egalitate în raport cu  $y$ , rezultă  $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + (z-3)\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$ , deci  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(-1, -2) = -\frac{\frac{\partial z}{\partial y}(-1, -2)\frac{\partial z}{\partial x}(-1, -2)}{-1} = 0$ .

**II.** a) Avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = -\sin(x+y) - 1$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(x+y)$ .

b) Obținem

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} [(\sin(x+y) + 1)^2 + \sin^2(x+y)] dx = \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \frac{1 - \cos(2x+2y)}{2} dx + 2(-\cos(x+y)) \Big|_0^{2\pi} + x \Big|_0^{2\pi} = \\ &= x \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin(2x+2y)}{2} \Big|_0^{2\pi} - 2 \cos(2\pi+y) \Big|_0^{2\pi} + 2 \cos y \Big|_0^{2\pi} + 2\pi = \\ &= 2\pi - \frac{\sin(4\pi+2y)}{2} \Big|_0^{2\pi} + \frac{\sin(2y)}{2} \Big|_0^{2\pi} + 2\pi = 4\pi. \end{aligned}$$

c)  $E(y) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (u^2(x, y) + v^2(x, y)) dx$ .  $E'(y) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial y}) dx$ . Dar  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}$  și  $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$  (din ipoteză), deci

$$E'(y) = \int_0^{2\pi} (u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}) dx = uv|_0^{2\pi} = u(2\pi, y) \cdot v(2\pi, y) - u(0, y)v(0, y).$$

Folosind  $u(2\pi, y) = u(0, y)$  și  $v(2\pi, y) = v(0, y)$ , rezultă

$$E'(y) = 0 \Rightarrow E(y) = C, C \in \mathbb{R}.$$

**III.** a) Fie  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$ . Atunci  $T(A) = 0 \Leftrightarrow a_{11} + a_{22} = 0$ , deci

$$\begin{aligned} \text{Ker } T &= \left\{ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{pmatrix} \mid a_{11}, a_{12}, a_{21} \in \mathbb{R} \right\} = \\ &= \left\{ a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mid a_{11}, a_{12}, a_{21} \in \mathbb{R} \right\}, \end{aligned}$$

deci  $\dim \text{Ker } T = 3$ . Deoarece pentru orice  $a \in \mathbb{R}$  și  $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  avem  $T(A) = a$ , rezultă  $\text{Im } T = \mathbb{R}$ . Deci  $\dim \text{Im } T = 1$ , iar  $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow 3 + 1 = 4$  (adevărat).

b) Fie  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .  $B \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f \Rightarrow f(B) = O_2$  și există  $C = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$  a.i.  $f(C) = B$ . Dar

$$\begin{aligned} f(B) = O_2 &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix} \\ f(C) = B &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \alpha + \beta = b \\ \alpha + \beta = b \\ \beta = c \end{cases} \Leftrightarrow b = a + c. \end{aligned}$$

Rezultă  $a = b = c = 0$ , deci  $B = O_2$ . Incluziunea inversă este imediată:  $\text{Ker } f$  și  $\text{Im } f$  conțin  $O_2$  în calitate de subspații netriviale ale lui  $V$ , deci aceeași calitate o are și intersecția lor. Incluziunea  $\text{Ker } f + \text{Im } f \subset V$  are loc imediat (suma a două subspații este subspațiu, deci în particular este submulțime). Fie  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in V$ ; atunci:

$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix}}_{\in \text{Ker } f} + \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}}_{\in \text{Im } f}$ . Rezultă  $V \subset \text{Ker } f + \text{Im } f$ . În concluzie  $\text{Ker } f + \text{Im } f = V$ .

c) Pentru  $B = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$ , avem

$$(f \circ f)(B) = f(f(B)) = f \begin{pmatrix} a & T(B) \\ T(B) & b \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{pmatrix} = f(B).$$

Prin inducție, se demonstrează că  $f^n = f$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ . În particular obținem  $g = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{2005 \text{ ori}} = f$ . Construim imaginile vectorilor bazei

$$E = \left\{ m_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, m_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, m_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

prin transformarea  $g$ :

$$g(m_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [g(m_1)]_E = (1, 0, 1)^t$$

$$g(m_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [g(m_2)]_E = (0, 1, 1)^t$$

$$g(m_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [g(m_3)]_E = (0, 0, 0)^t,$$

deci matricea lui  $g$  relativ la baza  $E$  este  $[g]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

**IV.** a) Fie  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ . Atunci

$$\begin{aligned} P \in L_1 &\Leftrightarrow \begin{cases} P(1) = 0 \\ P(-1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -a_0 \\ a_3 = -a_1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow P(x) = a_0(1 - x^2) + a_1(x - x^3), \end{aligned}$$

Rezultă că o bază a subspațiului vectorial  $L_1$  este  $B = \{1 - x^2, x - x^3\}$ .

Deoarece  $P(2) = P(-2)$ , obținem analog

$$P \in L_2 \Leftrightarrow a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = a_0 - 2a_1 + 4a_2 - 8a_3 \Rightarrow a_1 = -4a_3,$$

deci

$$P \in L_2 \Leftrightarrow P(x) = a_0 - 4a_3x + a_2x^2 - a_3x^3 = a_0 + a_2x^2 + a_3(x^3 - 4x),$$

și deci o bază a subspațiului vectorial  $L_2$  este  $\{1, x^2, x^3 - 4x\}$ . Fie  $P \in L_1 \cap L_2$ .

Atunci  $a_0 + a_1x - a_0x^2 - a_1x^3 = a_0 - 4a_3x + a_2x^2 + a_3x^3$ , deci

$$\begin{cases} a_1 = -4a_3 \\ a_2 = -a_0 \\ a_3 = -a_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = a_3 = 0 \\ a_2 = -a_0 \end{cases} \Leftrightarrow P(x) = a_0 - a_0x^2 = a_0(1 - x^2),$$

și deci o bază în  $L_1 \cap L_2$  este  $\{1 - x^2\}$  și  $\dim(L_1 \cap L_2) = 1$ . Fie

$$P \in L_1 + L_2 = L(1 - x^2, x - x^3) + L(1, x^2, x^3 - 4x) = L(1 - x^2, x - x^3, 1, x^2, x^3 - 4x),$$

deci

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a_0 + a_1x - a_0x^2 - a_1x^3 + a_0 - 4a_3x + a_2x^2 + a_3x^3 \in L(1, x^2, x, x^3) = \mathbb{R}_3[x].$$

Rezultă  $\dim L_1 + L_2 = \dim P_3 = 4$ . Se observă că acest rezultat se poate obține și aplicând teorema Grassmann:

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim(L_1) + \dim(L_2) - \dim(L_1 \cap L_2) \Leftrightarrow 4 = 2 + 3 - 1.$$

b) Deoarece  $Q \in L_2 \Leftrightarrow b_1 = -4b_3$ , deci

$$\begin{aligned} \langle R(x), Q(x) \rangle = 0 &\Leftrightarrow a_0b_0 + a_1(-4b_3) + a_2b_2 + a_3b_3 = 0, \forall b_0, b_1, b_3 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a_0b_0 + b_3(a_3 - 4a_1) + a_2b_2 = 0, \forall b_0, b_3, b_2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0, a_2 = 0 \\ a_3 = 4a_1 \end{cases} \Leftrightarrow R(x) = a_1x + 4a_1x^3 = a_1(x + 4x^3), a_1 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Rezultă că o bază în  $L_2^\perp$  este  $\{x + x^3\}$ ,  $\dim L_2^\perp = 1$ . Aratăm că  $L_1 + L_2 \neq P_3$ . Se observă că:

$$L_1 + L_2^\perp = L(1 - x^2, x - x^3) + L(x + x^3) = L(1 - x^2, x - x^3, x + x^3),$$

deci  $\dim L_1 + L_2^\perp \leq 3 < 4 = \dim P_3$ , și prin urmare  $L_1 + L_2^\perp \neq P_3$ .

c) Determinăm o bază în  $L_2'$ . Avem

$$\begin{aligned} P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in L_2' &\Leftrightarrow \begin{cases} P(2) = 0 \\ P(-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -4a_3 \\ a_0 = -4a_2 \end{cases} \Leftrightarrow \\ P(x) = 4a_2 - 4a_3x + a_2x^2 + a_3x^3 &= a_2(x^2 - 4) + a_3(x^3 - 4x), a_2, a_3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

De asemenea, pentru  $(L_2')^\perp = \{R(x) \in P_3 \mid \langle R(x), Q(x) \rangle = 0, \forall Q \in L_2'\}$ ,

$$R = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in (L_2')^\perp = \{R \in P_3 \mid \langle R(x), P_1(x) \rangle = 0, \langle R(x), P_2 \rangle = 0\}$$

se scrie

$$\begin{cases} a_2 - 4a_0 = 0 \\ a_3 - 4a_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow R(x) = a_0 + a_1x + 4a_0x^2 + 4a_1x^3 = a_0(1 + x^2) + 4a_1(x + x^3),$$

deci o bază în  $(L_2')^\perp$  este  $\{1 + x^2, x + x^3\}$ . Privitor la suma celor două subspații, avem

$$\begin{aligned} L_1 + (L_2')^\perp &= L(1 - x^2, x - x^3) + L(1 + x^2, x + x^3) = \\ &= L(1 - x^2, 1 + x^2, x - x^3, x + x^3) = L(1, x, x^2, x^3) = P_3, \end{aligned}$$

deci  $L_1 + (L_2')^\perp = P_3$  și  $\dim L_1 + (L_2')^\perp = 4$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”**  
Faza interuniversitară, anul I, profil electric, 2005-2006

**I. a)** Observăm că:

$$(\alpha - e^{ix})(\alpha - e^{-ix}) = \alpha^2 - \alpha e^{-ix} - \alpha e^{ix} + 1 = \alpha^2 - \alpha(e^{ix} + e^{-ix}) + 1 = \alpha^2 - 2\alpha \cos x + 1.$$

Rezultă  $\frac{\sin x}{\alpha^2 - 2\alpha \cos x + 1} = \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{\alpha - e^{ix}} - \frac{1}{\alpha - e^{-ix}} \right)$ . Fie  $g(\alpha) = \frac{1}{\alpha - e^{ix}} - \frac{1}{\alpha - e^{-ix}}$ . Atunci  $g'(\alpha) = \frac{-1}{(\alpha - e^{ix})^2} + \frac{1}{(\alpha - e^{-ix})^2}$ , și în general

$$\begin{aligned} g^{(n)}(0) &= \frac{(-1)^n \cdot n!}{(\alpha - e^{ix})^{n+1}} + \frac{(-1)^{n+1} \cdot n!}{(\alpha - e^{-ix})^{n+1}} \Big|_{\alpha=0} = \\ &= (-1)^n \cdot n! \left( \frac{1}{(-1)^{n+1} \cdot e^{ix(n+1)}} - \frac{1}{(-1)^{n+1} \cdot e^{-ix(n+1)}} \right) = \\ &= n! \left( \frac{1}{e^{-ix(n+1)}} - \frac{1}{e^{ix(n+1)}} \right) = n!(e^{ix(n+1)} - e^{-ix(n+1)}) = n! \cdot 2i \sin((n+1)x). \end{aligned}$$

Rezultă  $\frac{\sin x}{\alpha^2 - 2\alpha \cos x + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! \cdot \sin(n+1)x}{n!} \cdot \alpha^n$ , deci  $\frac{\alpha \sin x}{\alpha^2 - 2\alpha \cos x + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(n+1)x \cdot \alpha^n$ .

b) Notând  $I = \int_{-x}^x \sin(nt) \cdot \sin(kt) dt$ , avem

$$\begin{aligned} I &= \int_{-x}^x \frac{\cos(kt - nt) - \cos(kt + nt)}{2} dt = \frac{\sin t(k-n)}{2(k-n)} \Big|_{-x}^x - \frac{\sin t(k+n)}{2(k+n)} \Big|_{-x}^x = \\ &= \frac{\sin(x(k-n)) + \sin(x(k-n))}{2(k-n)} - \frac{\sin(x(k+n)) + \sin(x(k+n))}{2(k+n)} = \\ &= \frac{\sin(x(k-n))}{k-n} - \frac{\sin(x(k+n))}{k+n}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Obținem succesiv } I_n(\alpha) &= \int_{-x}^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} \sin((n+1)x) \cdot \alpha^n \right) \cdot \sin nx dx = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \int_{-x}^x \sin((n+1)x) \cdot \sin nx dx = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \left( \frac{\sin x}{1} - \frac{\sin(x(2n+1))}{2n+1} \right), \end{aligned}$$

conform punctului b), pentru  $k = n + 1$ .

**III. a)**  $F(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left( \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} dx$ ,  $|a| < 1$ . Obținem

$$\begin{aligned} F'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-a \cos x}{1+a \cos x} \cdot \frac{\cos x(1-a \cos x) + (1+a \cos x)\cos x}{(1-a \cos x)^2} \cdot \frac{1}{\cos x} dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1-a^2 \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} - a^2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon} \frac{2}{t^2 + 1 - a^2} dt, \end{aligned}$$

unde am efectuat substituția  $\operatorname{tg} x = t$ . Dar  $|a| < 1 \Rightarrow 1 - a^2 > 0$ , deci

$$\begin{aligned} F'(a) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \operatorname{arctg} \left( \frac{t}{\sqrt{1-a^2}} \right) \Big|_0^{\varepsilon} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \left( \operatorname{arctg} \left( \frac{\varepsilon}{\sqrt{1-a^2}} \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}. \end{aligned}$$

b) Conform punctului a),  $F'(a) = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$ . Atunci  $F(a) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} da = \pi \arcsin a + C$ . Dar  $F(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx = 0$ , deci  $C = 0 \Rightarrow F(a) = \pi \arcsin a$ .

**III.** a) Fie  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$  a.î.

$$\alpha_1 l_1(u) + \alpha_2 l_2(u) + \alpha_3 l_3(u) + \alpha_4 l_4(u) = 0, \forall u \in \mathbb{R}^4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha_1 l_1(u) + s_1 \alpha_2 l_2(u) + s_2 \alpha_3 l_3(u) + s_3 \alpha_4 l_4(u) = 0, \forall u \in \mathbb{R}^4.$$

Relațiile lui Viète:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^4 x_i = 4, \quad \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^4 x_i \cdot x_j = 6 \\ \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i \neq j \neq k}}^4 x_i \cdot x_j \cdot x_k = 4 \\ x_1 x_2 x_3 x_4 = -8 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} s_1 = 4 \\ s_2 = s_1^2 - 2 \sum x_i \cdot x_j = 16 - 12 = 4 \\ s_3 = 4s_2 - 6s_1 + 16 + 8 \left( \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} \right) \\ = 32 - 24 + 8 \cdot \frac{4}{-8} = 4, \end{array} \right.$$

implică  $4\alpha_1 u_1 + 4\alpha_2 u_2 + 4\alpha_3 u_3 + 4\alpha_4 u_4 = 0, \forall u \in \mathbb{R}^4 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ , deci  $l_j(u)$  sunt liniar independente.

b) Din definiție,  $Q(u) = \sum_{l=1}^4 s_{l-1} u_1 u_2 + \sum_{l=1}^4 s_l u_2 u_l + \sum_{l=1}^4 s_{l+1} u_3 u_l + \sum_{l=1}^4 s_{l+2} u_4 u_l$ ,

deci

$$\begin{aligned} Q(u) &= s_0 u_1^2 + s_1 u_1 u_2 + s_2 u_1 u_3 + s_3 u_1 u_4 + s_1 u_2 u_1 + s_1 u_2^2 + s_3 u_2 u_3 + s_4 u_2 u_4 + \\ &\quad + s_2 u_3 u_1 + s_3 u_3 u_2 + s_4 u_3^2 + s_5 u_3 u_4 + s_3 u_4 u_1 + s_4 u_4 u_2 + s_5 u_4 u_3 + s_6 u_4^2 = \\ &= s_0 u_1^2 + 2s_1 u_1 u_2 + s_2(u_2^2 + 2u_1 u_3) + s_3(2u_1 u_4 + 2u_2 u_3) + \\ &\quad + s_4(2u_2 u_4 + u_3^2 + u_3^2) + 2s_5 u_3 u_4 + s_6 u_4^2. \end{aligned}$$

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^4 l_j^2 &= \sum_{j=1}^4 (u_1 + x_j u_2 + x_j^2 u_3 + x_j^3 u_4)^2 = \sum_{j=1}^4 (u_1^2 + x_j^2 u_2^2 + x_j^4 u_3^2 + x_j^6 u_4^2 + 2x_j u_1 u_2 + \\ &\quad + 2x_j^2 u_1 u_3 + 2x_j^3 u_1 u_4 + 2x_j^3 u_2 u_3 + 2x_j^2 u_2 u_4 + 2x_j^5 u_3 u_4) = \\ &= s_0 u_1^2 + s_2(u_2^2 + 2u_1 u_3) + 2s_3(u_1 u_4 + u_2 u_3) + 2s_4(u_3^2 + u_2 u_4) + 2s_5 u_3 u_4 + s_6 u_4^2. \end{aligned}$$

Rezultă  $Q(u) = \sum_{j=1}^4 l_j^2$ .

c)  $A = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & s_3 \\ s_1 & s_2 & s_3 & s_4 \\ s_2 & s_3 & s_4 & s_5 \\ s_3 & s_4 & s_5 & s_6 \end{pmatrix}$ , unde  $\begin{cases} s_0 = 4 \\ s_1 = 4 \\ s_2 = 4 \\ s_3 = 4 \end{cases}$ . Obținem

$$\begin{cases} s_4 - 4s_3 + 6s_2 - 4s_1 - 32 = 0 \Rightarrow s_4 = 16 - 24 + 16 + 32 = 40 \\ s_5 - 4s_4 + 6s_3 - 4s_2 - 8s_1 = 0 \Rightarrow s_5 = 160 - 24 + 16 + 32 = 184 \\ s_6 - 4s_5 + 6s_4 - 4s_3 - 8s_2 = 0 \Rightarrow s_6 = 736 - 240 + 16 + 32 = 544, \end{cases}$$

deci  $A = 4 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 10 & 46 \\ 1 & 10 & 46 & 136 \end{pmatrix}$ . Pentru aducerea la forma canonica a formei patratice

$$Q(u) = 4(u_1^2 + 2u_1u_2 + 2u_1u_3 + 2u_1u_4 + u_2^2 + 2u_2u_3 + 20u_2u_4 + 10u_3^2 + 92u_3u_4 + 136u_4^2)$$

folosim metoda Gauss; se obtine:

$$\begin{aligned} Q(u) &= 4[(u_1 + u_2 + u_3 + u_4)^2 + 9u_3^2 + 135u_4^2 + 18u_2u_4 + 90u_3u_4] = \\ &= 4[(u_1 + u_2 + u_3 + u_4)^2 + 9(u_3^2 + 15u_4^2 + 2u_2u_4 + 10u_3u_4)] = \\ &= 4\{(u_1 + u_2 + u_3 + u_4)^2 + 9[(u_3 + 5u_4)^2 + 2u_2u_4 - 10u_4^2]\} = \\ &= 4\{(u_1 + u_2 + u_3 + u_4)^2 + 9(u_3 + 5u_4)^2 + 9[-10(u_4 - \frac{u_2}{2\sqrt{5}})^2 + 10 \cdot \frac{u_2^2}{20}]\} = \\ &= 4x_1^2 + 9x_2^2 - 90x_3^2 + \frac{9}{2}x_4^2, \quad \text{deci signatura este } (3, 1). \end{aligned}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul I, profil mecanic, 2005-2006

**I. a)** Avem  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y^3}{x^4+y^4}, & \text{pentru } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{pentru } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ . Calculăm  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3y^3}{x^4+y^4}$ .

Dar  $\left| \frac{x^3y^3}{x^4+y^4} \right| \leq \left| \frac{x^3y^3}{2x^2y^2} \right| = \left| \frac{xy}{2} \right|$ , iar  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left| \frac{xy}{2} \right| = 0$ , rezultă  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3y^3}{x^4+y^4} = 0 = f(0, 0)$  și deci  $f$  este continuă în  $(0, 0)$ .

$$\text{b)} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0 \text{ și } \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0.$$

$$\text{c)} \text{ Fie } \alpha(x, y) = \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x^3y^3}{(x^4+y^4)\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x^2y^2}{x^4+y^4} \cdot \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}. \text{ Atunci}$$

$$|\alpha(x, y)| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{2x^2y^2}{x^4+y^4} \cdot \frac{\sqrt{2|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \sqrt{|xy|} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{|x||y|}.$$

Dar membrul drept tinde spre 0 pentru  $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ , deci  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha(x, y) = 0$ , deci  $f$  este diferențiabilă Fréchet în  $(0, 0)$ .

d) Avem  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}, n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^4} + n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n^8 + 1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$  și seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$  este convergentă, deci seria dată este convergentă.

**II. a)** Avem  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}(2x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2^{2n+1}}} 2 \sin^{2n+1} x \cdot \cos^{2n+1} x dx$ , deci folosind schimbarea de variabilă  $\sin x = y$  (care implică  $\cos x = y', dx = dy$ ), obținem

$I_n = \int_0^1 2^{2n+1} y^{2n+1} \cdot (1-y^2)^n dy$ . Notând  $y^2 = z$  ( $\Rightarrow y = z^{1/2}$ ,  $dy = \frac{1}{2}z^{-1/2}dz$ ), rezultă

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 2z^n z^{1/2} (1-z)^n \frac{1}{2} z^{-1/2} dz = \int_0^1 z^n (1-z)^n dz = B(n-1, n-1) = \\ &= \frac{\Gamma(n-1) \cdot \Gamma(n-1)}{\Gamma(2n-2)} = \frac{(n-2)!(n-2)!}{(2n-3)!}, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

$$\text{Pentru } n=0 \Rightarrow I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Pentru  $n=1$ , avem

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(2x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x)(1-\cos^2(2x)) dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(2x) \cdot \sin(2x) dx = 1 + \frac{\cos^3(2x)}{6} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 + \frac{-1-1}{6} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

b)  $I_n = \int_a^b (x-a)^n (b-x)^n dx$ . Notăm  $x = a + (b-a)t \in [0, 1]$  și obținem

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (b-a)^n t^n (b-a)^n (1-t)^n (b-a) dt = \\ &= (b-a)^{2n+1} \int_0^1 t^n (1-t)^n dt = (b-a)^{2n+1} \cdot B(n-1, n-1) = \\ &= (b-a)^{2n+1} \cdot \frac{(n-2)!(n-2)!}{(2n-3)!}; \quad n \geq 2. \end{aligned}$$

$$\text{Pentru } n=0 \Rightarrow I_0 = \int_a^b dx = x \Big|_a^b = b-a. \text{ Pentru } n=1, \text{ avem}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_a^b (x-a)(b-x) dx = \int_a^b (xb-x^2-ab+ax) dx = \\ &= \frac{-x^3}{3} \Big|_a^b + \frac{x^2}{2}(b+a) \Big|_a^b - abx \Big|_a^b = -\frac{(b^3-a^3)}{3} + \frac{(b^2-a^2)(b+a)}{2} - ab(b-a). \end{aligned}$$

c) Obținem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(b-a)^{2n+1}((n-2)!)^2}{(2n-3)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(b-a)^{2n+3}(n-1)!(n-1)!}{(2n-1)!} \cdot \frac{(2n-3)!}{(b-a)^{2n+1}(n-2)!(n-2)!} = \\ &= (b-a)^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)^2}{(2n-2)(2n-1)} = \frac{(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

**III. a)**  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ , deci  $F$  bază a lui  $\mathbb{R}^3$ . Pentru coordonatele lui  $v$ , avem  $v = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 1, 1) + \gamma(1, 0, 0)$ , deci

$$\begin{cases} 1 = \alpha + \beta + \gamma \\ 2 = \alpha + \beta \\ 3 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 3 \\ \gamma = -1 \end{cases} \Rightarrow v = (-1) \cdot (1, 1, 0) + 3 \cdot (1, 1, 1) + (-1) \cdot (1, 0, 0),$$

deci  $[v]_F = (-1, 3, -1)^t$ .

b) În baza  $F$ , avem  $T_m(v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & m \\ 1 & 0 & 1 \\ m & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-m \\ -2 \\ 3-m \end{pmatrix}$ .

c) Luăm  $m = 0$ , deci  $A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Obținem forma diagonală

$$\det(A_0 - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = \sqrt{2} \\ \lambda_3 = -\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Aflăm vectorii proprii ai matricei  $A$ :

$$\lambda_1 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a + c = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \sqrt{2} \Rightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -a\sqrt{2} + b = 0 \\ a - b\sqrt{2} + c = 0 \\ b - c\sqrt{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = c \\ b = a\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_3 = -\sqrt{2} \Rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a\sqrt{2} + b = 0 \\ a + b\sqrt{2} + c = 0 \\ b + c\sqrt{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -a\sqrt{2} \\ a = c \end{cases} \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

deci  $C_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Avem  $A_0 = C_0 D_0 C_0^{-1} \Rightarrow A_0^{2006} = C_0 D_0^{2006} C_0^{-1}$ , de unde rezultă

$$C_0^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}, D_0^{2006} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{1003} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{1003} \end{pmatrix}$$

și deci

$$A_0^{2006} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{1003} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{1003} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

**IV. a) 1)** Verificăm axiomele produsului scalar:

- pozitivitate:  $g(x, x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1^2 + 2 \cdot x_1 \cdot \frac{x_2}{2} + \frac{x_2^2}{4}) + \frac{3x_2^2}{4} + x_3^2$ , deci  $g(x, x) = (x_1 + \frac{x_2}{2})^2 + \frac{3}{4}x_2^2 + x_3^2 \geq 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^3$ . De asemenea, obținem  $g(x, x) = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Leftrightarrow x = (0, 0, 0)$ ;
- simetrie:  $g(x, y) = g(y, x)$  (evident);
- aditivitate în primul argument:

$$\begin{aligned} g(x+y, z) &= (x_1 + y_1)z_1 + \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)z_2 + (x_2 + y_2)z_1] + (x_2 + y_2)z_2 + \\ &\quad + (x_3 + y_3)z_3 = x_1z_1 + \frac{1}{2}(x_1z_2 + x_2z_1) + x_2z_2 + x_3z_3 + y_1z_1 + \frac{1}{2}(y_1z_2 + y_2z_1) + \\ &\quad + y_2z_2 + y_3z_3 = g(x, z) + g(y, z); \end{aligned}$$

- omogenitate în primul argument:

$$g(\lambda x, y) = \lambda x_1 y_1 + \frac{1}{2}(\lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_1) + \lambda x_2 y_2 + \lambda x_3 y_3 = \lambda \cdot g(x, y).$$

Deci  $g(x, y)$  este produs scalar pe  $V$ .

b) Vom utiliza procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, 0) \\ v_2 &= (0, 1, 0) - \frac{g((0, 1, 0), (1, 0, 0))}{g((1, 0, 0), (1, 0, 0))} \cdot (1, 0, 0) = (0, 1, 0) - \frac{0 + \frac{1}{2}(0+1) + 0 + 0}{1 + \frac{1}{2}(0+0) + 0 + 0} \cdot (1, 0, 0) = \\ &= (0, 1, 0) - \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right); \\ v_3 &= (0, 0, 1) - \frac{g((0, 0, 1), (1, 0, 0))}{g((1, 0, 0), (1, 0, 0))} \cdot (1, 0, 0) - \frac{g((0, 0, 1), (0, 1, 0))}{g((0, 1, 0), (0, 1, 0))} \cdot (0, 1, 0) = \\ &= (0, 0, 1) - 0 \cdot (1, 0, 0) - 0 \cdot (0, 1, 0) = (0, 0, 1), \end{aligned}$$

deci  $E' = \{v_1, v_2, v_3\}$  este baza ortogonalizată.

$$c) \cos \theta = \frac{g(e_1, e_2)}{\sqrt{g(e_1, e_1)} \cdot \sqrt{g(e_2, e_2)}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{1}} = \frac{1}{2}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil cercetare, 2007-2008

**II. a) "⇒"** Presupunem că  $V = \text{Ker } f + \text{Im } f$ . Fie  $v \in \text{Im } f \Rightarrow \exists u \in V$  astfel încât  $f(u) = v$ . Dar  $u = x + y$  unde  $x \in \text{Ker } f$  și  $y \in \text{Im } f \Rightarrow f(x) = 0$  și  $y = f(z)$ , deci

$$v = f(u) = f(x + y) = f(x) + f(y) = 0 + f^2(z) = f^2(z) \Rightarrow v \in \text{Im } f^2$$

Rezultă  $\text{Im } f \subset \text{Im } f^2$  (\*). Pentru a arăta incluziunea inversă ( $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$ ), fie  $v \in \text{Im } f^2 \Rightarrow \exists u \in V$  astfel încât  $f^2(u) = v \Rightarrow v = f(f(u)) \Rightarrow v \in \text{Im } f$ , și deci  $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$  (\*\*). Din (\*) și (\*\*), rezultă  $\text{Im } f = \text{Im } f^2$ .

b) " $\Rightarrow$ " Presupunem adevărată egalitatea  $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ . Demonstrăm egalitatea  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$  prin dublă incluziune. Avem

$$v \in \text{Ker } f \Rightarrow f(v) = 0 \Rightarrow f^2(v) = 0 \Rightarrow v \in \text{Ker } f^2,$$

deci am obținut  $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2$ . Reciproc, avem

$$v \in \text{Ker } f^2 \Rightarrow f^2(v) = 0 \Rightarrow f(f(v)) = 0 \Rightarrow f(v) \in \text{Ker } f;$$

cum însă  $f(v) \in \text{Im } f$ , rezultă

$$f(v) \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\} \Rightarrow f(v) = 0 \Rightarrow v \in \text{Ker } f;$$

am obținut astfel incluziunea  $\text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f$ . Concluzionăm că are loc egalitatea dorită,  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$ .

" $\Leftarrow$ " Presupunem  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$ . Fie  $v \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f \Rightarrow f(v) = 0$  și există  $x \in V$  a.î.  $f(x) = v$ . Dar  $f^2(x) = f(v) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker } f^2 = \text{Ker } f \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow v = 0$ , deci  $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ .

**III.** Aflăm valorile proprii ale matricii  $A = \begin{pmatrix} \text{ch}(a) & b \cdot \text{sh}(a) \\ \frac{\text{sh}(a)}{b} & \text{ch}(a) \end{pmatrix}$ . Avem

$$\det(A + \lambda I_2) = \begin{vmatrix} \text{ch}(a) - \lambda & b \cdot \text{sh}(a) \\ \frac{\text{sh}(a)}{b} & \text{ch}(a) - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (\text{ch}(a) - \lambda)^2 = (\text{sh}(a))^2,$$

deci  $\lambda \in \{\text{ch}(a) \pm \text{sh}(a)\}$ . Determinăm câte o bază în subspațiile proprii:

i) pentru  $\lambda = \text{ch}(a) - \text{sh}(a)$ ,  $a \neq 0$ , avem

$$\begin{aligned} (A - \lambda I_2)v = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \text{ch}(a) & b \cdot \text{sh}(a) \\ \frac{\text{sh}(a)}{b} & \text{ch}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{sh}(a)(a_1 + ba_2) = 0 \Leftrightarrow a_1 = -ba_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = a_2 \begin{pmatrix} -b \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

ii) pentru  $\lambda = \text{ch}(a) + \text{sh}(a)$ ,  $a \neq 0$ , avem

$$\begin{aligned} (A - \lambda I_2)v = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\text{sh}(a) & b \cdot \text{sh}(a) \\ \frac{\text{sh}(a)}{b} & -\text{sh}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow b_1 = b \cdot b_2, \quad b_2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = b_2 \begin{pmatrix} b \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$T$  trebuie să fie matrice cu vectori proprii ai lui  $A$ , de exemplu

$$T = \begin{pmatrix} -b & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \text{ch}(a) - \text{sh}(a) & 0 \\ 0 & \text{ch}(a) + \text{sh}(a) \end{pmatrix}.$$

iii) Din ii) rezultă  $A = T \cdot B \cdot T^{-1} \Rightarrow A^n = T \cdot B^n \cdot T^{-1}$ . Avem

$$B = \begin{pmatrix} \text{ch}(a) - \text{sh}(a) & 0 \\ 0 & \text{ch}(a) + \text{sh}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{e^a + e^{-a}}{2} - \frac{e^a - e^{-a}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{e^a + e^{-a}}{2} + \frac{e^a - e^{-a}}{2} \end{pmatrix},$$

deci  $B = \begin{pmatrix} e^{-a} & 0 \\ 0 & e^a \end{pmatrix}$ , iar  $\det T = -2b \neq 0$  și  $T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1/b & 1 \\ 1/b & 1 \end{pmatrix}$ . Obținem succesiv

$$A^n = \begin{pmatrix} -b & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-na} & 0 \\ 0 & e^{na} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2b} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2b} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{ch}(na) & b \operatorname{sh}(na) \\ \frac{1}{b} \operatorname{sh}(na) & \operatorname{ch}(na) \end{pmatrix}.$$

**IV.** a) Avem  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ ;  $u_0 = 0$ . Arătăm că

$$\int_{n+1}^{2n+1} \frac{1}{x} dx \leq u_n \leq \int_n^{2n} \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \ln(2n+1) - \ln(n+1) \leq u_n \leq \ln(2n) - \ln n. \quad (14)$$

Pentru a demonstra inegalitatea (14), vom aplica succesiv teorema lui Lagrange funcției  $\ln x$ .

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{pe } [n, n+1] & \Rightarrow \exists c_n \in (n, n+1) \text{ a.î. } \ln(n+1) - \ln n = \frac{1}{c_n} \\ \text{pe } [n+1, n+2] & \Rightarrow \exists c_{n+1} \in (n+1, n+2) \text{ a.î. } \ln(n+2) - \ln(n+1) = \frac{1}{c_{n+1}} \\ \dots \\ \text{pe } [2n-1, 2n] & \Rightarrow \exists c_{2n-1} \in (2n-1, 2n) \text{ a.î. } \ln(2n) - \ln(2n-1) = \frac{1}{c_{2n-1}} \end{array} \right.$$

Sumând, obținem  $\frac{1}{c_n} + \dots + \frac{1}{c_{2n-1}} = \ln(2n) - \ln n$ . Dar

$$\frac{1}{c_n} + \dots + \frac{1}{c_{2n-1}} \geq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n},$$

deci  $u_n \leq \ln(2n) - \ln n$ . Analog, aplicând teorema pe intervalele  $[n+1, n+2], \dots, [2n, 2n+1]$  se obține și cealaltă inegalitate. Rezultă  $\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) \leq u_n \leq \ln\left(\frac{2n}{n}\right)$ , deci conform criteriului cleștelui, obținem  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ln 2$ , deci sirul  $u_n$  este convergent.

b) Folosind rezultatul de la punctul a), avem

$$\sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} - u_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \ln 2.$$

c) Seria de puteri se rescrie

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \right) x^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \cdot x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \cdot x^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} (\sqrt{x})^{2n}}_{S_1} - \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n}_{S_2}. \end{aligned}$$

Pentru  $S_1$ , notăm  $\sqrt{x} = t$ . Atunci  $S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} t^{2n}$ . Dar, pentru  $s$  satisfăcând  $|s| \leq |t| < 1$ , avem

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^{2n} = \frac{1}{1-s^2} \Rightarrow \int_0^t \sum_{n=0}^{\infty} s^{2n} ds = \int_0^t \frac{1}{1-s^2} dt \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right|,$$

și deci  $S_1 = \frac{1}{2t} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right| = f(x)$ .

Pentru  $S_2$ , avem  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ . Înlocuind  $x$  cu  $s$ , pentru  $|s| \leq |x| < 1$  avem

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} s^n dx = \int_0^x \frac{1}{1-s} ds \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln|1-x|.$$

Rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = -\frac{1}{x} \ln|1-x| = -2g(x)$ , deci  $\sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) x^n = f(x) + g(x)$ .

d) Folosind rezultatul de la punctul b), obținem:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) = \ln 2.$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2007-2008

**I. a)** Demonstrăm că  $[x] + [x + \frac{1}{2}] = [2x]$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Distingem cazurile:

i)  $x \in [k, k + \frac{1}{2}] \Rightarrow$  relația devine  $k + k = 2k$ , (adevărat).

ii)  $x \in [k + \frac{1}{2}, k + 1] \Rightarrow$  relația devine  $k + (k + 1) = 2k + 1$  (adevărat).

Rezultă  $f(x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ , deci  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ .

b) Fie

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=0}^n f_k(x) = \sum_{k=0}^n \left[ \frac{x + 2^k}{2^{k+1}} \right] = \sum_{k=0}^n \left[ \frac{x}{2^{k+1}} + \frac{1}{2} \right] = \\ &= \sum_{k=0}^n \left( \left[ 2 \cdot \frac{x}{2^{k+1}} \right] - \left[ \frac{x}{2^{k+1}} \right] \right) = \sum_{k=0}^n \left( \left[ \frac{x}{2^k} \right] - \left[ \frac{x}{2^{k+1}} \right] \right), \end{aligned}$$

deci  $S_n(x) = [x] - \left[ \frac{x}{2^{n+1}} \right]$ . Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( [x] - \left[ \frac{x}{2^{n+1}} \right] \right) = \begin{cases} [x], & x \geq 0 \\ [x] + 1, & x < 0. \end{cases}$$

Cum  $f$  nu este funcție continuă, seria  $S_n(x)$  nu este uniform convergentă.

c) Funcțiile discontinue  $g_n(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq 0 \\ g(0) + \frac{1}{n}, & x = 0 \end{cases}$  aproximiază oricât de bine funcția diferențialabilă arbitrară  $g(x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

**II.** Avem

$$V = \{M \in M_n(\mathbb{C}) \mid \exists A, B \in M_n(\mathbb{C}), M = AB - BA\} = \{[A, B] \mid A, B \in M_n(\mathbb{C})\}.$$

Dar  $Tr(AB) = Tr(BA)$ , deci pentru orice matrice  $M$  de forma  $M = AB - BA \in V$ , avem  $Tr(M) = Tr(AB - BA) = 0$ . Rezultă  $V \subset W$ , unde

$$W = \{A | Tr(A) = 0\} = \{A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \mid a_{n,n} = -(a_{11} + \dots + a_{n-1,n-1})\}.$$

Fiind descrisă de o ecuație omogenă, submulțimea  $W \subset M_n(\mathbb{C})$  este subspațiu vectorial, iar o bază a lui  $W$  este

$$B = \{E_{ij} \mid i \neq j; i, j \in \overline{1, n}\} \cup \{F_i \mid i = \overline{1, n-1}\},$$

unde

$$E_{ij} = \{(m_{kl}) \mid m_{kl} = \delta_k^i \delta_l^j\}, \quad F_i = \{(m_{kl}) \mid m_{kl} = \delta_i^k \delta_i^k - \delta_n^i \delta_n^l\}$$

$$\text{și unde s-a folosit notația (simbolul lui Kronecker)} \quad \delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Prin calcul direct se verifică egalitățile

$$[E_{ij}, E_{lk}] = \begin{cases} E_{il}, & j \neq k \\ F_j, & j = k, i = l = n, \end{cases}$$

deci  $B \subset V \Rightarrow W \subset V$ . Rezultă  $V = W$ , și deci

$$\dim V = \dim W = \text{card } B = (n^2 - n) + n - 1 = n^2 - 1.$$

**III. a)** Forma polară  $\mathcal{A}$  asociată lui  $\varphi$  se obține prin dedublare:

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + \frac{1}{2}(x_1y_2 + y_1x_2) + \frac{1}{2}(x_1y_3 + x_3y_1) + \frac{1}{2}(x_2y_3 + x_3y_2),$$

pentru orice  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ . Verificăm pentru  $\mathcal{A}$  proprietățile produsului scalar:

i) Pozitivitate:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x, x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_2^2 + 2x_3^2 = \\ &= \frac{1}{2}((x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2) + x_2^2 + 2x_3^2 \geq 0; \\ \mathcal{A}(x, x) &= 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Rightarrow x = 0. \end{aligned}$$

ii) Simetrie:  $\mathcal{A}(x, y) = \mathcal{A}(y, x)$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$  (evident);

iii) Omogenitate în primul argument:  $\mathcal{A}(\lambda x, y) = \lambda \mathcal{A}(x, y)$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$  (evident);

iv) Aditivitate în primul argument:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x + \bar{x}, y) &= (x_1 + \bar{x}_1)y_1 + 2(x_2 + \bar{x}_2)\bar{y}_2 + 3(x_3 + \bar{x}_3)\bar{y}_3 + \frac{1}{2}[(x_1 + \bar{x}_1)y_3 + (x_3 + \bar{x}_3)y_1] \\ &\quad + \frac{1}{2}[(x_1 + \bar{x}_1)y_2 + (x_2 + \bar{x}_2)y_1] = \mathcal{A}(x, y) + \mathcal{A}(\bar{x}, y), \quad \forall x, \bar{x}, y \in \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Deci  $\mathcal{A}$  este un produs scalar și avem  $\|x\| = \sqrt{\mathcal{A}(x, x)}$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^3$ . Prin urmare,

$$\|e_1\| = \sqrt{\mathcal{A}(e_1, e_1)} = 1, \quad \|e_2\| = \sqrt{\mathcal{A}(e_2, e_2)} = \sqrt{2}, \quad \|e_3\| = \sqrt{\mathcal{A}(e_3, e_3)} = \sqrt{3},$$

$$\text{iar } \cos(\widehat{e_1, e_2}) = \frac{\mathcal{A}(e_1, e_2)}{\|e_1\| \cdot \|e_2\|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2007-2008

**I.** a) Sfera are centrul  $O(0, 0, 0)$ . Dreapta  $(D)$  care trece prin  $O$  și este perpendiculară pe  $(H)$  taie planul în centrul  $P$  al cercului. Atunci

$$\{P\} = (D) \cap (H) : \begin{cases} \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} \\ x + y + z - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow P = (1, 1, 1).$$

Raza sferei este  $R = \sqrt{9} = 3$ , iar distanța de la 0 la  $(H)$  este  $d = \frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \sqrt{3}$ , deci aplicând teorema lui Pitagora, raza cercului de secțiune  $(C)$  este

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}.$$

b) O asemenea sferă are centrul pe drepta  $(D)$ , deci centrul acesteia este un punct  $M(t, t, t) \in (D)$ . Condiția  $d(M, (H))^2 + r^2 = R^2$  se rescrie

$$\left( \frac{|t+t+t-3|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} \right)^2 + 6 = R^2 \Leftrightarrow R = \sqrt{6 + 3(t-1)^2}.$$

Prin urmare, ecuațiile sferelor din enunț sunt:

$$(x-t)^2 + (y-t)^2 + (z-t)^2 = 3(t-1)^2 + 6, \quad t \in \mathbb{R}.$$

c) Condiția  $R = 6$  se rescrie:

$$6 = \sqrt{6 + 3(t-1)^2} \Leftrightarrow 10 = (t-1)^2 \Leftrightarrow t \in \{t_{1,2} = 1 \pm \sqrt{10}\}.$$

Există două soluții:

$$(x-t_k)^2 + (y-t_k)^2 + (z-t_k)^2 = 6, \quad k = \overline{1, 2}.$$

**II.** Alegem  $X = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$ ; prin calcul direct, obținem  $X^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 & \alpha\beta + \beta\gamma \\ 0 & \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}$ .

Relația din enunț conduce la sistemul

$$\begin{cases} \alpha^2 + a\alpha + b = 0 \\ \alpha\beta + \beta\gamma + a\beta = 0 \\ \gamma^2 + a\gamma + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \in \left\{ \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \right\} \\ \gamma \in \left\{ \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \right\} \\ \beta(\alpha + \gamma + a) = 0. \end{cases}$$

Alegem  $\alpha = \alpha_0 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$ ;  $\gamma = \gamma_0 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$  și obținem  $\alpha + \gamma + a = 0$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ , deci rezultă familia infinită de soluții  $\left\{ \begin{pmatrix} \alpha_0 & 0 & \beta \\ 0 & \alpha_0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_0 \end{pmatrix} \mid \beta \in \mathbb{R} \right\}$ .

**III.** a)  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ . Avem  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2+y^2} \neq 0$ , deoarece

alegând  $x_n = y_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$  pentru  $n \rightarrow \infty$ , obținem  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$ , deci funcția  $f$  nu

este continuă în  $(0, 0)$ . Calculăm derivatele parțiale ale funcției în origine:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0. \end{cases}$$

Pentru  $(x, y) \neq (0, 0)$ , obținem  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2(y^2 - x^2)y}{(x^2 + y^2)^2}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2(x^2 - y^2)x}{(x^2 + y^2)^2}$ .

Nefind continuă în origine, rezultă  $f$  nu este diferențiabilă în origine.

b) Obținem succesiv

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ f\left(\sin \frac{t}{2}, \cos \frac{t}{2}\right) \right]^n dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{1} \right)^n dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^n dt.$$

$$\text{Dacă } n = 2k + 1, \text{ atunci } I_{2k+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{2k+1} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t)^k \sin t dt.$$

$$\text{Cu schimbarea de variabilă } \cos t = y, \text{ obținem } I_{2k+1} = \int_0^1 (1 - y^2)^k dy.$$

Cu o nouă schimbare de variabilă  $y^2 = u$  (deci  $y = u^{\frac{1}{2}}$  și  $dy = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}du$ ), rezultă

$$\begin{aligned} I_{2k+1} &= \int_0^1 (1 - u)^k \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{-\frac{1}{2}}(1 - u) du = \\ &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, k + 1\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \Gamma(k + 1)}{\Gamma(k + \frac{3}{2})} = \\ &= \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\pi} \cdot k!}{\Gamma(k + \frac{3}{2})} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\pi} \cdot k!}{(k + \frac{1}{2})\Gamma(k + \frac{1}{2})} = \\ &= \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\pi} \cdot k!}{(k + \frac{1}{2})(k - \frac{1}{2})\Gamma(k - \frac{1}{2})} = \dots = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\pi} \cdot k!}{(k + \frac{1}{2})(k - \frac{1}{2}) \dots \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{k!}{\frac{2k+1}{2} \frac{2k-1}{2} \dots \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{k! 2^{k+1}}{(2k+1)!!} = \frac{k! 2^k}{(2k+1)!!}. \end{aligned}$$

Dacă  $n = 2k$ , atunci  $I_{2k} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{2k} dt$ . Cu schimbarea de variabilă  $\sin t = y$  (deci  $t = \arcsin y$  și  $dt = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}dy$ ), obținem  $I_{2k} = \int_0^1 y^{2k} (1 - y^2)^{-\frac{1}{2}} dy$ , iar cu schimbarea de variabilă  $y^2 = u$  (deci  $y = \sqrt{u}$  și  $dy = \frac{du}{2\sqrt{u}}$ ), rezultă

$$\begin{aligned} I_{2k} &= \int_0^1 u^k (1 - u)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{k-\frac{1}{2}} (1 - u)^{-\frac{1}{2}} du = \\ &= \frac{1}{2} B\left(k + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k + \frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(k + 1)} = \frac{1}{2} \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2}\Gamma(k + \frac{1}{2})}{k!} = \\ &= \dots = \frac{1}{2} \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2}(k - \frac{1}{2}) \dots \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}}{k!} = \frac{1}{2^{k+3}} \frac{\pi(2k-1)!!}{k!}. \end{aligned}$$

In concluzie  $I_n = \begin{cases} \frac{k!2^k}{(2k+1)!!}, & n = 2k+1 \\ \frac{\pi(2k-1)!!}{2^{k+3}k!}, & n = 2k, n \geq 1. \end{cases}$

c) Obținem  $g_n(x) = \frac{1}{2n} \frac{2x^2n}{x^4+n^2} = \frac{x^2}{x^4+n^2}$ , deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^4+n^2} = 0$ , de unde  $g(x) = 0$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Notăm  $h(x) = \frac{x^2}{x^4+n^2}$ . Pentru a determina  $\sup_{x \in \mathbb{R}} h(x)$ , calculăm  $h'(x) = \frac{2x(n^2-x^4)}{(x^4+n^2)^2}$  și avem  $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{0, \pm\sqrt{n}\}$ . Din tabelul de variație al funcției  $h$  rezultă:  $\sup_{x \in \mathbb{R}} h(x) = h(-\sqrt{n}) = h(\sqrt{n}) = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$  pentru  $n \rightarrow \infty$ , deci sirul de funcții  $\{g_n\}$  converge uniform la  $g$ .

**IV.** Termenul general al seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  este  $a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}$ .

Aplicând criteriul raportului, obținem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)^{\beta} \sin \frac{1}{n+1}} \frac{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}{\alpha^n} \right| = |\alpha| \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^{\beta-1} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \frac{\frac{1}{n+1}}{\sin \frac{1}{n+1}} = |\alpha|.$$

Distingem urmatoarele cazuri:

i) Dacă  $|\alpha| < 1 \Rightarrow$  serie convergentă (absolut convergentă).

ii) Dacă  $|\alpha| > 1 \Rightarrow$  serie divergentă.

iii) Dacă  $|\alpha| = 1 \Rightarrow$  avem subcazurile:

iii.1) Pentru  $\alpha = -1$  seria devine  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}$ . Dacă  $\beta > 0 \Rightarrow$  serie convergentă (criteriul lui Leibniz); dacă  $\beta < 0 \Rightarrow$  serie divergentă, deoarece nu există limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}$  (criteriul de necesitate);

iii.2) Pentru  $\alpha = 1$ , seria se rescrie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\beta} \sin \frac{1}{n}}$ . Aplicăm criteriul logaritmic și obținem:  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^{\beta} \sin \frac{1}{n})}{\ln n} = \beta + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\sin \frac{1}{n})}{\ln n}$ . Dar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\sin \frac{1}{x})}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \cos \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\sin \frac{1}{x}} \left( -\cos \frac{1}{x} \right) = -1,$$

deci  $l = \beta - 1$ . Dacă  $\beta - 1 > 1$  atunci seria este convergentă. Dacă  $\beta - 1 < 1$  atunci seria este divergentă.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil electric, 2008-2009

**I. a)** Fie  $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ ,  $x \in [0, 1]$ . Atunci  $f'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ ,  $x \in [0, 1]$ .

Cum  $a_n \geq 0$ , rezultă  $f'(x) \geq 0$ ,  $\forall x \in [0, 1]$ . Pentru  $N \in \mathbb{N}$  fixat, avem inegalitățile

$\sum_{n=0}^N a_n x^n \leq f(x) \leq L, \forall x \in [0, 1]$ , de unde  $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^N a_n x^n \leq L$ . Rezultă că sirul sumelor parțiale  $s_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$  este mărginit, seria  $\sum_{n \geq 0} a_n$  este convergentă și

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq L. \quad (15)$$

Pe de altă parte,  $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \leq \sum_{n \geq 0} a_n, \forall x \in [0, 1]$ , de unde  $\lim_{x \nearrow 1} f(x) \leq \sum_{n \geq 0} a_n$  și

$$L \leq \sum_{n \geq 0} a_n. \quad (16)$$

Din (15) și (16), rezultă că  $\sum_{n \geq 0} a_n = L$ .

b) Exemplu:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ . Avem  $a_n = (-1)^n$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$ , deci raza de convergență este 1. Se constată că

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x}, \quad x \in (-1, 1).$$

Deci avem  $f(x) = \frac{1}{1+x}$  și  $\lim_{x \nearrow 1} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ . Dar  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$  nu este convergentă.

**II. a)** Observăm că  $f_1(x) = \int_a^x f_0(t) dt$ , iar

$$\begin{aligned} f_2(x) &= \int_a^x f_1(t) dt = \int_a^x \left( \int_a^t f_0(y) dy \right) dt = \int_a^x -\frac{\partial(x-t)}{\partial t} \left( \int_a^t f_0(y) dy \right) dt = \\ &= -(x-t) \int_a^t f_0(y) dy \Big|_{t=a}^{t=x} + \int_a^x (x-t) f_0(t) dt = \int_a^x (x-t) f_0(t) dt. \end{aligned}$$

Se poate demonstra prin inducție că  $f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f_0(t) dt, n \geq 1$ .  
Atunci

$$|f_n(x)| = \frac{1}{(n-1)!} \left| \int_a^x (x-t)^{n-1} f_0(t) dt \right| \leq \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} |f_0(t)| dt.$$

Deoarece funcția  $f_0(t)$  este continuă pe compactul  $[a, b]$ , există  $M > 0$ , astfel încât  $|f_0(t)| \leq M, \forall t \in [a, b]$ . Deci

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} dt = \frac{M}{(n-1)!} \left( \frac{-(x-t)^n}{n} \right) \Big|_{t=a}^{t=x} = \frac{M}{n!} (x-a)^n \leq \frac{M}{n!} (b-a)^n.$$

Cum  $\sum_{n \geq 0} \frac{M(b-a)^n}{n!}$  este evident convergentă, din Criteriul lui Weirstrass rezultă că  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  este absolut și uniform convergentă pe  $[a, b]$ .

b) Avem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)) &= \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_a^b f_0(t) dt + \int_a^b (x-t) f_0(t) dt + \dots + \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b (x-t)^{n-1} f_0(t) dt \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left[ 1 + (x-t) + \dots + \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} \right] f_0(t) dt = \\ &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + (x-t) + \dots + \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} \right] f_0(t) dt = \int_a^b e^{x-t} f_0(t) dt = e^x \int_a^b e^{-t} f_0(t) dt. \end{aligned}$$

**III.** Cum  $P_i$  sunt sunt toate pe aceeași circumferință, presupunem că ele sunt toate pe un cerc. Atunci  $P_1 P_2 P_i P_j$  ( $i < j$ ) este un patrulater inscriptibil și din teorema lui Ptolemeu, rezultă că  $a_{12}a_{ij} + a_{1j}a_{i2} = a_{1i}a_{2j}$ ,  $i < j$ . Cum  $(a_{ij})$  este matrice antisimetrică, putem scrie  $a_{12}a_{ij} = a_{2i}a_{1j} + a_{1i}a_{2j}$ ,  $i, j = \overline{1, n}$ . Dacă  $A_i$  este linia  $i$  din matricea  $A$ , avem că  $a_{12}A_i = a_{2i}A_1 + a_{1i}A_2$ ,  $i = \overline{1, n}$ , ceea ce conduce la concluzia  $\text{rang}(A) \leq 2$ . Întrucât  $A$  nu este matrice identic nulă și este antisimetrică, rezultă  $\text{rang}(A) \geq 2$ , deci  $\text{rang}(A) = 2$ .

Pentru funcția  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $f(x) = ax$ , avem  $\text{Ker } f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$ ,  $\dim(\text{Ker } f) = n - 2$ , iar  $\text{Im } f = \{y \in \mathbb{R}^n \mid Ax = y\}$ ,  $\dim(\text{Im } f) = 2$ .

**IV.** Din ipoteză avem  $Ax = 0$  pentru  $x \neq 0$ ; rezultă  $\text{rang}(A) < n$ . Dacă  $\text{rang}(A) < n - 1$  atunci  $\text{rang}(A_i) \leq n - 1$ , deci  $\det A_i = 0$  pentru  $i = \overline{1, n}$ . Presupunem  $\text{rang}(A) = n - 1$ . Fără a pierde generalitatea putem presupune că

$$a_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i a_i, \quad (17)$$

cu  $\alpha_i \in \mathbb{R}$  și  $x = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, -1)^t$ , de unde

$$B_x = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i b_i - b_n = A_y, \quad (18)$$

pentru  $y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ . Scriind matricele pe coloane, calculăm

$$\begin{aligned} \det A_1 &= \det \left( b_1 | a_2 \dots a_{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i a_i \right) = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i (b_1 | a_2 \dots a_{n-1} | a_i) = \\ &= \alpha_1 \det (b_1 | a_2 \dots a_{n-1} | a_1) = \det (a_1 | a_2 \dots a_{n-1} | - \alpha_1 b_1). \end{aligned}$$

Similar pentru  $i = 2, \dots, n - 1$  rezultă  $\det A_i = \det [a_1 | a_2 \dots a_{n-1} | - \alpha_i b_i]$ . Deci

$$\sum_{i=1}^{n-1} \det A_i = \det \left( a_1 | a_2 \dots a_{n-1} | - \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i b_i \right), \quad \sum_{i=1}^n \det A_i = \det \left( a_1 | a_2 \dots a_{n-1} | b_n - \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i b_i \right).$$

Conform (18), ultima coloană este  $-A_y$ , deci conform cu (17) - o combinație liniară a coloanelor  $a_1, \dots, a_{n-1}$ , de unde concluzia:  $\sum_{i=1}^n \det A_i = 0$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2008-2009

**I.** a) Avem:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cdot \cos \frac{y}{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \underbrace{\cos \frac{y}{x^2}}_{\text{finit}} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, y+h) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.\end{aligned}$$

b) Fie  $y_0 \in \mathbb{R}$  arbitrar, fixat. Fie

$$\begin{aligned}\alpha(x, y) &= \frac{f(x, y) - f(0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0) \cdot x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, y_0) \cdot (y - y_0)}{\sqrt{x^2 + (y - y_0)^2}} \\ &= \frac{x^3 \cdot \cos \frac{y}{x^2} - 0 - 0 - 0}{\sqrt{x^2 + (y - y_0)^2}} = \frac{x^3 \cdot \cos \frac{y}{x^3}}{\sqrt{x^2 + (y - y_0)^2}}.\end{aligned}$$

Se observă că are loc majorarea  $|\alpha(x, y)| = \frac{|x^3| \cdot \left| \cos \frac{y}{x^3} \right|}{\sqrt{x^2 + (y - y_0)^2}} \leq \frac{x^3}{|x|} = x|x|$ , iar  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow y_0}} x|x| = 0$ , deci  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow y_0}} |\alpha(x, y)| = 0$ . Prin urmare  $f$  este diferențiabilă Fréchet în punctul  $(0, y_0)$ .

c) Avem  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 \cos \frac{y}{x^2} + 2y \sin \frac{y}{x^2}, x \neq 0$ , deci  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}$  nu există ( $\sin(\infty)$  nu există). În concluzie  $\frac{\partial f}{\partial x}$  nu este continuă în  $(0, y)$ . Dar  $\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin \frac{y}{x^2}$ , deci  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{x \rightarrow 0} -x \underbrace{\sin \frac{y}{x^2}}_{\text{finit}} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, y)$ , deci  $\frac{\partial f}{\partial y}$  este funcție continuă în  $(0, y)$ .

d) Obținem succesiv grad  $g = \left( \frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right)$ ;  $f(r, 1) = \begin{cases} r^3 \cdot \cos \frac{1}{r^2}, r \neq 0 \\ 0, r = 0. \end{cases}$

Prin calcul direct, rezultă

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} = \left[ 3r^2 \cos \frac{1}{r^2} - \sin \frac{1}{r^2} (-2) \right] \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} 2x = \\ &= \left[ 3(x^2 + y^2 + z^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + 2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \right] \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ \frac{\partial g}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} = \left[ 3(x^2 + y^2 + z^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + 2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \right] \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ \frac{\partial g}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial z} = \left[ 3(x^2 + y^2 + z^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + 2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \right] \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},\end{aligned}$$

în punctul  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ . Se observă ușor că  $\text{grad } g(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$ .

**II.** a) Efectuăm schimbarea de variabilă  $t = x + s$ . Atunci

$$f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^\infty e^{-(\frac{s+x}{2})^2} ds = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^\infty e^{-\frac{s^2}{2}-xs-\frac{x^2}{2}} ds = \int_0^\infty e^{\frac{-s^2}{2}-xs} ds.$$

Rezultă

$$\begin{aligned} xf(x) &= x \int_0^\infty e^{-xs} e^{\frac{-s^2}{2}} ds = \int_0^\infty xe^{-xs} e^{\frac{-s^2}{2}} ds = \int_0^\infty (-e^{-xs})'_s e^{\frac{-s^2}{2}} ds = \\ &= \underbrace{-e^{-xs} e^{\frac{-s^2}{2}}}_{-0+1} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-xs} e^{\frac{-s^2}{2}} (-s) ds = 1 - \int_0^\infty se^{-xs-\frac{s^2}{2}} ds < 1. \end{aligned}$$

Inegalitatea  $0 < xf(x)$  este evidentă.

b)  $f'(x) = xe^{\frac{x^2}{2}} \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt + e^{\frac{x^2}{2}} \left(-e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = xe^{\frac{x^2}{2}} \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt - 1 = xf(x) - 1$ .

c) Evident, din a) și b).

d) Prin calcul direct, obținem

$$f(0) = \int_0^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_0^\infty e^{-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} dt \stackrel{\frac{t}{\sqrt{2}}=y}{=} \sqrt{2} \cdot \int_0^\infty e^{-y^2} dy \stackrel{y^2=z}{=} \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

**III.** a) Evident  $f(x, y, z) = (4x + 6y, 3x - 5y, 3x - 6y + z)$ .

b) Cum  $f(x) = Ax$ ,  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 6 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , rezultă  $f^n(x) = A^n \cdot x$ , ceea ce conduce la determinarea numărului natural  $n$  și a numerelor reale  $a_1, \dots, a_n$  cu proprietatea

$$a_n \cdot A^n + a_{n-1} \cdot A^{n-1} + \dots + a_1 \cdot A + a_0 \cdot I_3 = 0.$$

Polinomul caracteristic al matricei  $A$  fiind  $P_A(x) = -\lambda^3 + 39 \cdot \lambda - 38$ , aplicând teorema Cayley-Hamilton se obține egalitatea matriceală  $-A^3 + 39 \cdot A - 38 \cdot I_3 = 0_3$ . Deci  $n = 3$  și  $a_3 = -1, a_2 = 0, a_1 = 39$  și  $a_0 = -38$ .

c) Din  $f(u) = u$ , dacă  $u = (x, y, z)$ , rezultă  $\begin{cases} 3x + 6y = 0 \\ 3x - 6y = 0 \\ 3x - 6y = 0 \end{cases}$ , de unde  $x = y = 0$ .

Atunci  $U = \{(0, 0, z) | z \in \mathbb{R}\}$ .

**IV.**  $S_\lambda : x^2 + y^2 + z^2 - 4(\lambda + 1)x - 2(3\lambda - 2)y + 2(\lambda - 5)z - 14\lambda + 33 = 0$ .

a)  $S_\lambda : (x - 2\lambda - 2)^2 + (y - 3\lambda + 2)^2 + (z - \lambda + 5)^2 - 14\lambda^2 = 0$ . Rezultă că, pentru  $\lambda \neq 0$ ,  $S_\lambda$  : (centru  $(2\lambda + 2, 3\lambda - 2, \lambda - 5)$ , raza  $|\lambda|\sqrt{14}$ ). Pentru  $\lambda = 0$ , avem  $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 5)^2 = 0 \Rightarrow$  este punctul  $(2, -2, 5)$ .

b) Centrul sferelor este  $(2\lambda + 2, 3\lambda - 2, \lambda - 5) = (x, y, z)$ , de unde dreapta cerută este:  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{1} = \lambda$ .

c) Determinăm punctul comun al sferelor  $S_\lambda$ :

$$\lambda(-4x - 6y + 2z - 14) + (x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 10z + 33) = 0, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Obținem  $\begin{cases} -4x - 6y + 2z - 14 = 0 \\ (x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 0 \end{cases}$ , deci  $(2, -2, 5)$  este punctul comun al sferelor  $S_\lambda$ . Planul tangent la sferele  $S_\lambda$  este  $2x + 3y - z + 7 = 0$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2009-2010

**I.** Dacă  $f$  este și derivabilă, atunci

$$f'(x) = 2 \cdot \sqrt{f(x)} \Rightarrow \frac{f'(x)}{2 \cdot \sqrt{f(x)}} = 1 \Rightarrow \sqrt{f(x)} = x + c \Rightarrow f(x) = (x + c)^2.$$

Dar  $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) = x^2$ , deci toate soluțiile problemei sunt

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, 0] \\ x^2, & x \in (0, \infty) \end{cases}, \quad f_2(x) = x^2, \\ f_3(x) &= \begin{cases} x^2, & x \in (-\infty, 0] \\ 0, & x \in (0, \infty) \end{cases}, \quad f_4(x) = 0. \end{aligned}$$

**II.** Are loc dezvoltarea în serie Taylor  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n$ .

a) Avem

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{x-t} f(t) dt &= \int_0^x e^{x-t} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot e^x \cdot \int_0^x e^{-t} t^n dt. \end{aligned}$$

Notăm  $I_n = \int_0^x e^{-t} t^n dt$ . Integrăm prin părți și obținem relația de recurență  $I_n = -e^{-x} x^n + nI_{n-1}$ , de unde  $I_n = -e^{-x} (x^n + nx^{n-1} + \dots + n!) + n!$ . Atunci

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{x-t} f(t) dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot [(-x^n - nx^{n-1} - \dots - n!) + n!e^x] = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \left( e^x - 1 - \frac{x}{1!} - \dots - \frac{x^n}{n!} \right). \end{aligned}$$

b) Se alege  $f(x) = e^{-x}$  și înlocuind în relația de la punctul a) se obține imediat relația cerută.

**III.** a) Folosind proprietățile produsului vectorial, avem

$$\begin{aligned} T(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) &= \vec{a} \times (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \vec{a} \times \vec{v}_1 + \vec{a} \times \vec{v}_2 = T(\vec{v}_1) + T(\vec{v}_2), \\ T(k\vec{v}) &= \vec{a} \times (k\vec{v}) = k(\vec{a} \times \vec{v}) = kT(\vec{v}), \quad \forall k \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

de unde  $T$  este aplicație liniară. Ecuația  $\vec{a} \times \vec{v} = \vec{0}$  admite soluțiile  $\vec{v} = \lambda \vec{a}$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , deci  $\text{Ker } T = \{\lambda \vec{a} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$  (mulțimea vectorilor colieari cu  $\vec{a}$ ). Fie  $\vec{y} = T(\vec{v})$ . Atunci  $\vec{y} = \vec{a} \times \vec{v}$ , deci  $\text{Im } T = \{\vec{y} \mid \vec{y} \perp \vec{a}\}$ .

b) Fie  $\theta_1 = (\widehat{\vec{v}_1}, \widehat{\vec{v}_2})$ ,  $\theta_2 = (\widehat{T\vec{v}_1}, \widehat{T\vec{v}_2})$ , unde  $\vec{v}_k = T\vec{u}_k = \vec{a} \times \vec{u}_k$ ,  $k \in \{1, 2\}$ . Folosind faptul că unghiul format de doi vectori nu depinde de lungimile vectorilor, că  $T$  este aplicație liniară și că produsul vectorial este biliniar, putem presupune că vectorii  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$  sunt versori. În plus, deoarece avem  $T\vec{w} = \|\vec{a}\| \left( \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \times \vec{w} \right)$  și transformarea liniară de scalare omogenă de factor  $\|\vec{a}\|$  conservă unghiiurile, putem presupune că  $\vec{a}$  este vesor. În aceste condiții, notând  $c_k = \cos(\widehat{\vec{u}_k}, \vec{a})$ ,  $k \in \{1, 2\}$ , folosind bilinearitatea produsului scalar și egalitatea  $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{w}) = \langle \vec{a}, \vec{w} \rangle \vec{a} - \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle \vec{w}$ , avem

$$\begin{aligned} \langle T\vec{v}_1, T\vec{v}_2 \rangle &= \langle \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{u}_1), \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{u}_2) \rangle = \\ &= \langle \langle \vec{a}, \vec{u}_1 \rangle \vec{a} - \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle \vec{u}_1, \langle \vec{a}, \vec{u}_2 \rangle \vec{a} - \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle \vec{u}_2 \rangle = \\ &= \langle c_1 \vec{a} - \vec{u}_1, c_2 \vec{a} - \vec{u}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle - c_1 c_2. \end{aligned}$$

Analog, folosind proprietatea de rulare a produsului mixt și antisimetria produsului vectorial, avem

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle &= \langle \vec{a} \times \vec{u}_1, \vec{a} \times \vec{u}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, (\vec{a} \times \vec{u}_2) \times \vec{a} \rangle = \\ &= -\langle \vec{u}_1, \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{u}_2) \rangle = -\langle \vec{u}_1, \langle \vec{a}, \vec{u}_2 \rangle \vec{a} - \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle \vec{u}_2 \rangle = \\ &= -\langle \vec{u}_1, c_2 \vec{a} - \vec{u}_2 \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle - c_1 c_2, \end{aligned}$$

și deci  $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle T\vec{v}_1, T\vec{v}_2 \rangle$ . Din relația  $\langle \vec{a}, T\vec{w} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{a} \times \vec{w} \rangle = 0$  rezultă unghiul  $\widehat{\vec{a}, T\vec{w}} = \frac{\pi}{2}$ ,  $\forall \vec{w} \in V_3$ ; obținem  $\|T\vec{v}_k\| = \|\vec{a} \times \vec{v}_k\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{v}_k\| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, T\vec{u}_k}) = \|\vec{v}_k\|$ . Prin urmare

$$\cos \theta_2 = \frac{\langle T\vec{v}_1, T\vec{v}_2 \rangle}{\|T\vec{v}_1\| \cdot \|T\vec{v}_2\|} = \frac{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle}{\|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\|} = \cos \theta_1,$$

deci transformarea  $T$  conservă unghiiurile (este conformă).

c) Fie  $S(\vec{v})$  liniară cu proprietatea  $S(\vec{v}) \perp \vec{v}$ , deci  $S(\vec{v}) \times \vec{v} = \vec{0}$ ,  $\forall \vec{v} \in V_3$ . Fie  $A$  matricea unică,  $A \in M_3(\mathbb{R})$  cu proprietatea  $S(\vec{v}) = A\vec{v}$ . Notăm  $A = (a_{ij})_{i,j=1,3}$ . Impunând condiția de ortogonalitate, obținem

$$\begin{cases} a_{21}v_1v_3 + a_{22}v_2v_3 + a_{23}v_3^2 - a_{31}v_1v_2 - a_{32}v_2^2 - a_{33}v_2v_3 = 0, \\ a_{11}v_1v_3 + a_{12}v_2v_3 + a_{13}v_3^2 - a_{31}v_1^2 - a_{32}v_1v_2 - a_{33}v_1v_3 = 0, \\ a_{11}v_1v_2 + a_{12}v_2^2 + a_{13}v_2v_3 - a_{21}v_1^2 - a_{22}v_1v_2 - a_{23}v_1v_3 = 0, \quad \forall v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

Alegând  $\vec{v} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{v} = (0, 0, 1)$ ,  $\vec{v} = (0, 1, 0)$ , obținem

$$a_{21} = a_{31} = 0, \quad a_{12} = a_{32} = 0, \quad a_{13} = a_{23} = 0$$

și înlocuind, obținem  $a_{11} = a_{22} = a_{33} = \lambda \in \mathbb{R}$ . Deci  $S(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

**IV.** Fie  $\{v_1, v_2, \dots, v_{n+1}\}$  vectori proprii. Cum oricare  $n$  dintre ei sunt liniari independenți, rezultă că al  $(n+1)$ -lea vector este liniar dependent de ceilalți  $n$  aleși.

Există deci  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ , nu toți nuli, a.î.  $v_{n+1} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ . Presupunem că  $\alpha_1 \neq 0$ . Pe de altă parte,  $T(v_1) = \lambda_1 v_1, \dots, T(v_{n+1}) = \lambda_{n+1} v_{n+1}$ , unde  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$  sunt valori proprii, deci

$$\begin{aligned} \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n) &= \lambda_{n+1}(\alpha_1 v_1 + \alpha_n v_n) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n v_n &= \alpha_1 \lambda_{n+1} v_1 + \dots + \lambda_{n+1} \alpha_n v_n \Leftrightarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{n+1}) = 0 \\ \alpha_2(\lambda_2 - \lambda_{n+1}) = 0 \\ \dots \\ \alpha_n(\lambda_n - \lambda_{n+1}) = 0. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Dar  $\alpha_1 \neq 0$ , deci  $\lambda_1 = \lambda_{n+1}$ . Cum același raționament se poate repeta pe orice combinație a celor  $n+1$  vectori, rezultă  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n+1} = \lambda$ . Deci  $T = \lambda I$ , unde  $I$  este aplicația identică.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2009-2010

**I.** a)  $\sqrt{2|xy|} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow 2|xy| \leq x^2 + y^2 \Rightarrow (|x| - |y|)^2 \geq 0, \forall (x, y) \neq (0, 0)$ .

b) Folosind punctul a), obținem  $\frac{|x|^a |y|^b}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |x|^{a-\frac{1}{2}} \cdot |y|^{b-\frac{1}{2}} \xrightarrow[x,y \rightarrow 0]{} 0$ . Rezultă egalitățile  $\lim_{x,y \rightarrow 0} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ , deci  $f$  este continuă în origine.

c) Obținem

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0. \end{aligned}$$

d) Pentru  $a = 4$  și  $b = 1$ , avem  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}, n\right)(x+1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n^4 + 1}} (x+1)^n$ .

Notăm  $a_n = \frac{1}{n^2 \sqrt{n^4 + 1}}$ . Să observăm că  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1$ , de unde raza de convergență este 1, deci  $x+1 \in (-1, 1), x \in (-2, 0)$ . Dacă  $x = -2$ , avem  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n^4 + 1}} (-1)^n$  (convergentă cu criteriul Leibniz). Dacă  $x = 0$ , avem  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n^4 + 1}} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  convergentă, și din criteriul comparației, rezultă  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n^4 + 1}}$  convergentă. În concluzie mulțimea de convergență este  $[-2, 0]$ .

**II.** Considerăm integrala  $I(0) = \int_0^\infty e^{-(x+\frac{y}{x})^2} dx, y \geq 0$ .

a) Avem  $I(y) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  (cu funcția  $\Gamma$ ). Se observă că  $I(y) \leq I(0)$  pentru  $y \geq 0$ . Rezultă că  $I(y)$  este convergentă, pentru orice  $y \in [0, +\infty)$ .

b) Derivând în raport cu parametrul  $y$ , rezultă

$$I'(y) = \int_0^\infty e^{-(x+\frac{y}{x})^2} \cdot \left[ -2 \left( x + \frac{y}{x} \right) \right] \cdot \frac{1}{x} dx,$$

de unde

$$\begin{aligned} I'(y) + 4I(y) &= \int_0^\infty e^{-(x+\frac{y}{x})^2} \left( 2 - \frac{2y}{x^2} \right) dx = 2 \int_0^\infty e^{-(x+\frac{y}{x})^2} \left( x + \frac{y}{x} \right)' dx = \\ &= 2 \int_0^a e^{-(x+\frac{y}{x})^2} \cdot \left( x + \frac{y}{x} \right)'_x dx + 2 \int_a^\infty e^{-(x+\frac{y}{x})^2} \cdot \left( x + \frac{y}{x} \right)'_x dx = \\ &= -2 \int_{a+\frac{y}{a}}^\infty e^{-u^2} du + 2 \int_{a+\frac{y}{a}}^\infty e^{-u^2} du = 0, \end{aligned}$$

unde s-a folosit substituția  $x + \frac{y}{x} = u$ . Rezultă că  $I'(y) = -4I(y)$ ,  $\forall y \geq 0$ .

c) Deoarece  $\frac{I'(y)}{I(y)} = -4$ , rezultă  $\int \frac{I'(y)}{I(y)} dy = -4 \int dy \Rightarrow \ln I(y) = -4y + \ln C$ , deci  $I(y) = C \cdot e^{-4y}$ ,  $(\forall) y \geq 0$ . Dar  $I(0) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Rightarrow C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , deci  $I(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot e^{-4y}$ .

**III.** a) Verificarea că  $T$  este lineară este trivială.

$$\begin{aligned} \text{Ker } T &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid T(x) = 0\} = \{x \in \mathbb{R}^3; | (2x_2 - x_3, -2x_1 + 2x_3, x_1 - 2x_2) = 0\} = \\ &= \{(2\alpha, \alpha, 2\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \\ \text{Im } T &= \{y \in \mathbb{R}^3 \mid T(x) = y\} = \{y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3; | 2y_1 + y_2 + 2y_3 = 0\}. \end{aligned}$$

b) Proprietatea cerută reprezintă un caz particular al problemei omologe de la profilul electric, pentru vectorul  $a = -2i - j - 2k \equiv (-2, -1, -2)$ . În acest caz, matricea asociată lui  $T : V_3 \rightarrow V_3$ ,  $T(v) = a \times v$  relativ la baza canonica  $\{i, j, k\}$ , coincide cu cea din enunțul problemei date.

c) Avem  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ . Atunci  $I_3 + A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $(I_3 + A)^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ . Rezultă

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 8 & -6 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale matricii  $Q$  sunt soluțiile ecuației caracteristice

$$\det(Q - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow -5\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda + 5 = 0,$$

deci  $(1 - \lambda)(5\lambda^2 + 8\lambda + 5) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} \in \mathbb{C}$ . Deci singura valoare proprie reală este  $\lambda = 1$ . Fie  $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  vector propriu corespunzător valorii proprii  $\lambda = 1$ , deci

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & -\frac{8}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c = a \\ b = \frac{a}{2}, \quad a \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow v = a \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{C}.$$

**IV.**  $\pi : (2m+1)x + (3-4m)y + 3z - 2 = 0$ .

a) Vectorul normal la plan are componente  $n \equiv (2m+1, 3-4m, 3)$ . Condiția ca planul  $\pi_1$  să conțină  $Ox$  și să fie perpendicular pe  $\pi$  este echivalentă cu condițiile  $O(0,0,0) \in \pi_1, \pi_1 \parallel i \equiv (1,0,0), \pi_1 \parallel n$ , deci

$$\pi_1 : \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2m+1 & 3-4m & 3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 3y - z(3-4m) = 0.$$

Analog obținem  $\pi_2 : 3x - z(2m+1) = 0, \pi_3 : (3-4m)x - y(2m+1) = 0$ .

b) Se observă că vectorii  $n_1 \equiv (0, 3, 4m-3)$  și  $n_2 \equiv (3, 0, -2m-1)$  care sunt normali respectiv la planele  $\pi_1$  și  $\pi_2$ , sunt necoliniari, deci planele  $\pi_1$  și  $\pi_2$  sunt concurente după o dreaptă  $\Delta$ . De asemenea, notând cu  $e_1, e_2, e_3$  expresiile care anulate dau respectiv ecuațiile planelor  $\pi_1, \pi_2, \pi_3$ , se observă că  $e_1 \cdot \frac{-(2m+1)}{3} + e_2 \cdot \frac{3-4m}{3} = e_3$ , deci  $\pi_3$  aparține fasciculului de plane determinat de  $\pi_1$  și  $\pi_2$ , deci conține dreapta  $\Delta$ . Rezultă ca  $\pi_1, \pi_2$  și  $\pi_3$  sunt plane concurente după dreapta  $\Delta$ .

c) Eliminând parametrul  $m$  din ecuațiile dreptei  $\Delta$  (ecuațiile planelor  $\pi_1$  și  $\pi_2$ ), rezultă ecuația planului în care se află conținută această dreaptă, atunci când  $m$  variază:

$$m = \frac{3y - 3z}{-4z} = \frac{3x - z}{2z} \Rightarrow 6x - 3y - 5z = 0.$$

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2010-2011

**II.** Notăm  $f(y) = \int_0^y \sqrt{x^4 + (y-y^2)^2} dx$ . Atunci

$$\begin{aligned} f''(y) &= \int_0^y \frac{1}{\sqrt{x^4 + (y-y^2)^2}} (y-y^2)(1-2y) dx + \sqrt{y^4 + (y-y^2)^2} \\ &= y \left( (1-y)(1-2y) \int_0^y \frac{1}{\sqrt{x^4 + (y-y^2)^2}} dx + \sqrt{2y^2 - 2y + 1} \right). \end{aligned}$$

Dacă  $y \leq \frac{1}{2}$  atunci  $f'(y) \geq 0$ ; dacă  $y > \frac{1}{2}$ , vom demonstra că avem tot  $f'(y) \geq 0$ . Cum  $\frac{1}{\sqrt{x^4 + (y-y^2)^2}} \leq \frac{1}{y-y^2}$ , rezultă  $\int_0^y \frac{1}{\sqrt{x^4 + (y-y^2)^2}} dx \leq \int_0^y \frac{1}{y-y^2} dx = \frac{1}{1-y}$ ,

deci

$$f'(y) \geq 1 - 2y + \sqrt{2y^2 - 2y + 1} = 1 - y + \sqrt{2y^2 - 2y + 1} - y = 1 - y + \frac{(y-1)^2}{y + \sqrt{2y^2 - 2y + 1}} \geq 0;$$

prin urmare  $f'(y) \geq 0$ . Rezultă deci  $f'(y) \geq 0, \forall y \in [0, 1]$  și deci  $f$  este crescătoare.

Așadar valoarea maximă a lui  $f(y)$  este  $f(1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ .

**III.** Fie  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  matricea transformării  $T$  relativ la baza canonicaă a lui  $\mathbb{R}^2$ . Atunci

$$\begin{aligned} \langle T(x, y), (x, y) \rangle = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 &\Leftrightarrow \langle (ax + by, cx + dy), (x, y) \rangle = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \\ &\Leftrightarrow ax^2 + (b + c)xy + dy^2 = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = d = 0 \\ b = -c \end{cases} \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Fie  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$  matricea transformării  $S$  relativ la baza canonicaă a lui  $\mathbb{C}^2$ . Atunci

$$\begin{aligned} \langle T(x, y), (x, y) \rangle = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{C}^2 &\Leftrightarrow \langle (ax + by, cx + dy), (x, y) \rangle = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{C}^2 \\ &\Leftrightarrow a|x|^2 + by\bar{x} + cx\bar{y} + d|y|^2 = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{C}^2 \Leftrightarrow a = b = c = d = 0 \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2010-2011

**I. a)** Matricea endomorfismului  $T_a : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  relativ la baza canonicaă a lui  $\mathbb{R}^3$  este  $M_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ a^2/2 & a & 1 \end{pmatrix}$ , matrice nesingulară, deci  $T_a$  este transformare bijectiva.

Prin urmare  $\text{Ker } (T_a) = \{(0, 0, 0)\}$ , iar  $\text{Im } (T_a) = \mathbb{R}^3$ .

**b)** Polinomul caracteristic  $P_{M_a}(\lambda) = \det(M_a - \lambda I_3) = -(\lambda - 1)^3$  are o singură radacină distinctă triplă  $\lambda = 1$  reală, deci o valoare proprie a lui  $T_a$  cu multiplicitatea algebrică trei. Subspațiul propriu asociat acestei valori proprii este

$$S_{\lambda=1} = \text{Ker } (T_a - I_3) = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

În particular, dacă  $a = 0$ , atunci  $M_a = I_3$  este matrice diagonală, deci o bază diagonalizatoare este chiar baza canonicaă  $\{e_1, e_2, e_3\}$  a spațiului vectorial  $\mathbb{R}^3$ . Pentru  $a \neq 0$ , dimensiunea subspațiului propriu  $S_\lambda$  este unu, deci multiplicitatea geometrică a valorii proprii  $\lambda = 1$  diferă de cea algebrică, și deci  $T_a$  este endomorfism jordanizabil, însă ne-diagonalizabil.

**c)** Prin calcul direct, obținem  $M_a \cdot M_b = M_{a+b}$ ,  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ , din care rezultă egalitatea  $M_a^n = M_{na}$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}$  și în particular  $M_a^{-1} = M_{-a} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ a^2/2 & -a & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\forall a \in \mathbb{R}$ .

**d)** Dacă  $a = 0$ , atunci  $M_a = I_3$  este matrice diagonală, limita sirului  $S_n$  există și este  $e^{M_a} = e^{I_3} = e \cdot I_3$ . Dacă  $a \neq 0$ , atunci  $M_a$  este jordanizabilă; notând cu  $T$  matricea jordanizatoare (formată dintr-un vector propriu și doi vectori principali) și cu  $J$  forma

canonică Jordan asociată lui  $M_a$ , avem  $J = T^{-1}M_aT$ , care implică  $e^{M_a} = Te^JT^{-1}$ .

**II.** a) Dreapta admite ecuațiile parametrice  $(x, y, z) = (t+a, bt-2, 3t+a-b)$ ,  $t \in \mathbb{R}$  și este inclusă în planul  $(P_1)$  dacă punctele acesteia satisfac ecuația planului, deci

$$(t+a) + (bt-2) + (3t+a-b) - 4 = 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (b+4)t + (2a-b-6) = 0, \forall t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} b+4=0 \\ 2a-b-6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-4. \end{cases}$$

b) Ecuațiile perpendicularei din  $A$  pe planul  $(P_2)$  sunt:  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{2}$ , iar intersecția acesteia cu planul  $(P_2)$  este punctul  $A'(\frac{7}{9}, -\frac{22}{9}, \frac{14}{9})$ .

c) Cele trei plane se intersectează în punctele ale căror coordonate sunt date de soluția sistemului

$$\begin{cases} x+y+z=4, \\ x+2y+2z=-1, \\ x+7y+7z=-m. \end{cases}$$

Matricea coeficienților necunoscutelor are determinantul zero, are rangul 2, iar sistemul este compatibil dacă determinantul caracteristic al celei de-a treia ecuații este nul, deci

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 7 & -m \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 26-m=0 \Leftrightarrow m=26.$$

Deci pentru  $m \neq 26$  planele nu au puncte comune (se taie două căte două după trei drepte paralele), iar pentru  $m = 26$  sistemul fiind compatibil simplu nedeterminat, planele se intersectează după dreapta  $D = (P_1) \cap (P_2)$ , deci fac parte fasciculul de plane concurente în  $D$ .

**III.** a) Obținem succesiv:

$$\left| x^2y^2 \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \right| \leq x^2y^2 \cdot \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = x^2y^2 \xrightarrow[\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}]{} 0,$$

deci  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$  și deci funcția  $f$  este continuă în origine. Cum  $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ , rezultă imediat că  $f$  este diferențiabilă în origine.

b) Avem

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} 2xy^2 \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{4x^3y^4}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

și deci  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{y} = 0$ . Analog obținem  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = 0$ .

c) Deoarece  $f_n(x) = \begin{cases} \frac{x(n^2x^2-1)}{n^2x^2+1}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ , obținem  $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = f(x)$ , unde

$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ . Fie  $g_n(x) = f_n(x) - f(x) = \begin{cases} \frac{-2x}{n^2x^2+1}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ . Atunci  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n(x)| \leq \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ , de unde  $f_n$  converge uniform la  $f$ .

**IV.** a) Notând  $y = x^2$ , seria se rescrie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} y^n$ . Criteriul raportului produce  $R = \frac{1}{3}$  pentru seria în  $y$ , deci raza de convergență a seriei date este  $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$  iar multimea de convergență este  $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$  (folosind criteriul Leibniz). Fie  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n}$ ,  $x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ . Atunci

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot 3^n \cdot 2 \cdot x^{2n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot 3^n \cdot x^{2n-1},$$

de unde  $xf'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot (\sqrt{3}x)^{2n}$ . Cum  $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ,  $\forall x \in (-1, 1)$ , rezultă

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot [(\sqrt{3}x)^2]^n = -\frac{1}{1+3x^2} + 1 = \frac{3x^2}{1+3x^2}.$$

Atunci  $xf'(x) = \frac{6x^2}{1+3x^2}$ , de unde  $f'(x) = \frac{6x}{1+3x^2}$  și  $f(x) = \ln(1+3x^2) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ . Dar  $f(0) = 0$  (cu definiția) și  $f(0) = \ln(1+3 \cdot 0^2) + C = C$ , de unde rezultă  $C = 0$ . Prin urmare  $f(x) = \ln(1+3x^2)$ .

b) Deoarece  $\left|(-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n}\right| \leq \frac{3^n}{n} \cdot \frac{1}{3^{2n}} = \frac{1}{n \cdot 3^n}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n}$  este convergentă (cu criteriul raportului), rezultă că seria este uniform convergentă.

c) Calculăm  $I$  folosind integrarea prin părți. Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} I &= x \ln(1+3x^2) \Big|_0^{1/\sqrt{3}} - \int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{6x^2}{1+3x^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln 2 - 2 \int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{3x^2}{1+3x^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln 2 - 2x \Big|_0^{1/\sqrt{3}} + 2 \int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{1+3x^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln 2 - \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}(x\sqrt{3}) \Big|_0^{1/\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln 2 - \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{4}. \end{aligned} \tag{19}$$

Pe de altă parte, folosind punctul a), putem calcula

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{1/\sqrt{3}} \ln(1 + 3x^2) dx = \int_0^{1/\sqrt{3}} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^{1/\sqrt{3}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{n(2n+1)}. \end{aligned} \quad (20)$$

Egalând expresiile obținute în (19) și (20), obținem rezultatul cerut.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil electric, 2011-2012

**I.** Cum  $\{1, x, x^2, x^3\}$  este bază în spațiul polinoamelor de grad cel mult 3, rezultă că trebuie să impunem condiția de ortogonalitate a lui  $p(x)$  cu elementele bazei. Dar  $\langle p(x), x \rangle = 0$  și  $\langle p(x), x^3 \rangle = 0$  datorită imparității, deci, impunând  $\langle p(x), 1 \rangle = 0$  și  $\langle p(x), x^2 \rangle = 0$ , găsim  $a = \frac{-3}{35}$  iar  $b = \frac{6}{7}$ .

**II.** a) Folosind proprietățile de aditivitate și omogenitate ale transpunerii, se obțin egalitățile

$$\begin{cases} T_\alpha(A + B) = T_\alpha(A) + T_\alpha(B), & \forall A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \\ T_\alpha(kA) = kT_\alpha(A), & \forall k \in \mathbb{R}, \forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}). \end{cases}$$

b) Componentele imaginilor prin  $T_\alpha$  ale matricelor  $\underbrace{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)}_{m_{11}}, \underbrace{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)}_{m_{12}}, \underbrace{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)}_{m_{21}}, \underbrace{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)}_{m_{22}}$ ,

$$\begin{cases} T_\alpha(m_{11}) = \left(\begin{smallmatrix} 1+\alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = (1+\alpha)m_{11} & \Rightarrow [T_\alpha(m_{11})] = (1+\alpha, 0, 0, 0)^t \\ T_\alpha(m_{12}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & 0 \end{smallmatrix}\right) = m_{12} + \alpha m_{21} & \Rightarrow [T_\alpha(m_{12})] = (0, 1, \alpha, 0)^t \\ T_\alpha(m_{21}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \alpha m_{12} + m_{21} & \Rightarrow [T_\alpha(m_{21})] = (0, \alpha, 1, 0)^t \\ T_\alpha(m_{22}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1+\alpha \end{smallmatrix}\right) = (1+\alpha)m_{22} & \Rightarrow [T_\alpha(m_{22})] = (0, 0, 0, 1+\alpha)^t \end{cases}$$

produc coloanele matricei  $B = [T_\alpha] = \begin{pmatrix} 1+\alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+\alpha \end{pmatrix}$ .

c) Polinomul caracteristic al matricei  $B$  este

$$P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_4) = ((1+\alpha) - \lambda)^2((1-\lambda)^2 - \alpha^2) = (\lambda - (1+\alpha))^3(\lambda - (1-\alpha)).$$

d) Rădăcinile polinomului caracteristic sunt  $1+\alpha$  și  $1-\alpha$ . Distingem cazurile: (i)  $\lambda = 0$ , caz în care  $T_\alpha$  admite valoarea proprie  $\lambda_* = 1$  (cu multiplicitatea algebrică 4), iar  $B = I_4$  (matrice diagonalizabilă, aflată în formă diagonală, iar baza diagonalizatoare este, spre exemplu, baza canonică  $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$  a spațiului  $\mathbb{R}^4$ ). În cazul (ii), când  $\alpha \neq 0$ , valorile proprii distincte ale transformării  $T_\alpha$  sunt:  $\lambda_1 = 1+\alpha$  (triplă) și  $\lambda_2 = 1-\alpha$  (simplă), iar  $B - \lambda_1 I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , cu rangul 1, deci multiplicitatea geometrică (dimensiunea subspațiului propriu) este  $4-1=3$ , deci egală cu multiplicitatea

algebrică a valorii proprii. Multiplicitățile concid și pentru valoarea proprie simplă  $\lambda_2$ , deci  $T_\alpha$  este diagonalizabilă și în cazul (ii). Prin urmare, pentru orice valoare  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $T_\alpha$  este diagonalizabilă. În cazul (ii), rezolvând cele două sisteme caracteristice, obținem baze în spațiile proprii:  $S_{1+\alpha} = \text{Span}(u_1 = e_1, u_2 = e_4, u_3 = (0, 1, 1, 0))$ , și  $S_{1-\alpha} = \text{Span}(u_4 = (0, 1, -1, 0))$ . Deci baza diagonalizatoare este, în cazul (ii),  $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ .

**IV.** a) Cum  $x_{n+1} - x_n = \frac{-x_n^3}{1 + \sqrt{1-x_n^2}} < 0$ , sirul este descrescător, deci există  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Trecând la limită în relația de recurență, obținem  $l = 0$ .

b) Aplicăm criteriul Raabe-Duhamel. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(1 - \sqrt{1 - x_n^2}) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2},$$

și cu criteriul Stolz-Cesàro, limita devine

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 x_{n+1}^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n^2) = \frac{1}{2} < 1,$$

deci seria este divergentă.

c) Aplicăm din nou criteriul Raabe-Duhamel și ținem cont de rezultatele obținute la punctele a) și b), anume  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = 1$ . Astfel,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n^3}{x_{n+1}^3} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1}{\sqrt[3]{1-x_n^2}^3} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1 - \sqrt[3]{1-x_n^2}^3}{\sqrt[3]{1-x_n^2}^3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1 - (1 - x_n^2)^3}{1 + \sqrt[3]{1-x_n^2}^3} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n(1 - 1 + 3x_n^2 - 3x_n^4 + x_n^6) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2(3 - 3x_n^2 + x_n^4) = \frac{3}{2} > 1, \end{aligned}$$

deci seria este convergentă.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul I, profil mecanic, 2011-2012

**I.** a) Condiția de perpendicularitate permite să alegem ca vector normal la plan vectorul director al dreptei,  $\vec{n} \equiv (b, c, a)$ . Planul conține punctul

$$M_0(a + c - \frac{b}{2}, a - \frac{c}{2}, -\frac{a}{2}),$$

deci are ecuația:  $b(X - (a + c - \frac{b}{2})) + c(Y - (a - \frac{c}{2})) + a(Z - (-\frac{a}{2})) = 0$ , care se rescrie

$$bX + cY + aZ + \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) = 0.$$

b) Se observă că proiecția  $N$  a punctului  $M$  pe  $(\pi)$  se află la intersecția cu  $(\pi)$  a dreptei  $(D')$ , care conține punctul  $M(a, b, c)$  și are vectorul său director coliniar cu vectorul normal  $\vec{n} \equiv (b, c, a)$  la  $(\pi)$ . Deci coordonatele lui  $N$  sunt date de sistemul liniar

$$\begin{cases} \frac{X-a}{b} = \frac{Y-b}{c} = \frac{Z-c}{a} \\ bX + cY + aZ + \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) = 0. \end{cases}$$

Soluția sistemului este  $N(a - \frac{b}{2}, b - \frac{c}{2}, c - \frac{a}{2})$ . Punctul  $N$  înjumătățește segmentul  $MP$ , unde  $P$  este simetricul punctului  $M$  față de planul  $(\pi)$ , deci coordonatele sale sunt medii aritmetice ale coordonatelor punctelor  $M(a, b, c)$  și  $P$ ; prin urmare avem:

$$\begin{cases} x_N = (x_M + x_P)/2 \\ y_N = (y_M + y_P)/2 \\ z_N = (z_M + z_P)/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 2x_N - x_M = a - b \\ y_P = 2y_N - y_M = b - c \\ z_P = 2z_N - z_M = c - a. \end{cases}$$

Atunci

$$\begin{pmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ b-c \\ c-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Simetrizarea față de planul  $(\pi)$  fiind descrisă de matricea din relație, rezultă liniaritatea acestei aplicații.

c) Matricea este singulară, de rang 2, deci defectul transformării  $f$  este  $3 - 2 = 1$ .

**II.** a) Matricea asociată familiei de vectori relativ la baza canonică este  $C = [B_m] = \begin{pmatrix} 1+m & 2 & 2 \\ 2 & 1+m & 2 \\ 2 & 2 & 1+m \end{pmatrix}$  are determinantul  $\det C = (m+5)(m-1)^2$ , deci  $B_m$  este bază în  $\mathbb{R}^3$  pentru  $\det C \neq 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 1\}$ . Coordonatele lui  $v$  relativ la  $B_{-1}$  sunt date de  $[B_{-1}]^{-1}[v] = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

b) Pentru orice  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ , forma pătratică  $Q(x) = \varphi(x, x)$  se rescrie

$$Q(x) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1+m & 2 & 2 \\ 2 & 1+m & 2 \\ 2 & 2 & 1+m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (1+m)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1).$$

Pentru  $m = 1$ , avem  $Q$  degenerată, pozitiv semidefinită cu signatură  $(+, 0, 0)$ , deoarece se poate rescrie

$$Q(x) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) = 2(x_1 + x_2 + x_3)^2.$$

c) Notând  $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , avem  $M = [B_0] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2U - I_3$ . Dar  $U^{k+1} = 3U^k$ ,  $\forall k \geq 1$  iar  $UI_3 = I_3U = U$ , deci pentru  $n \geq 1$  putem utiliza binomul lui Newton,

$$\begin{aligned} M^n &= (2U - I_3)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (2U)^{n-k} (-I_3)^k = \sum_{k=0}^{n-1} [C_n^k (2U)^{n-k} (-I_3)^k] + (-I_3)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} [C_n^k 2^{n-k} (-1)^k U^{n-k}] + (-1)^n I_3 = \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k 2^{n-k} (-1)^k 3^{n-k-1} U + (-1)^n I_3 \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k 6^{n-k} (-1)^k U + (-1)^n I_3 = \frac{1}{3} \{ [\sum_{k=0}^n C_n^k 6^{n-k} (-1)^k] - C_n^n (-1)^n \} U + (-1)^n I_3 \\ &= \frac{1}{3} \{ [6 + (-1)]^n - (-1)^n \} U + (-1)^n I_3 = \frac{1}{3} [5^n - (-1)^n] U + (-1)^n I_3. \end{aligned}$$

Pentru  $n = 2012$ , obținem  $M^{2012} = \underbrace{\frac{1}{3}(5^{2012} - 1)}_{\alpha} U + I_3 = \begin{pmatrix} 1+\alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1+\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1+\alpha \end{pmatrix}$ .

**III.** a) Punctele critice se obțin ca soluții ale sistemului

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2xy(1+x) = 0 \\ x^2(1+3y) = 0. \end{cases}$$

Se obțin soluțiile  $(0, y)$ ,  $\forall y \in \mathbb{R}$  și  $(-1, -\frac{1}{3})$ .

Cum  $d^2f(0, y) = 2ye^{3y}dx^2$ , rezultă că, dacă  $y > 0$ , punctul  $(0, y)$  este punct de minim local al funcției, dacă  $y < 0$ , punctul  $(0, y)$  este punct de maxim local al funcției, iar  $(0, 0)$  nu este punct de extrem.

Pentru  $(-1, -\frac{1}{3})$ , avem  $d^2f(-1, -\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}e^{-3}dx^2 + 3e^{-3}dy^2 > 0$ , de unde acesta este punct de minim local pentru  $f$ .

b) Rezultă imediat din faptul că  $(-1, -\frac{1}{3})$  este punct de minim local al funcției și  $f(-1, -\frac{1}{3}) = -\frac{1}{3}e^{-3}$ .

c) Presupunem că funcția admite un punct de extrem global. Avem astfel 3 posibilități:

1) Dacă acesta ar fi punctul  $(0, y)$ ,  $y > 0$ , atunci ar trebui ca  $f(x, y) \geq f(0, y) = 0$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}$ , ceea ce este evident fals, este suficient să alegem un  $y$  negativ.

2) Dacă acesta ar fi punctul  $(0, y)$ ,  $y < 0$ , atunci ar trebui ca  $f(x, y) \leq f(0, y) = 0$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}$ , din nou fals.

3) Dacă  $(-1, -\frac{1}{3})$  ar fi punct de minim global, atunci ar trebui să aibă loc inegalitatea  $f(x, y) \geq f(-1, -\frac{1}{3}) = -\frac{1}{3}e^{-3}$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}$ . Pentru a demonstra contrariul, alegem  $x = \frac{a}{2}$ ,  $y = -\frac{a}{3}$ ,  $a > 0$ . Avem deci  $\frac{a^3}{4} \leq e^{-3}$ ,  $\forall a > 0$ , ceea ce este evident fals.

**IV.** a) Folosim inducția matematică. Avem de demonstrat inegalitatea strictă  $\frac{\sqrt{a_1} \cdot a_{2n+1}}{\sqrt{a_{2n+1}} \cdot a_{2n+2}} < \frac{\sqrt{a_1}}{\sqrt{a_{2n+3}}}$ , sau, echivalent,  $a_{2n+1}a_{2n+3} < a_{2n+2}^2$ . Fiind vorba de o progresie aritmetică de rație  $r > 0$ , relația este adevarată.

b) Notăm  $u_n = \frac{a_1 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_{2n}}$ . Folosind punctul a) și notând cu  $r > 0$  rația progresiei, avem  $0 < u_n < \sqrt{\frac{a_1}{a_{2n+1}}} = \frac{\sqrt{a_1}}{\sqrt{a_1 + 2nr}}$ , deci folosind criteriul cleștelui,

rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ . Atunci obținem:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_{2n-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_{2n}} \cdot \frac{1}{a_{2n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_1 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_{2k-1}}{a_2 \cdot a_4 \cdot \dots \cdot a_{2k}} \cdot \frac{1}{a_{2k+2}} \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{r} (u_k - u_{k+1}) = \frac{1}{r} \lim_{n \rightarrow \infty} (u_1 - u_{n+1}) = \frac{1}{r} (u_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}) \\ & = \frac{1}{r} u_1 = \frac{1}{r} \cdot \frac{a_1}{a_3} \cdot \frac{1}{a_5}. \end{aligned}$$

c) Folosim criteriul Raabe-Duhamel. Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nr}{a_1 + 2nr} = \frac{1}{2} < 1,$$

deci seria este divergentă.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil teoretic, 2012-2013

**I.**  $Av, \dots, A^{n-1}v$  sunt vectori proprii pentru  $A^n$ . Notând  $P = [v, Av, \dots, A^{n-1}v]$ , matricea  $P$  este inversabilă și are loc egalitatea  $A^n P = \lambda P$ .

**II.** Oricare ar fi  $\alpha$  din  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , funcția  $f_\alpha(x) = f(\alpha + x) - f(x)$  este constantă. Oricare ar fi  $\alpha$  din  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  și oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$ , are loc  $f(x + \alpha) - f(\alpha) = f(x) - f(0)$ . Funcția  $x \rightarrow f(x) - f(0)$  satisfacă ecuația funcțională a lui Cauchy, iar  $f$  continuă implică  $f(x) - f(0) = ax$ , oricare ar fi  $x$  din  $\mathbb{R}$ . Obținem  $f(x) = ax + b$  cu  $a \in \mathbb{Q}$  și  $b \in \mathbb{R}$ .

**III.** Notând cu  $\mu_A$  polinomul minimal al lui  $A$ , avem  $\mu_A | x^{2^k} + 1$ . Polinomul  $x^{2^k} + 1$  este ireductibil iar  $\mu_A = x^{2^k} + 1$ . Notând cu  $P_A$  polinomul caracteristic al lui  $A$ , avem  $P_A = (x^{2^k} + 1)^r$ , iar  $n = 2^k r \geq 2^k$ .

**IV.** Notăm  $I_n = \int_0^1 \frac{n^2 x^2 - [nx]^2}{(1+x^2)(1+[nx]^2)} dx$  și  $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} I_n$ . Cu schimbarea de variabilă  $nx = t$  se obține  $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} J_n$ , unde  $J_n = \int_1^n \frac{t^2 - [t]^2}{(n^2 + t^2)(1+[t]^2)} dt$ .

Se observă că  $J_n = \sum_{k=1}^{n-1} J_{n,k}$ , unde  $J_{n,k} = \int_k^{k+1} \frac{t^2 - k^2}{(n^2 + t^2)(k^2 + 1)} dt$  și

$$J_{n,k} > \frac{1}{(k+1)(n^2 + (k+1)^2)} > \int_{k+1}^{k+2} \frac{dt}{t(n^2 + t^2)}.$$

Au loc relațiile

$$\frac{n^2}{\ln n} J_n > \frac{1}{\ln n} \left( \ln \frac{n+1}{\sqrt{2n^2 + 2n + 1}} - \ln 2 + \ln \sqrt{n^2 + 4} \right); \quad (21)$$

$$J_{n,k} < \frac{1}{k(n^2 + k^2)} + \frac{1}{3k^2(n^2 + k^2)} < \int_{k-1}^k \frac{dt}{t(n^2 + t^2)} + \int_{k-1}^k \frac{dt}{3t^2(n^2 + t^2)}.$$

De asemenea, are loc relația

$$\frac{n^2}{\ln n} J_n < \frac{\ln \sqrt{n^2 + 1}}{\ln n} + \frac{5}{2 \ln n} + \frac{1}{n \ln n} \operatorname{arctg} \frac{1}{n}. \quad (22)$$

Din (21) și (22) rezultă  $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\ln n} J_n = 1$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul I, profil electric, 2012-2013

**I.** La momentul arbitrar  $t$ , vectorii de poziție ai punctelor  $M_1(t)$  și  $M_2(t)$  sunt:  $\bar{r}_{M_1} = \bar{r}_{A_1} + t\bar{v}_1$ ,  $\bar{r}_{M_2} = \bar{r}_{B_1} + t\bar{v}_2$ . Deci punctele  $M_1$  și  $M_2$  au coordonatele:  $M_1(t) = (t, t, t)$ ,  $M_2(t) = (1+t, t, -t)$ . Un punct arbitrar de pe dreapta  $M_1M_2$  are vectorul de poziție de forma  $\bar{r} = (1-s)\bar{r}_{M_1} + s\bar{r}_{M_2}$ ,  $s \in \mathbb{R}$ . Deci punctele suprafeței  $S$  au coordonatele  $(x, y, z)$  date prin relațiile:

$$S : \begin{cases} x = (1-s)t + s(1+t) \\ y = (1-s)t + st \\ z = (1-s)t - st \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t + s \\ y = t \\ z = t - 2st, \quad t, s \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

(ecuațiile parametrice). Din primele două relații obținem  $t = y$  și  $s = x - y$  care introduc în a treia dău ecuația implicită

$$S : z = y - 2y(x - y) \Leftrightarrow 2y^2 - 2xy + y - z = 0,$$

care este ecuația unei cuadrice. Matricea formei pătratice asociate,  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , are valorile proprii  $\lambda_1 = 1 + \sqrt{2} > 0$ ,  $\lambda_2 = 1 - \sqrt{2} < 0$  și  $\lambda_3 = 0$ . Matricea extinsă a coeficienților are determinantul  $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \neq 0$ , deci fiind nesingulară, suprafața  $S$  este o cuadică nedegenerată. Rezultă că  $S$  este un paraboloid hiperbolic.

**II.** Notăm cu  $n = \dim V$ . Fie  $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  o bază în  $V$ . Fie  $A$  matricea  $n \times n$  asociată formei biliniare  $F$  în raport cu baza  $B$ , cu elementele  $a_{ij} = F(e_i, e_j)$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ . Fie  $T_A$  un operator liniar  $T_A : E \rightarrow E$ , astfel încât în  $B$  are matricea  $A$ , deci  $T_A(x) = A \cdot X$ ,  $\forall X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$ , unde  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  sunt coeficienții lui  $x \in V$  relativ la baza  $B$ . Avem  $T_A(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ji} e_j = \sum_{j=1}^n F(e_i, e_j)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Atunci  $T_A(x) = \sum_{j=1}^n F(x, e_j) e_j$ ,  $x \in V$ . Prin urmare  $V_1 = \operatorname{Ker}(T_A)$ . Analog,  $V_2 = \operatorname{Ker}(T_{A^t})$ , unde  $A^t$  este transpusa matricii  $A$ . Din teorema rangului și din relațiile  $\dim \operatorname{Im}(T_A) = \operatorname{rang}(A)$  și  $\dim \operatorname{Im}(T_{A^t}) = \operatorname{rang}(A^t)$ , obținem

$$\dim V_1 = \dim V - \dim \operatorname{Im}(T_A), \quad \dim V_2 = \dim V - \dim \operatorname{Im}(T_{A^t}).$$

Cum însă  $\text{Im } (T_A) = \text{Im } (T_{A^t})$ , rezultă  $\dim V_1 = \dim V_2$ .

**III.** a) Un calcul simplu arată că

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \dots = \int_0^1 (x^n - x^{n+1} + x^{n+2} - \dots) dx = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

b) Notând  $S = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \dots \right)^2$ , obținem:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \right) \left( \int_0^1 \frac{y^n}{1+y} dy \right) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \right) dxdy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)(1-xy)} dxdy = \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left( \int_0^1 \frac{1}{(1+y)(1-xy)} dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left( \frac{\ln 2 - \ln(1-x)}{(1+x)} \right) dx = \left( \frac{(1-x) \ln(1-x)}{2(1+x)} + \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{\ln 2}{1+x} \right) \Big|_0^1 \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

**IV.** Fie  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  fixat. Din condiția dată rezultă  $f(x+\alpha) - f(x) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \forall x \in \mathbb{R}$ . Deci putem considera funcția continuă  $g_\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g_\alpha(x) = f(x+\alpha) - f(x)$ . Aceasta ia valori doar în mulțimea numerelor iraționale. Din continuitate rezultă că această funcție este constantă, deci  $g_\alpha(x) = g_\alpha(0), \forall x \in \mathbb{R}$ , ceea ce este echivalent cu relația

$$f(x+\alpha) - f(x) = f(\alpha) - f(0), \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \quad (23)$$

Pentru  $x_0$  fixat și  $\alpha$  variabil în  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , rezultă relația

$$f(x_0 + \alpha) - f(x_0) = f(\alpha) - f(0). \quad (24)$$

Funcția  $h_{x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h_{x_0}(\alpha) = f(x_0 + \alpha) - f(\alpha)$ , este continuă pe  $\mathbb{R}$  și constantă pe  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , deci constantă pe  $\mathbb{R}$ . Astfel relația (24) are loc pentru orice  $\alpha \in \mathbb{R}$  deci și (23) are loc pentru orice  $x \in \mathbb{R}$  și  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Avem de determinat funcțiile  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , care satisfac relația

$$f(x+y) - f(x) = f(y) - f(0), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Funcția  $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A(x) = f(x) - f(0)$  verifică ecuația lui Cauchy  $A(x+y) = A(x) + A(y)$ ,  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  în care soluțiile continue sunt  $A(x) = ax$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Deci  $f(x) = ax + b$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ , cu care revenind obținem  $a(x-y) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ,  $\forall x-y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , care are loc d.n.d.  $a \in \mathbb{Q}$  (deoarece dacă prin absurd  $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , atunci pentru  $x-y = \frac{1}{a} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , obținem  $a(x-y) = a \cdot \frac{1}{a} = 1 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  și deci  $a(x-y) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , ceea ce contrazice ipoteza). În concluzie  $f(x) = ax + b$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{Q}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2012-2013

**I. a)** Avem  $\frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n-1}}{2n-1}$ ,  $|t| < 1$ , deci mulțimea de convergență a seriei este  $(-1, 1)$ .

b) Obținem  $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \frac{1}{(2x+1)^{2k}}$ .

c) Au loc relațiile

$$f(x) < \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2x+1)^{2k}} = \frac{1}{3} \frac{1}{(2x+1)^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{(2x+1)^2}} = \frac{1}{3} \frac{1}{4x^2 + 4x} = \frac{1}{12} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right),$$

deci  $f(x+n) < \frac{1}{12} \left( \frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+n+1} \right)$ . Prin urmare,

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(x+n) < \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{x+n} - \frac{1}{x+n+1} \right) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{x},$$

și deci  $\sum_{n=0}^{\infty} f(x+n) < \frac{1}{12x}$ ,  $x > 0$ .

**III.** a) Interiorul domeniului este  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ . Avem un singur punct critic  $(0, 0)$ , care nu este punct de extrem local. Pentru punctele de extrem local pe frontiera domeniului (problema de extrem cu legătura  $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ ) considerăm lagrangianul

$$\Phi(x, y, \lambda) = x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4 + \lambda(x^2 + y^2 - 1),$$

iar anularea componentelor gradientului conduce la sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \equiv 2x + 2\sqrt{3}y + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} \equiv 2\sqrt{3}x - 2y + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} \equiv x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

cu soluțiile  $\lambda \in \{\pm 2\}$ . Pentru  $\lambda = 2$ , obținem punctele de minim  $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$  și  $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ , cu valoarea asociată  $f(\pm \frac{1}{2}, \mp \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2$ . Pentru  $\lambda = -2$ , obținem punctele de maxim  $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$  și  $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ , cu valoarea asociată  $f(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \pm \frac{1}{2}) = 6$ . Avem deci dubla inegalitate  $2 \leq f(x, y) \leq 6$ , pentru orice  $(x, y) \in \bar{D}$ .

*Altfel.* Pentru  $x^2 + y^2 = 1$  luăm  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$ ,  $t \in [0, 2\pi]$  și considerăm funcția  $g(t) = f(\cos t, \sin t) = \cos^2 t + 2\sqrt{3}\sin t \cos t - \sin^2 t + 4$ , care se poate scrie

$$g(t) = \cos 2t + \sqrt{3}\sin 2t + 4 = 2\cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right) + 4 \in [2, 6].$$

b) Se observă că mulțimea căutată este cea a punctelor pentru care  $f(x, y) = 0$  și  $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$ , deci este formată din soluțiile sistemului

$$\begin{cases} x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4 = 0 \\ y \neq \sqrt{3}x. \end{cases}$$

Dar dreapta  $y = \sqrt{3}x$  nu întâlnește hiperbola  $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4 = 0$ , și deci mulțimea căutată este hiperbola  $M = \{(x, y) \mid x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4 = 0\}$ . Prin derivare, obținem  $y' = -\frac{x + \sqrt{3}y}{\sqrt{3}x - y} = \frac{x + \sqrt{3}y}{y - \sqrt{3}x}$ . Punctele critice ale funcției implicate verifică sistemul

$$\begin{cases} x + \sqrt{3}y = 0 \\ x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 4 = 0. \end{cases}$$

Obținem soluțiile  $(-\sqrt{3}, 1)$  și  $(\sqrt{3}, -1)$ , iar  $y(-\sqrt{3}) = 1$  și  $y(\sqrt{3}) = -1$ . Derivând  $y'$ , rezultă  $y'' = \frac{(1 + \sqrt{3}y')(y - \sqrt{3}x) - (x + \sqrt{3}y)(y' - \sqrt{3})}{(y - \sqrt{3}x)^2}$  și deci

$$\begin{cases} y''(-\sqrt{3}) = \frac{1 + \sqrt{3} \cdot 0)(1 + 3) - 0}{(1 + 3)^2} = \frac{1}{4} > 0 \\ y''(\sqrt{3}) = \frac{1 + \sqrt{3} \cdot 0)(-1 - 3) - 0}{(-1 - 3)^2} = -\frac{1}{4} < 0, \end{cases}$$

de unde  $(-\sqrt{3}, 1)$  este punct de minim, iar  $(\sqrt{3}, -1)$  este punct de maxim.

**III.** a) Identificând coeficienții matriceali ai parametrilor  $a, b \in \mathbb{R}$  din egalitatea  $M = aA + bB$ , obținem  $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -\sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & \sin \theta \end{pmatrix}$  care satisfac egalitățile  $A^2 = B^2 = I_2$  și  $AB + BA = O_2$ .

b) Prin calcul direct, rezultă  $M^{2n} = (a^2 + b^2)^n I_2$  și  $M^{2n+1} = (a^2 + b^2)^n M$ .

c) Notăm  $\alpha = (a^2 + b^2)^n$  și  $N_k = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \cdot \frac{1}{k} M^k$ . Atunci

$$\begin{aligned} N_k &= \left( M + \frac{1}{3}M^3 + \frac{1}{5}M^5 + \dots + \frac{1}{2n-1}M^{2n-1} \right) - \left( \frac{1}{2}M^2 + \frac{1}{4}M^4 + \dots + \frac{1}{2n}M^{2n} \right) \\ &= \left( \alpha + \frac{\alpha^3}{3} + \frac{\alpha^5}{5} + \dots + \frac{\alpha^{2n-1}}{2n-1} \right) M - \left( \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^4}{4} + \dots + \frac{\alpha^{2n}}{2n} \right) I_2, \end{aligned}$$

$$\text{deci } \lim_{n \rightarrow \infty} N_k = \ln \sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}} M - \ln \frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} I_2.$$

**IV.** a) Dacă dreapta  $D$  are ecuația vectorială  $\bar{r} = \bar{r}_1 + t\bar{d}_1$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , unde  $\bar{r}_1$  este vectorul de poziție al unui punct de pe dreapta și  $\bar{d}_1$  este vectorul director al dreptei  $D$ , atunci distanța de punctul  $M(x, y, z)$  al cărui vector de poziție este  $\bar{r}_M = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$ , se poate calcula folosind formula:  $d(M, D) = \frac{\|(\bar{r} - \bar{r}_1) \times \bar{d}_1\|}{\|\bar{d}_1\|}$ .

Pentru dreapta  $D_1$  avem  $\bar{r}_1 = \bar{0}$ ,  $\bar{d}_1 = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ , iar pentru dreapta  $D_2$ , avem  $\bar{r}_2 = \bar{i}$ ,  $\bar{d}_2 = \bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ . Obținem  $\|\bar{d}_1\| = \|\bar{d}_2\| = \sqrt{3}$ , iar condiția  $d(M, D_1) = d(M, D_2)$  devine  $\|(\bar{r} - \bar{r}_1) \times \bar{d}_1\| = \|(\bar{r} - \bar{r}_2) \times \bar{d}_2\|$ . Vectorii din relație sunt

$$(\bar{r} - \bar{r}_1) \times \bar{d}_1 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (y - z)\bar{i} + (z - x)\bar{j} + (x - y)\bar{k}$$

$$(\bar{r} - \bar{r}_2) \times \bar{d}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x-1 & y & z \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-y - z)\bar{i} + (z + x - 1)\bar{j} + (x - y - 1)\bar{k}.$$

Din egalarea normelor celor doi vectori rezultă ecuația carteziană implicită căutată  $S : 2yz + 2zx - 2x + y + 1 = 0$ .

b) Ecuația căutată este  $X^t \cdot (A + A^t) \cdot X - 32 = 0$ . Avem  $A + A^t = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Prin calcul direct, obținem ecuația  $4x^2 + 8y^2 + 2z^2 - 32 = 0$ , care se rescrie  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} - 1 = 0$ . Se determină proiecția  $C_0$  pe planul orizontal  $xOy$  a centrului de simetrie  $C$  al elipsei  $\Gamma$  de intersecție dintre elipsoidului obținut anterior  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} - 1 = 0$  și planul  $x + y + z - 2 = 0$ . Eliminând  $z$  din sistemul format, rezultă centrul elipsei suport a cilindrului eliptic care conține  $\Gamma$ ,  $C_0(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, 0)$ . Centrul  $C$  satisfacă ecuația planului și are coordonatele  $(x, y)$  identice cu ale proiecției  $C_0$ , de unde rezultă  $C(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, \frac{8}{7})$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil teoretic, 2013-2014

**I.** Fie mulțimea  $E_f = \{x \in I \mid f(x) = 0, f'(x) \neq 0\}$ . Funcția  $g$  este derivabilă pe  $I \setminus E_f$ . Construim o familie de mulțimi  $(A_x)_{x \in E_f}$  de intervale deschise cu proprietățile  $x \in A_x$ ,  $A_x \cap A_y = \emptyset$ ,  $\forall x \neq y$ . Funcția  $x \in E_f \rightarrow q_x \in A_x \cap \mathbb{Q}$  este injectivă, deci mulțimea  $E_f$  este cel mult numărabilă.

**II.** Descompunând  $2014 = 2 \cdot 19 \cdot 53$  și  $2, 19, 53$  fiind numere prime, rezolvarea ecuației în  $\mathbb{Z}_{2014}$  este echivalentă cu rezolvarea ecuației în  $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_{19}, \mathbb{Z}_{53}$ , deci ecuația are 3 soluții.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil electric, 2013-2014

**I.** Restricția lui  $f$  la  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  este o funcție de clasă  $\mathcal{C}^1$ . Un eventual punct de extrem este fie punct critic, fie  $(0, 0)$ . Din

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -e^{-x-y} + a \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -e^{-x-y} + a \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0, \end{cases}$$

rezultă  $x = y \neq 0$  și  $e^{-2x} = \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{x}{|x|}$ , și deci  $x = y > 0$ ,  $e^{-2x} = \frac{a}{\sqrt{2}}$ . Apar două cazuri:  $a < \sqrt{2}$  și  $a \geq \sqrt{2}$ .

Cazul I:  $a \geq \sqrt{2}$ . Nu avem puncte critice, deci doar  $(0, 0)$  poate fi punct de extrem local. Cum  $f(x, y) = e^{-x-y} + \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2} + (a - \sqrt{2})\sqrt{x^2 + y^2}$ , folosind inegalitatea din enunț și  $\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2} \geq |x+y|$ , obținem  $f(x, y) \geq 1 - x - y + |x+y| + 0 \geq 1 = f(0, 0)$ , deci  $(0, 0)$  este punct de minim global.

Cazul II:  $a < \sqrt{2}$ . Avem un punct critic  $(c, c)$ , cu  $c = \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{2}}{a} > 0$ . Eventuale puncte de extrem nu pot fi decât  $(c, c)$  sau  $(0, 0)$ . Cum  $a = e^{-2c}\sqrt{2}$ , putem scrie

$$f(x, y) = e^{-2c}(e^{2c-x-y} + \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2})$$

și folosind inegalitatea sugerată și  $\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2} \geq |x + y|$ , obținem

$$f(x, y) \geq e^{-2c}(1 + 2c - x - y + |x + y|) \geq e^{-2c}(1 + 2c) = f(c, c),$$

deci  $(c, c)$  este punct de minim global.

Pe de altă parte, arătăm că  $(0, 0)$  nu este punct de extrem local. Avem egalitatea  $f(x, x) - f(0, 0) = e^{-2x} + a\sqrt{2}|x| - 1$ . Dacă  $x < 0$ , evident  $f(x, x) - f(0, 0) > 0$ , deci  $(0, 0)$  nu poate fi punct de maxim local. Dacă  $x > 0$ , atunci

$$f(x, x) - f(0, 0) = e^{-2x} + a\sqrt{2}x - 1 = x \left( \frac{e^{-2x} - 1}{x} + a\sqrt{2} \right).$$

Deoarece  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{-2x} - 1}{x} + a\sqrt{2} \right) = -2 + a\sqrt{2} < 0$ , există  $r > 0$  cu proprietatea

$$\frac{e^{-2x} - 1}{x} + a\sqrt{2} < 0, \quad \forall x \in (-r, r) \setminus \{0\},$$

de unde  $f(x, x) - f(0, 0) < 0$ ,  $\forall x \in (0, r)$ , deci  $(0, 0)$  nu poate fi nici punct de minim local pentru  $f$ .

**II. i)** Calculăm integrala folosind integrarea prin părți și obținem

$$\frac{1}{n^2}[(-1)^n(a + 2b\pi) - a] = \frac{1}{n^2}, \text{ de unde } a = -1, b = \frac{1}{2\pi}.$$

ii) Folosim formula lui Parseval  $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n^2 + b_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$ , unde  $a_0, a_n$ ,

$b_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  sunt coeficienții seriei Fourier trigonometrice ai funcției  $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ .

Dezvoltăm în serie Fourier trigonometrică funcția impară  $f(x) = x$ ,  $x \in (-\pi, \pi)$ .

$$\text{Obținem } a_0 = 0, a_n = 0 \text{ și } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) dx = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Cum  $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2\pi^2}{3}$ , din formula Parseval rezultă

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

**III.** Folosim formulele

$$4 \sin^3 x = 3 \sin x - \sin 3x, \quad \sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x.$$

Atunci  $T(f)(x) = I_1(f) \sin x + I_2(f) \cos x + I_3(f) \sin 3x + I_4(f) \cos 3x$ , unde

$$\begin{aligned} I_1(f) &= \int_0^{2\pi} 3 \cos y f(y) dy, & I_2(f) &= \int_0^{2\pi} 3 \sin y f(y) dy, \\ I_3(f) &= \int_0^{2\pi} -\cos 3y f(y) dy, & I_4(f) &= \int_0^{2\pi} -\sin 3y f(y) dy. \end{aligned}$$

a) Funcțiile  $\{\sin x, \cos x, \sin 3x, \cos 3x\}$  fiind liniar independente în  $V$ , rezultă

$$f \in \text{Ker } T \Leftrightarrow I_1(f) = I_2(f) = I_3(f) = I_4(f) = 0.$$

Alegem funcțiile  $\{\sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin 1007x, \cos 1007x\}$ , care satisfac cerințele.

b) Orice vector propriu este de forma  $f(x) = a \sin x + b \cos x + c \sin 3x + d \cos 3x$ .

Prin calcul direct, obținem

$$I_1(f) = 3\pi b, \quad I_2(f) = 3\pi a, \quad I_3(f) = -\pi d, \quad I_4(f) = -\pi c.$$

Din relația  $T(f) = \lambda f$ , cu  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  valoare proprie și  $f$  vector propriu, obținem sistemul

$$\lambda a = 3\pi b, \quad \lambda b = 3\pi a, \quad \lambda c = -\pi d, \quad \lambda d = -\pi c.$$

Rezultă  $(\lambda^2 - 9\pi^2)ab = 0$  și  $(\lambda^2 - \pi^2)cd = 0$ . Dacă  $\lambda \notin \{\pm\pi, \pm 3\pi\}$ , rezultă  $f = 0$ , care nu convine. Atunci  $\lambda_1 = \pi$ ,  $\lambda_2 = -\pi$ ,  $\lambda_3 = 3\pi$ ,  $\lambda_4 = -3\pi$  cu vectorii proprii corespunzători

$$\begin{aligned} f_1(x) &= a(\sin 3x - \cos 3x), & f_2(x) &= a(\sin 3x + \cos 3x), \\ f_3(x) &= a(\sin x + \cos x), & f_4(x) &= a(\sin x - \cos x), \end{aligned} \quad a \in \mathbb{R}^*.$$

**IV.** Vom nota cu  $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$  matricea diagonală care are coeficienții  $a_1, a_2, \dots, a_n$  pe diagonală.

Pentru  $c$  minim,  $c = a + b - n$ , luăm  $A = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ , cu 1 considerat de  $a$  ori și  $B = \text{diag}(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$ , cu 1 considerat de  $b$  ori. Atunci, cum  $2n - a - b \leq n$ , rezultă că în matricea  $A \cdot B$  rămân  $a + b - n$  de 1 și rang  $(A \cdot B) = c$ .

Pentru  $c = a + b - n + 1$ , păstrăm matricea  $B$ , dar luăm  $A[0, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0]$ , cu 1 repetat de  $a$  ori și rang  $(A \cdot B) = c$ .

Continuăm la fel până la  $c$  maxim.

Pentru  $c = a$ ,  $A = \text{diag}(0, \dots, 0, 1, \dots, 1)$ , cu 1 repetat de  $a$  ori și cum  $a \leq b$ , rezultă că și în acest ultim caz, rang  $(A \cdot B) = c$ .

#### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul I, profil mecanic, 2013-2014

**I. a)** Se pune problema existenței derivatelor parțiale de ordin 1 ale lui  $f$  în punctul  $(0, 0)$ . Cum  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ , există aceste funcții.

b) Obținem

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sin(xy) \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Dar  $\left| \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right| \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|xy|}{|y|} = |x| \rightarrow 0$  când  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , deci  $f$  este diferențială Fréchet în  $(0, 0)$ .

c) Avem

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} y \cos(xy) \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \sin(xy) \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} x \cos(xy) \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \sin(xy) \frac{-4xy^2}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

de unde rezultă

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y - 0} = -1; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x - 0} = 1.$$

d) Seria de studiat este  $\sum_{n \geq 1} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha+\beta}}\right)}_{a_n} \frac{n^{-2\alpha+2\beta}-1}{n^{-2\alpha+2\beta}+1}$ . Dacă  $\alpha = \beta$ , atunci  $a_n = 0$  iar suma este 0, deci seria este convergentă. Dacă  $\alpha + \beta > 1$ , atunci  $\sum_{n \geq 1} |a_n| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+\beta}}$ , deci seria este absolut convergentă. Altfel, seria este divergentă.

**II.** Avem  $I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+a^2 \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x} + a^2} \frac{1}{\cos^2 x} dx$ . Cu schimbarea de variabilă  $\operatorname{tg} x = t$ , obținem  $\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1 + a^2} dt = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$ . Prin integrare, rezultă  $I(a) = \frac{\pi}{2} \ln(a + \sqrt{1+a^2}) + C$ . Din relațiile  $I(0) = \int_0^{\pi/2} 0 dx = 0$  și  $I(0) = \frac{\pi}{2} \ln(1) + C = C$ , obținem  $C = 0$ . Prin urmare  $I(a) = \frac{\pi}{2} \ln(a + \sqrt{1+a^2})$ .

**III.** a) Determinarea punctelor staționare (critice) ale funcției  $f$  conduce la rezolvarea sistemului  $\begin{cases} 1 + (x+y)(-2x) = 0 \\ 1 + (x+y)(-2y) = 0 \end{cases}$ . Obținem  $x = \pm y$ . Dacă  $x = y$ , avem soluțiile  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  și  $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ , iar când  $x = -y$ , nu avem soluții ale sistemului. Se obține  $d^2 f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})(x, y) < 0$ , deci  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  este punct de maxim local, iar  $d^2 f(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})(x, y) > 0$ , deci  $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$  este punct de minim local.

b) Punctele staționare ale funcției  $f$  cu legătura  $x^2 + y^2 = 2$  sunt  $(1, 1)$  și  $(-1, -1)$ .  $f_{\min} = -\frac{1}{\sqrt{e}}$ , iar  $f_{\max} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ . Pentru determinarea imaginii, trecem în coordonate polare  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ .  $(x, y) \in D$  duce la  $\theta \in [0, 2\pi]$ ,  $\rho \in [0, \sqrt{2}]$ . Prin urmare avem  $f(x, y) = \rho e^{-\rho^2} (\cos \theta + \sin \theta)$ . Atunci  $|f(x, y)| \leq \rho e^{-\rho^2} |\cos \theta + \sin \theta|$ . Dar  $|\cos \theta + \sin \theta| \leq \sqrt{2}$  iar  $\max_{\rho \in [0, \sqrt{2}]} \rho e^{-\rho^2}$  se atinge pentru  $\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}$  și este  $\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}}$ . Așadar  $|f(x, y)| \leq \frac{1}{\sqrt{e}}$  și imaginea cerută este  $[-\frac{1}{\sqrt{e}}, \frac{1}{\sqrt{e}}]$ .

**IV.** a) Obținem  $d(A, \pi) = \frac{4}{3} = r_1$  și  $d(B, \pi) = \frac{2}{3} = r_2$ , iar distanța dintre centre este  $d(A, B) = \sqrt{4 + 36 + 4} = 2\sqrt{11} > r_1 + r_2$ , deci sferele sunt exterioare.

b) Punctul căutat  $C$  se află la intersecția planului  $\pi$  cu dreapta  $AQ$ , unde  $Q$  este simetricul punctului  $B$  față de planul  $\pi$ . Avem  $CB = CQ$ , pentru un punct arbitrar  $M \in \pi$  avem  $MB = MQ$ , iar din inegalitatea triunghiului,  $AQ \leq AM + MQ$ . Folosind aceste relații, obținem

$$AM + MB = AM + MQ \leq AQ = AC + CQ = AC + CB,$$

decă  $C$  este punctul care minimizează suma  $AM + MB$  pentru  $M \in \pi$ . Determinăm punctul  $C$ . În prealabil aflăm proiecția  $P$  a lui  $B$  pe planul  $\pi$ ,  $\{P\} = \pi \cap d$ , unde  $d$  este dreapta ce trece prin  $B$  și are direcția care este normală la  $\pi$ ,  $\vec{n} \equiv (2, 1, -2)$ , decă

$P$  este soluția sistemului:

$$P : \begin{cases} 2x + y - 2z + 5 = 0 \\ \frac{x-0}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4/9 \\ y = 7/9 \\ z = 22/9. \end{cases}$$

Simetricul  $Q$  al lui  $B$  față de  $\pi$  este simetricul lui  $B$  față de punctul  $P$ . Se observă că  $P$  înjumătățește segmentul  $BQ$ , deci coordonatele lui  $P$  sunt semisumele coordonatelor lui  $B$  și  $Q$ . Atunci avem

$$Q : \begin{cases} x_P = (x_B + x_Q)/2 \\ y_p = (y_B + y_Q)/2 \\ z_P = (z_B + z_Q)/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_Q = 2x_p - x_B = -8/9 \\ y_Q = 2y_P - y_B = 5/9 \\ z_Q = 2z_P - z_B = 26/9. \end{cases}$$

Punctul căutat  $C$  se află la intersecția lui  $\pi$  cu dreapta  $AQ$ , unde  $A(2, -5, 0)$ ,  $Q(-\frac{8}{9}, \frac{5}{9}, \frac{26}{9})$ ,  $\overline{AQ} \equiv (-\frac{26}{9}, \frac{50}{9}, \frac{26}{9}) \parallel (13, -25, -13)$ , deci

$$C : \begin{cases} 2x + y - 2z + 5 = 0 \\ \frac{x-2}{13} = \frac{y+5}{-25} = \frac{z-0}{-13} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2/27 \\ y = -35/27 \\ z = 52/27, \end{cases}$$

deci punctul  $M \in \pi$  în care se atinge minimul distanței  $AM + MB$  este  $C(\frac{2}{27}, -\frac{35}{27}, \frac{52}{27})$ .

**V.** a) Avem  $\langle \vec{u}, \vec{v} \times \vec{w} \rangle = \frac{3}{2} = 2\langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle$ , deci volumul cerut este  $\frac{3}{4}$ .

b) Cum  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$  sunt trei vectori liberi necoplanari, rezultă că ei formează o bază. Matricea endomorfismului în această bază este  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Valorile proprii sunt  $\{2, -1, -1\}$ , iar vectorii proprii corespunzători,  $\{(1, 1, 1), (1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$ . Deci  $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$  este vector propriu al endomorfismului și  $T^{2014}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 2^{2014}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ .

## Rezolvări

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2001-2002

**I.** a) Avem  $\operatorname{Im} f \stackrel{\text{not}}{=} Y(x, y) = e^x \sin y$ . Cum  $\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = 0$ , rezultă că  $Y$  este funcție armonică.

$$f'(z) = \frac{\partial Y}{\partial y} + i \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} = e^x \cos y + i \cdot e^x \sin y,$$

iar pentru  $y = 0$ ,  $f'(x) = e^x \Rightarrow f(x) = e^x + C \Rightarrow f(z) = e^z + C$ . Din  $f(0) = 1$ , rezultă  $1 + C = 1 \Rightarrow C = 0$ . Funcția olomorfă căutată este  $f(z) = e^z$ .

b)  $\operatorname{Re} f \stackrel{\text{not}}{=} X(x, y) = \varphi(x^2 + y^2)$ . Notăm  $t(x, y) = x^2 + y^2$ . Atunci:

$$\begin{aligned} \frac{\partial X}{\partial x} &= \varphi'(t) \frac{\partial t}{\partial x} = \varphi'(t)2x, & \frac{\partial X}{\partial y} &= \varphi'(t) \frac{\partial t}{\partial y} = \varphi'(t)2y, \\ \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} &= \varphi''(t)4x^2 + \varphi'(t)2, & \frac{\partial^2 X}{\partial y^2} &= \varphi''(t)4y^2 + \varphi'(t)2, \end{aligned}$$

de unde  $\Delta X = 4(x^2 + y^2)\varphi''(t) + 4\varphi'(t)$ . Impunem  $\Delta X = 0$  și obținem

$$t\varphi''(t) + \varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{1}{t} \Rightarrow \ln \varphi'(t) = -\ln t + \ln C_1, C_1 > 0,$$

deci  $\varphi'(t) = \frac{C_1}{t} \Rightarrow \varphi(t) = C_1 \ln t + C_2, C_2 \in \mathbb{R}$ . Dacă

$$X(x, y) = C_1 \ln(x^2 + y^2) + C_2, C_1 > 0, C_2 \in \mathbb{R},$$

atunci  $X$  este funcție armonică. Avem

$$f'(z) = \frac{\partial X}{\partial x} - i \frac{\partial X}{\partial y} = C_1 \frac{2x}{x^2 + y^2} - iC_2 \frac{2y}{x^2 + y^2},$$

iar pentru  $y = 0$ , rezultă

$$f'(x) = C_1 \frac{2}{x} \Rightarrow f(x) = 2C_1 \ln x + C_3, C_3 \in \mathbb{R} \Rightarrow f(z) = 2C_1 \ln z + C_3.$$

**II.** a) Căutăm  $A, B \in \mathbb{C}$  astfel încât  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 1} \equiv \frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z + 1}$ ,  $A, B \in \mathbb{C}$ .

Obținem  $A = \frac{1}{2}$ ,  $B = -\frac{1}{2}$ , deci  $f(z) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right)$ .

i) Dacă  $0 < |z - 1| < 2$ , atunci

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{(z-1)+2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2(\frac{z-1}{2}+1)} \right) \stackrel{|z-1|<2}{=} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{z-1}{2} + \left( \frac{z-1}{2} \right)^2 - \left( \frac{z-1}{2} \right)^3 + \dots + (-1)^n \cdot \left( \frac{z-1}{2} \right)^n + \dots \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{4} + \frac{z-1}{2^3} - \frac{(z-1)^2}{2^4} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{(z-1)^n}{2^{n+2}} + \dots . \end{aligned}$$

ii) Dacă  $|z - 1| > 2$ , atunci

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{(z-1)+2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{(z-1)(1+\frac{2}{z-1})} \right) \stackrel{|z-1|>2}{=} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-1} \left( 1 - \frac{2}{z-1} + \left( \frac{2}{z-1} \right)^2 - \left( \frac{2}{z-1} \right)^3 + \dots + (-1)^n \cdot \left( \frac{2}{z-1} \right)^n + \dots \right) \right] = \\ &= \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{2}{(z-1)^3} + \frac{2^2}{(z-1)^4} - \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{2^{n-1}}{(z-1)^{n+1}} + \dots . \end{aligned}$$

iii) Dacă  $|z| < 1$ , atunci

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) \stackrel{|z|<1}{=} \\ &= \frac{1}{2} [(-1 - z - z^2 - \dots - z^n - \dots) - (1 - z + z^2 - z^3 + \dots + (-1)^n \cdot z^n + \dots)] = \\ &= \frac{1}{2} (-2 - 2z^2 - 2z^4 - \dots - 2z^{2n} - \dots) = -1 - z^2 - z^4 - \dots - z^{2n} - \dots . \end{aligned}$$

b)  $I_1 = \int_{|z|=R>0} \frac{z}{z^2-1} dz$ . Multimea punctelor din planul complex asociate relației  $|z| = R$ , formează cercul  $\mathcal{C}((0,0), R)$ . Se disting trei cazuri:

i)  $R \in (0, 1) \Rightarrow I_1 = 0$  (conform teoremei fundamentale Cauchy).

ii)  $R = 1 \Rightarrow I_1 = \pi i \left[ \operatorname{Rez} \left( \frac{z}{z^2-1}, -1 \right) + \operatorname{Rez} \left( \frac{z}{z^2-1}, 1 \right) \right] = \pi i \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \pi i$ .

iii)  $R > 1 \Rightarrow I_1 = 2\pi i \left[ \operatorname{Rez} \left( \frac{z}{z^2-1}, -1 \right) + \operatorname{Rez} \left( \frac{z}{z^2-1}, 1 \right) \right] = 2\pi i$ .

Calculăm  $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \sin x} dx$ . Facem schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$ ; rezultă:

$$I_2 = \int_{|z|=1} \frac{1}{5 + 4 \frac{z^2-1}{2iz}} \frac{1}{iz} dz = \int_{|z|=1} \frac{1}{2z^2 + 5iz - 2} dz.$$

Notăm  $g(z) = \frac{1}{2z^2 + 5iz - 2}$ ; punctele singulare ale funcției  $g$  sunt  $z_1 = \frac{-i}{2}$  și  $z_2 = -2i$ . În interiorul cercului  $|z| = 1$  este situat doar  $z_1$ . Cum acesta este pol de ordinul 1, din teorema rezidurilor rezultă

$$I_2 = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, z_1) = 2\pi i \frac{1}{3i} = \frac{2\pi}{3}.$$

#### IV. Rezolvăm problema Cauchy

$$y'' - 2y' + y = \sin(t) + 4e^{-t} + 2e^t, y(0) = 0, y'(0) = 2.$$

Aplicăm transformarea Laplace ecuației diferențiale. Obținem

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[y''] - 2\mathcal{L}[y'] + \mathcal{L}[y] &= \mathcal{L}[\sin(t)] + 4\mathcal{L}[e^{-t}] + 2\mathcal{L}[e^t] \Leftrightarrow \\ p^2\mathcal{L}[y] - 2 - 2p\mathcal{L}[y] + \mathcal{L}[y] &= \frac{1}{p^2+1} + \frac{4}{p+1} + \frac{2}{p-1} \Leftrightarrow \\ (p-1)^2\mathcal{L}[y] &= 2 + \frac{1}{p^2+1} + \frac{4}{p+1} + \frac{2}{p-1} \Leftrightarrow \\ \mathcal{L}[y] &= \underbrace{\frac{2}{(p-1)^2}}_{A(p)} + \underbrace{\frac{1}{(p-1)^2(p^2+1)}}_{B(p)} + \underbrace{\frac{4}{(p+1)(p-1)^2}}_{C(p)} + \underbrace{\frac{2}{(p-1)^3}}_{D(p)}. \end{aligned}$$

Observăm că  $A(p) = \mathcal{L}[2te^t]$  și  $D(p) = \mathcal{L}[t^2e^t]$ . Avem

$$B(p) = \frac{1}{(p-1)^2(p^2+1)} = \frac{a}{p-1} + \frac{b}{(p-1)^2} + \frac{cp+d}{p^2+1},$$

de unde obținem  $a = -\frac{1}{2}$ ,  $b = \frac{1}{2}$ ,  $c = \frac{1}{2}$ ,  $d = 0$ , deci avem

$$B(p) = \mathcal{L}\left[-\frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}te^t + \frac{1}{2}\cos t\right].$$

Analog, pentru

$$C(p) = \frac{4}{(p+1)(p-1)^2} = \frac{\alpha}{p+1} + \frac{\beta}{p-1} + \frac{\gamma}{(p-1)^2},$$

obținem  $\alpha = 1$ ,  $\beta = -1$ ,  $\gamma = 2$ , deci  $C(p) = \mathcal{L}[e^{-t} - e^t + 2te^t]$ . Atunci

$$\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[2te^t - \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}te^t + \frac{1}{2}\cos t + e^{-t} - e^t + 2te^t + t^2e^t],$$

deci  $y = -\frac{3}{2}e^t + e^{-t} + \frac{1}{2}\cos t + \frac{9}{2}te^t + t^2e^t$ .

b) Rezolvăm problema Cauchy  $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y \end{cases}$ ,  $\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 1. \end{cases}$

Aplicând transformata Laplace sistemului de ecuații diferențiale; obținem

$$\begin{cases} \mathcal{L}[x'] = -3\mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] \\ \mathcal{L}[y'] = \mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p\mathcal{L}[x] - 1 = -3\mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] \\ p\mathcal{L}[y] - 1 = \mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} (p+3)\mathcal{L}[x] + \mathcal{L}[y] = 1 \\ -\mathcal{L}[x] + (p+1)\mathcal{L}[y] = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{L}[x] = \frac{p}{(p+2)^2} \\ \mathcal{L}[y] = \frac{p+4}{(p+2)^2}. \end{cases}$$

Prin urmare,

$$\begin{cases} \mathcal{L}[x] = \frac{p}{(p+2)^2} = \frac{p+2-2}{(p+2)^2} = \frac{1}{p+2} - 2\frac{1}{(p+2)^2} = \mathcal{L}[e^{-2t} - 2te^{-2t}] \\ \mathcal{L}[y] = \frac{p+4}{(p+2)^2} = \frac{p+2+2}{(p+2)^2} = \frac{1}{p+2} + 2\frac{1}{(p+2)^2} = \mathcal{L}[e^{-2t} + 2te^{-2t}], \end{cases}$$

de unde rezultă  $x = e^{-2t}(1 - 2t)$ ,  $y = e^{-2t}(1 + 2t)$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2002-2003

**I.** a) Fie  $u(x, y) = e^x \cos y$ . Funcția  $u$  este armonică deoarece are loc egalitatea  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \equiv e^x \cos y - e^x \cos y = 0$ . Obținem  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y + ie^x \sin y$ ;  $y = 0$  implică  $f'(x) = e^x \Rightarrow f(x) = e^x + C$ ,  $C \in \mathbb{C}$ . Substituim  $x \rightarrow z$  și rezultă  $f(z) = e^z + C$ ,  $C \in \mathbb{C}$ . Egalitatea  $f(0) = 1$  implică  $C = 0$ , deci  $f(z) = e^z$ .

b) Notăm  $v(x, y) = \varphi(t(x, y))$ , unde  $t(x, y) = \frac{y}{x}$ . Împunem funcției  $v$  să fie armonică; rezultă

$$\varphi''(t) \frac{1}{x^2} \left( \frac{y^2}{x^2} + 1 \right) + \frac{2y}{x^3} \varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \varphi''(t)(t^2 + 1) = -2t\varphi'(t) \Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = \frac{-2t}{t^2 + 1}.$$

Integrând în ambii membri ai egalității, avem

$$\begin{aligned} \int \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} dt &= - \int \frac{2t}{t^2 + 1} dt \Rightarrow \ln(\varphi'(t)) = \ln(t^2 + 1) + \ln C_1, C_1 > 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \varphi'(t) &= \frac{C_1}{t^2 + 1} \Rightarrow \int \varphi'(t) dt = C_1 \int \frac{1}{t^2 + 1} dt \Rightarrow \varphi(t) = C_1 \cdot \arctg t + C_2, C_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Rezultă deci  $v(x, y) = C_1 \cdot \arctg \left( \frac{y}{x} \right) + C_2$ . Atunci

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{C_1 \cdot x}{x^2 + y^2} - i \frac{y \cdot C_2}{x^2 + y^2}.$$

Obținem succesiv

$$y = 0 \Rightarrow f'(z) = \frac{C_1}{x} \Rightarrow f(x) = C_1 \ln x + C_3; \quad x \rightarrow z \Rightarrow f(z) = C_1 \ln z + C_3, \quad C_3 \in \mathbb{C}.$$

**III. a)** Folosind egalitățile  $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n}, \forall z \in \mathbb{C}$ ;  $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$ , rezultă

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{1/z} \frac{1}{1-z} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} z^n \right) = \cdots + \frac{1}{z} \left( \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \right) + \\ &+ \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \right) + z \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots \right), \end{aligned}$$

$$\text{deci } I_1 = \int_{|z|=R} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Rez}(f, 0) = 2\pi i(e - 1).$$

$$\text{b) } I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^6 + 1} dx. \quad \text{Efectuăm întâi schimbarea de variabilă } x^3 = y \text{ (deci}$$

$$3x^2 dx = dy \text{ și obtinem } I_2 = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dy}{y^2 + 1}.$$

Fie  $g(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ . Fie  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R], R > 1$  (vezi Fig. 3).




Figura 3.

Atunci  $\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i) \Leftrightarrow \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i).$

Pentru  $R \rightarrow \infty$ , egalitatea devine:  $\underbrace{\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz}_{=0} + \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i).$

Rezultă  $\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = 2\pi i \frac{1}{2i}$ , deci  $I_2 = \frac{\pi}{3}$ .

**III.** a)  $y'' - 2y' + y = e^t \cos 2t$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 1$ . Aplicăm transformarea Laplace ecuației și notăm  $Y = \mathcal{L}[y]$ ; rezultă

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[y''](p) - 2\mathcal{L}[y'](p) + \mathcal{L}[y](p) &= \mathcal{L}[e^t \cos 2t](p) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow p^2 Y(p) - p - 1 - 2(pY(p) - 1) + Y(p) &= \mathcal{L}[\cos 2t](p - 1) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow p^2 Y(p) &= \frac{p - 1}{(p - 1)^2 + 4} \Leftrightarrow (p - 1)Y(p) = 1 + \frac{1}{(p - 1)^2 + 4}, \end{aligned}$$

deci

$$Y(p) = \frac{p^2 - 2p + 6}{(p - 1)(p^2 - 2p + 5)} = \frac{A}{p - 1} + \frac{B(p - 1) + C}{p^2 - 2p + 5} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ -2A - 2B + C = -2 \\ 5A + B - C = 6, \end{cases}$$

și deci  $A = 5/4$ ,  $B = -1/4$ ,  $C = 0$ . Rezultă

$$Y(p) = \frac{5}{4} \frac{1}{p - 1} - \frac{1}{4} \frac{p - 1}{(p - 1)^2 + 4} \Rightarrow y(t) = \frac{5}{4} e^t - \frac{1}{4} e^t \cos 2t.$$

b) Rezolvăm ecuația  $x(t) + x'(t) - 2 \int_0^t x(s) \sin(t-s) ds = \cos t + sht$ , cu condiția

$x(0) = 1$ . Deoarece  $\int_0^t x(s) \sin(t-s) ds = x(t) * \sin t$ , ecuația se rescrie  
 $x(t) + x'(t) - 2x(t) * \sin t = \cos t + sht$ .

Aplicăm transformarea Laplace ecuației și notăm  $X = L[x]$ ; obținem:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[x(t)](p) + \mathcal{L}[x'(t)](p) - 2\mathcal{L}[x(t)](p) \cdot \mathcal{L}[\sin t](p) &= \mathcal{L}[\cos t] + \mathcal{L}[sht] \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow X(p) + pX(p) - 1 - 2X(p) \frac{1}{p^2 + 1} &= \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{1}{p^2 - 1} \Rightarrow X(p) = \frac{p}{p^2 - 1} = \frac{A}{p - 1} + \frac{B}{p + 1}, \\ \text{unde } \begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B = \frac{1}{2}, \text{ și deci } X(p) &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{p-1} + \frac{1}{p+1} \right); \text{ prin urmare} \\ x(t) &= \frac{1}{2} e^t + \frac{1}{2} e^{-t} = cht. \end{aligned}$$

**IV.** a) Pentru  $n \geq 1$ , calculăm

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ax} \cdot e^{inx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{x(a+in)} dx = \frac{1}{\pi} \frac{e^{x(a+in)}}{a+in} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi(a+in)} \left( e^{x(a+in)} - e^{-x(a+in)} \right) = \frac{1}{\pi(a+in)} (e^{\pi a}(-1)^n - e^{-\pi a}(-1)^n) \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{1}{a+in} \cdot \frac{e^{\pi a} - e^{-\pi a}}{2} \cdot 2 = \frac{(-1)^n (a-in) \operatorname{sh}(\pi a) \cdot 2}{\pi(a^2+n^2)}, \end{aligned}$$

de unde rezultă  $a_n = \frac{(-1)^n \cdot a \cdot sh(\pi a) \cdot 2}{\pi(a^2 + n^2)}$ ,  $b_n = \frac{(-1)^n \cdot n \cdot sh(\pi a) \cdot 2}{\pi(a^2 + n^2)}$ . Pentru  $n = 0$ , avem

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ax} dx = \left. \frac{1}{\pi} \frac{e^{ax}}{a} \right|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi a} (e^{\pi a} - e^{-\pi a}) = \frac{2 \cdot sh(\pi a)}{\pi a}.$$

Rezultă că dezvoltarea în serie Fourier trigonometrică pentru funcția cerută este:

$$f(x) = \frac{sh(\pi a)}{\pi a} + \sum_{n \geq 1} \left[ \frac{(-1)^n \cdot a \cdot sh(\pi a) \cdot 2}{\pi(a^2 + n^2)} \cos(nx) + \frac{(-1)^{n+1} \cdot n \cdot sh(\pi a) \cdot 2}{\pi(a^2 + n^2)} \sin(nx) \right].$$

b) Pentru  $n \geq 1$ , calculăm  $a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - a \cos x}{1 - 2a \cos x + a^2} \cdot e^{inx} dx$ . Notând  $e^{ix} = z$  și folosind egalitățile obținem

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{1 - a \frac{z^2 + 1}{2z}}{1 - 2a \frac{z^2 + 1}{2z} + a^2} \cdot z^n \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{(2z - az^2 - a)z^{n-1}}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{(2z - az^2 - a)z^{n-1}}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a}$ ; funcția  $g$  are două puncte singulare  $z_1 = a$  și  $z_2 = \frac{1}{a}$ , poli de ordinul I. Dar, deoarece condiția inițială cere  $|a| < 1$ , rezultă că doar  $z_1$  este în interiorul drumului  $|z| = 1$  și  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, a)$ . Dar

$$\text{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \frac{(2z - az^2 - a)z^{n-1}}{-a(z - a)(z - \frac{1}{a})} = \frac{(2a - a^3 - a)a^{n-1}}{1 - a^2}.$$

Rezultă  $a_n + ib_n = \frac{1}{2i\pi} 2\pi i \cdot a^n = a^n$ , și deci  $a_n = a^n$ ,  $b_n = 0$ ,  $n \geq 1$ . Pentru  $n = 0$ , avem  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - a \cos x}{1 - 2 \cos x + a^2} dx$ . Notând  $e^{ix} = z$ , obținem

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{1 - a \frac{z^2 + 1}{2z}}{1 - 2a \frac{z^2 + 1}{2z} + a^2} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{-az^2 + 2z - a}{[-az^2 + z(a^2 + 1) - a] - z} dz.$$

Notăm  $g(z) = \frac{-az^2 + 2z - a}{[-az^2 + z(a^2 + 1) - a] - z}$ ; pentru  $g$ ,  $z_1 = a$  și  $z_2 = \frac{1}{a}$ ,  $z_3 = 0$  sunt poli de ordinul I și cum  $\gamma : |z| = 1$ , rezultă

$$\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i (\text{Rez}(g, a) + \text{Rez}(g, 0)).$$

Cele două reziduuri din membrul drept sunt

$$\text{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \frac{-az^2 + 2z - a}{-a(z - a)(z - \frac{1}{a}) z} = \frac{-a^3 - a}{(1 - a^2) a} = 1,$$

$$\text{Rez}(g, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-az^2 + 2z - a}{-a(z - a)(z - \frac{1}{a}) z} = \frac{-a}{-a} = 1,$$

deci  $a_0 = \frac{1}{2\pi i} 2\pi i \cdot 2 = 2$ . Prin urmare dezvoltarea cerută este  $f(x) = 1 + \sum_{n \geq 1} a^n \cos nx$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2003-2004

**I.** Vezi subiectul I.1 de la profil mecanic, faza locală, 2004-2005.

**II.** Folosind egalitatea  $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ , ecuația se rescrie:  $\cos z = 5$  și deci  $e^{iz} + e^{-iz} = 10$ . Notând  $e^{iz} = \alpha$ , obținem  $\alpha + \frac{1}{\alpha} - 10 = 0 \Leftrightarrow \alpha \in \{5 \pm 2\sqrt{6}\}$ . Distingem cazurile:

$$\text{i)} e^{iz} = 5 + 2\sqrt{6} \Rightarrow iz = \ln(5 + 2\sqrt{6}) = 5 + 2\sqrt{6} + i(0 + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}, \text{ deci } z = \frac{5+2\sqrt{6}}{i} + 2k\pi = 2k\pi - i(5 + 2\sqrt{6}), k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{ii)} e^{iz} = 5 - 2\sqrt{6} \Rightarrow iz = \ln(5 - 2\sqrt{6}) = 5 - 2\sqrt{6} + i(0 + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}, \text{ deci } z = 2k\pi - i(5 - 2\sqrt{6}), k \in \mathbb{Z}.$$

**III.**  $I = \int_{4x^2+9y^2=36} \frac{\sin z}{z^2(z^2+1)} dz$ . Ecuația carteziană a domeniului de integrare

se rescrie:  $4x^2 + 9y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ , deci se integrează pe o elipsă. Fie  $g(z) = \frac{\sin z}{z^2(z^2+1)}$ . Avem  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z^2(z^2+1)} = \lim_{z \rightarrow 0} \left( \frac{\sin z}{z} \right) \cdot \frac{1}{z(z^2+1)} = \infty$ , deci  $z_1 = 0$  este pol de ordinul 1 pentru funcția  $g$ ;  $z_2 = i$  și  $z_3 = -i$  sunt de asemenea poli de ordinul 1. Atunci  $I = 2\pi i(\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, i) + \operatorname{Rez}(g, -i))$ . Calculăm reziduurile:

$$\operatorname{Rez}(g, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z(z^2+1)} = 1, \quad \operatorname{Rez}(g, 1) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{\sin z}{z(z^2+i)} = \frac{\sin i}{(-1) \cdot 2i},$$

$$\operatorname{Rez}(g, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{\sin z}{z(z^2-i)} = \frac{\sin(-i)}{(-1) \cdot (-2i)} = \frac{\sin i}{-2i}$$

și deci

$$I = 2\pi i \left( 1 - \frac{\sin i}{2i} - \frac{\sin i}{-2i} \right) = 2\pi i - 2\pi \sin i = 2\pi \left( i - \frac{e^{-1} - e}{2i} \right) = \pi i \left( 2 + \frac{1}{e} - e \right).$$

**IV.** Avem

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 6} = \frac{1}{(z+3)(z-2)} = \frac{A}{z+3} + \frac{B}{z-2} \Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ -2A+3B=1, \end{cases}$$

deci  $A = -\frac{1}{5}$ ,  $B = \frac{1}{5}$ , și deci  $f(z) = \frac{1}{5} \left( \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+3} \right)$ . Distingem următoarele cazuri:

i)  $|z| < 2$ . Au loc dezvoltările în serie:

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2(1-\frac{z}{2})} = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{2} \right)^n, \quad \frac{1}{z+3} = \frac{1}{3(1+\frac{z}{3})} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{3} \right)^n (-1)^n,$$

deci

$$f(z) = \frac{1}{5} \cdot \left[ -\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{2} \right)^n - \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{3} \right)^n (-1)^n \right] = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} z^n \left( -\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} \right).$$

ii)  $2 < |z| < 3$ . Avem

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z(1-\frac{2}{z})} = \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n, \quad \frac{1}{z+3} = \frac{1}{3(1+\frac{z}{3})} = \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^n,$$

de unde rezultă  $f(z) = \frac{1}{5} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{3^{n+1}} \right]$ .

iii) Pentru  $|z| > 3$ , avem

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z\left(1-\frac{2}{z}\right)} = \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n, \quad \frac{1}{z+3} = \frac{1}{z\left(1+\frac{3}{z}\right)} = \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{z}\right)^n,$$

deci  $f(z) = \frac{1}{5} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^{n+1}} \right] = \frac{1}{5} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - (-1)^n \cdot 3^n}{z^{n+1}}$ .

iv) Pentru  $|z-2| < 1$ , avem

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{z-2+5} = \frac{1}{5\left(\frac{z-2}{5}+1\right)} = \frac{1}{5} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-2}{5}\right)^n,$$

deci  $f(z) = \frac{1}{5} \left[ \frac{1}{z-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{5^{n+1}} \right]$ .

**V.**  $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2(x^2 + b^2)}$ ,  $a > b > 0$ . Construim drumul  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$

(vezi Fig. 3). Fie  $g(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)^2(z^2 + b^2)}$ . Avem

$$\begin{cases} \int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^2 \operatorname{Rez}(g, \alpha_k) \\ \int_{\gamma} g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx \end{cases}$$

iar pentru  $R \rightarrow \infty$  obținem  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i (\operatorname{Rez}(g, ia) + \operatorname{Rez}(g, ib))$ . Dar  $z = ia$  este pol de ordinul 2 pentru  $g$ , deci

$$\begin{aligned} \operatorname{Rez}(g, ia) &= \lim_{z \rightarrow ia} \left( (z - ia)^2 \cdot \frac{1}{(z - ia)^2(z + ia)^2(z^2 + b^2)} \right)' = \\ &= \lim_{z \rightarrow ia} \left[ \frac{-2}{(z + ia)^3(z^2 + b^2)} - \frac{2z}{(z + ia)^2(z^2 + b^2)^2} \right] = \\ &= \frac{-2}{(-i)a^3 \cdot 8 \cdot (b^2 - a^2)} - \frac{2ia}{4(-1)a^2 \cdot (b^2 - a^2)^2} = \frac{b^2 - 3a^2}{4ia^3(b^2 - a^2)^2}. \end{aligned}$$

De asemenea  $z = ib$  este pol de ordinul întâi pentru  $g$ , deci

$$\operatorname{Rez}(g, ib) = \lim_{z \rightarrow ib} \frac{1}{(z^2 + a^2)^2(z + ib)} = \frac{1}{(a^2 - b^2)^2 \cdot 2ib}.$$

Rezultă  $J = 2\pi i \left( \frac{b^2 - 3a^2}{4ia^3(b^2 - a^2)^2} + \frac{1}{(a^2 - b^2)^2 \cdot 2ib} \right) = \frac{\pi(b^3 - 3a^2b + 2a^3)}{2a^3b(a^2 - b^2)^2}.$

**VI.**  $a_n + ib_n = \int_0^{2\pi} \frac{e^{inx}}{1 - 2a \cos x + a^2} dx$ . Notând  $e^{ix} = z$ , obținem

$$a_n + ib_n = \int_{|z|=1} \frac{z^n}{1 - 2a \frac{z^2+1}{2z} + a^2} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{z^n}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a}$ . Atunci  $z_1 = a$  și  $z_2 = \frac{1}{a}$  sunt puncte singulare ale funcției  $g$  (poli de ordin 1). Pentru  $a \in \mathbb{R}, |a| \neq 1$ , distingem cazurile

i) Dacă  $|a| < 1$ , atunci  $|z_1| = |a| < 1, |z_2| = |\frac{1}{a}| > 1$  și deci putem evalua integrala  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, a)$  unde  $\operatorname{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^n}{-2az + a^2 + 1} = \frac{a^n}{-a^2 + 1}$  deci  $a_n + ib_n = \frac{1}{i} 2\pi i \frac{a^n}{1-a^2} = \frac{2\pi a^n}{1-a^2}$ . Rezultă  $a_n = \frac{2\pi a^n}{1-a^2}, b_n = 0$ .

ii) Dacă  $|a| > 1$ , atunci  $|z_1| = |a| > 1, |z_2| = |\frac{1}{a}| < 1$  și deci evaluăm integrala  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 1/a)$ . Dar

$$\operatorname{Rez}(g, \frac{1}{a}) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{a}} \frac{z^n}{-2az + a^2 + 1} = \frac{\frac{1}{a^n}}{-2 + a^2 + 1} = \frac{1}{a^n(a^2 - 1)},$$

deci  $a_n + ib_n = \frac{1}{i} 2\pi i \frac{1}{a^n(a^2 - 1)} = \frac{2\pi}{a^n(a^2 - 1)} \Rightarrow a_n = \frac{2\pi}{a^n(a^2 - 1)}, b_n = 0$ .

**VII.** Rezolvăm sistemul  $\begin{cases} x' = x - y + 2 \sin t \\ y' = 2x - y \end{cases}$  cu condițiile inițiale  $\begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0. \end{cases}$

*Metoda 1.* Din prima ecuație, obținem  $y = x + 2 \sin t - x'$ . Înlocuind în a doua ecuație, rezultă  $x' + 2 \cos t - x'' = 2x - x - 2 \sin t + x' \Leftrightarrow x'' + x - 2 \sin t - 2 \cos t = 0$ . Rezolvăm ecuația omogenă  $x'' + x = 0$ . Polinomul caracteristic  $r^2 + 1 = 0$  are rădăcinile  $r \in \{\pm i\}$ , deci quasipolinoamele asociate sunt  $\varphi_1(t) = \cos t, \varphi_2(t) = \sin t$ .

Căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene de forma:  $x_0(t) = C_1(t) \cos t + C_2(t) \sin t$ . Din sistemul  $\begin{cases} C'_1(t) \cos t + C'_2(t) \sin t = 0 \\ -C'_1(t) \cos t + C'_2(t) \sin t = 2 \sin t + 2 \cos t \end{cases}$ , rezultă

$$C'_2(t) = \sin 2t + \cos 2t + 1, \text{ deci } C_2(t) = -\frac{\cos 2t}{2} + \frac{\sin 2t}{2} + t.$$

Înlocuind în prima ecuație, avem:  $C'_1(t) \cos t + 2 \sin^2 t + 2 \cos^2 t \sin t = 0$ , deci

$$C'_1(t) = -2 \sin^2 t + 2 \sin t \cos t = \cos 2t - 1 - \sin 2t \Rightarrow C_1(t) = \frac{\sin 2t}{2} - t + \frac{\cos 2t}{2}.$$

Prin urmare, soluția particulară este

$$\begin{aligned} x_0(t) &= \frac{\sin 2t \cos t}{2} - t \cos t + \frac{\cos 2t \cos t}{2} + \frac{\sin 2t \sin t}{2} - \frac{\cos 2t \sin t}{2} + t \sin t = \\ &= \frac{\sin 2t}{2}(\cos t + \sin t) - t(\cos t - \sin t) + \frac{\cos 2t}{2}(\cos t - \sin t). \end{aligned}$$

Soluția generală a ecuației neomogene este

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{\sin 2t}{2}(\cos t + \sin t) - t(\cos t - \sin t) + \frac{\cos 2t}{2}(\cos t - \sin t).$$

Condiția  $x(0) = 0$  implică  $C_1 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$ , și folosind prima ecuație, avem  $y(0) = 0 \Rightarrow x'(0) = 0 \Rightarrow C_2 + 1 - 1 - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$ . În concluzie

$$x(t) = \frac{1}{2}(\sin t - \cos t) + \frac{\sin 2t}{2}(\cos t + \sin t) - t(\cos t - \sin t) + \frac{\cos 2t}{2}(\cos t - \sin t).$$

Din prima ecuație se obține ușor  $y(t)$ .

*Metoda 2.* Aplicând transformarea Laplace sistemului și notând  $X = \mathcal{L}[x]$ ,  $Y = \mathcal{L}[y]$ , obținem:

$$\begin{cases} pX = X - Y + \frac{2}{p^2+1} \\ pY = 2X - Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p-1)X + Y = \frac{2}{p^2+1} \\ -2X + (p+1)Y = 0. \end{cases}$$

Discriminantul acestui sistem liniar în necunoscutele  $X, Y$ , este  $\Delta = p^2 + 1 \neq 0$ . Sistemul este compatibil determinat, cu soluțiile:  $X = \frac{2(p+1)}{(p^2+1)^2}$  și  $Y = \frac{4}{(p^2+1)^2}$ . Pentru determinarea lui  $x(t)$ , notăm  $g_1(p) = \frac{2(p+1)}{(p^2+1)^2} e^{pt}$ ; se observă că  $p = \pm i$  sunt poli de ordinul 2, și avem

$$\text{Rez}(g_1, i) = \lim_{p \rightarrow i} \left( \frac{2(p+1)}{(p^2+1)^2} e^{pt} \right) = 2 \lim_{p \rightarrow i} \frac{(e^{pt} + (p+1)t e^{pt})(p+i)^2 - (p+1)e^{pt} \cdot 2(p+i)}{(p+i)^4},$$

deci  $\text{Rez}(g_1, i) = \frac{e^{it}(t-it+1)}{2i}$ . Analog,  $\text{Rez}(g_1, -i) = \frac{e^{-it}(-t-it-1)}{2i}$ , deci

$$x(t) = t \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} - it \frac{e^{it} + e^{-it}}{2i} + \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = t \sin t - t \cos t + \sin t.$$

Pentru determinarea lui  $y(t)$ , notăm  $g_2(p) = \frac{4}{(p^2+1)^2} e^{pt}$ . Se observă că  $p = \pm i$  sunt poli de ordinul 2 pentru  $g_2$ , deci

$$\text{Rez}(g_2, i) = 4 \lim_{p \rightarrow -i} \left( \frac{e^{pt}}{(p^2+1)^2} \right) = 4 \cdot \lim_{p \rightarrow i} \frac{e^{pt} t(p+1)^2 - e^{pt} \cdot 2(p+i)}{(p+i)^4} = e^{it}(-t-i),$$

și  $\text{Rez}(g_2, -i) = e^{-it}(-t+i)$ . Atunci

$$y(t) = -t(e^{it} + e^{-it}) - i(e^{it} - e^{-it}) = -2t \cos t + 2 \sin t.$$

*Observație.* Problema se poate rezolva și folosind matricea exponentială.

**VIII.**  $F(p) = \frac{p+1}{p^2+2p+\alpha}$ . Discriminantul polinomului  $p^2 + 2p + \alpha$  este  $\Delta = 4(1-\alpha)$ . Distingem trei cazuri:

i) Dacă  $1 - \alpha < 0$ , deci  $\alpha > 1$ , atunci  $p^2 + 2p + \alpha = 0 \Leftrightarrow p \in \{-1 \pm i(\alpha - 1)\}$ . Obținem  $F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2+\alpha-1}$ , deci funcția originală este  $e^{-t} \cos(\sqrt{\alpha-1}t)$ .

ii) Dacă  $1 - \alpha = 0$ , deci  $\alpha = 1$ , atunci  $F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2} = \frac{1}{p+1}$ , iar funcția originală este  $e^{-t}$ .

iii) Dacă  $1 - \alpha > 0$ , atunci  $p^2 + 2p + \alpha = 0 \Leftrightarrow p \in \{p_{1,2}\} = \{-1 \pm \sqrt{1-\alpha}\}$ .  
Atunci  $F(p) = \frac{p+1}{(p-p_1)(p-p_2)} = \frac{A}{p-p_1} + \frac{B}{p-p_2}$ , unde  $\begin{cases} A+B=1 \\ -Ap_2-Bp_1=1 \end{cases} \Leftrightarrow A=B=\frac{1}{2}$ .  
Rezultă  $F(p) = \frac{1}{2} \frac{1}{p-p_1} + \frac{1}{2} \frac{1}{p-p_2}$ . Prin urmare funcția original este

$$\frac{1}{2}e^{p_1 t} + \frac{1}{2}e^{p_2 t} = \frac{1}{2}e^{-t} \left( e^{\sqrt{1-\alpha}t} + e^{-\sqrt{1-\alpha}t} \right) = e^{-t} \cdot ch(\sqrt{1-\alpha}t).$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil electric, 2004-2005

**I.** Calculăm  $I = \int_{\Gamma} z^2 \cdot e^{\frac{2z}{z+1}} dz$ ,  $\Gamma = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - \frac{1}{2}| = R\}$ ,  $R \neq \frac{3}{2}$ ;  $R > 0$ .

Fie  $g(z) = z^2 \cdot e^{\frac{2z}{z+1}}$ ; pentru  $g$ , singurul punct singular este  $z = -1$ , care este punct singular esențial.  $\operatorname{Rez}(g, -1) = c_{-1}$  coeficient din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $g$  în jurul lui  $z = -1$ . Se observă că avem

$$\begin{aligned} e^{\frac{2z}{z+1}} &= e^{\frac{2(z+1)-2}{z+1}} = e^{2-\frac{2}{z+1}} = e^2 \cdot e^{-\frac{2}{z+1}} = e^2 \cdot S. \\ z^2 \cdot e^{\frac{2z}{z+1}} &= (z+1-1)^2 \cdot e^2 \cdot S = e^2 [(z+1)^2 - 2(z+1) + 1] \cdot S, \end{aligned}$$

unde

$$\begin{aligned} S &= 1 + \frac{-2}{1!(z+1)} + \frac{(-2)^2}{2!(z+1)^2} + \cdots + \frac{(-2)^n}{n!(z+1)^n} + \cdots \\ &= 1 - \frac{2}{1!(z+1)} + \frac{2^2}{2!(z+1)^2} + \cdots + \frac{(-1)^n \cdot 2^n}{n!(z+1)^n} + \cdots \end{aligned}$$

deci

$$c_{-1} = \left( \frac{2^3}{3!} - \frac{2^3}{2!} - \frac{2}{1!} \right) e^2 = \left( \frac{4}{3} - 4 - 2 \right) e^2 = \left( \frac{4}{3} - 6 \right) e^2 = -\frac{14e^2}{3}.$$

Considerăm cercul  $|z - \frac{1}{2}| = R$  de centru  $(\frac{1}{2}, 0)$  și rază  $R$ . Distingem cazurile:

- i) dacă  $R < \frac{3}{2}$ , atunci  $I = 0$ ;  
ii) dacă  $R > \frac{3}{2}$ , atunci  $I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, -1) = 2\pi i - \frac{14e^2}{3} = -\frac{28\pi i}{3}e^2$ .

**II.** Avem  $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ \pi/2, & 0 < x < \pi \end{cases}$ . Dezvoltarea în serie trigonometrică

Fourier a funcției  $f$  este  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ , unde

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \cos(nx) dx = \frac{1}{2} \left. \frac{\sin(nx)}{n} \right|_0^{\pi} = 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \sin(nx) dx = -\frac{1}{2} \left. \frac{\cos(nx)}{n} \right|_0^{\pi} = \frac{1}{2n} ((-1)^{n+1} + 1), \\ a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot x \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

deci  $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n} \left( (-1)^{n+1} + 1 \right) \cdot \sin(nx), \forall x \in (-\pi, \pi)$ . Seria se rescrie

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \left( (-1)^{n+1} + 1 \right) \cdot \sin(nx) = \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \left( \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n+1} \cdot 2 \sin(nx) + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n} \cdot 0 \cdot \sin(nx) \right) = \\ &= \frac{\pi}{4} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n+1} \sin(nx). \end{aligned}$$

Din formula Parseval,  $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$ , rezultă

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \left( (-1)^{n+1} + 1 \right)^2 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi^2}{4} dx \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \cdot \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} \cdot 4 &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{4} \cdot x \Big|_0^\pi \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{8} + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} &= \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

**III.** Aplicăm transformarea Laplace ecuației; notând  $\mathcal{L}[x(t)](p) = X(p)$ , obținem:

$$\begin{aligned} p^3 X(p) - p^2 - p + 1 - 2(p^2 X(p) - p - 1) - pX(p) - 1 + 2X(p) &= 5 \cdot \frac{2}{p^2 + 4} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (p^3 - 2p^2 - p + 2) \cdot X(p) - p^2 + p + 2 &= \frac{10}{p^2 + 4}, \end{aligned}$$

deci  $X(p) = \frac{1}{p-1} + \frac{10}{(p-1)(p+1)(p-2)(p^2+4)}$ . Dar

$$\begin{aligned} \frac{10}{(p-1)(p+1)(p-2)(p^2+4)} &= \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p-2} + \frac{Dp+E}{p^2+4} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow A = -1, B = \frac{1}{3}, C = \frac{5}{12}, D = \frac{1}{4}, E = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

deci rezultă

$$X(p) = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{p+1} + \frac{5}{12} \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \frac{p}{p^2+4} + \frac{1}{2} \frac{1}{p^2+4},$$

și prin urmare  $x(t) = \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{5}{12}e^{2t} + \frac{1}{4}\cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t)$ .

**IV.** Avem  $\int_0^\infty f(x) \cos(tx) dx = \frac{1}{1+t^2}$ . Folosind formula inversă a transformării

Fourier prin cosinus, rezultă  $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \underbrace{\frac{1}{1+t^2} \cos(tx)}_{\text{pară}} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \cos(tx) dt$ .

Fie drumul închis  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$ ,  $R > 1$  (vezi Fig. 3). Fie  $g(z) = \frac{1}{1+z^2} \cdot e^{izx}$ . Aplicând teorema reziduurilor, obținem

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i) \Leftrightarrow \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i).$$

Pentru  $R \rightarrow \infty$ , egalitatea devine  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i)$ , și deoarece  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz = 0$  (lema lui Jordan), rezultă  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i)$ . Dar  $z = i$  este pol de ordinul 1 pentru  $g$ , deci

$$\operatorname{Rez}(g, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{izx}}{(z - i)(z + i)} = \frac{e^{-x}}{2i} = \frac{1}{2e^x i} \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} e^{ixt} dx = 2\pi i \frac{1}{2e^x i} = \frac{\pi}{e^x}.$$

$$\text{Dar } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} \cos(tx) dx = \operatorname{Re} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} e^{ixt} dx \right), \text{ deci avem}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{e^x} = \frac{1}{e^x} = e^{-x}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2004-2005

**I. a)** Notăm  $u(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ . Atunci

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2x^3 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} - \frac{2x(x^2 - 3y^2)}{(x^2 + y^2)^3} = 0,$$

deci  $u$  este armonică. Obținem succesiv

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial t} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$y = 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{x^2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} + C_1 \Rightarrow f(z) = \frac{1}{z} + C_1; C_1 \in \mathbb{C}.$$

Condiția  $f(1) = 1$  implica  $1 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 0$ , deci  $f(z) = \frac{1}{z}$ .

b) Notăm  $u(x, y) = \varphi(t)$ ,  $t(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x}$ . Impunem condiția de armonicitate funcției  $u$ . Avem  $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{2y}{x}$ , iar condiția  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$  se rescrie

$$\begin{aligned} \varphi''(t) \cdot \left( \frac{x^2-y^2}{x^2} \right)^2 + \varphi'(t) \cdot \frac{2x^3-(x^2-y^2)\cdot 2x}{x^4} + \varphi''(t) \frac{4y^2}{x^2} + \varphi'(t) \frac{2}{x} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot \frac{x^2+y^2}{x} + 2\varphi'(t) &= 0 \Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot t + 2\varphi'(t) = 0 \Rightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2}{t}, \end{aligned}$$

unde am notat  $t = \frac{x^2-y^2}{x^2}$ . Integrând ambii membri ai egalității, rezultă:

$$\int \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} dt = -2 \int \frac{1}{t} dt \Leftrightarrow \ln(\varphi'(t)) = -2 \ln|t| + \ln C_1, \quad C_1 > 0 \Rightarrow$$

$$\varphi'(t) = \frac{C_1}{t^2}, \quad C_1 \in \mathbb{R} \Rightarrow \int \varphi'(t) dt = C_1 \int \frac{1}{t^2} dt \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varphi(t) = -\frac{C_1}{t} + C_2, \quad C_2 \in \mathbb{R}$$

și deci  $u(x, y) = -\frac{C_1}{t} + C_2$ . Obținem succesiv  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{C_1(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} - i \frac{-2C_1xy}{(x^2 + y^2)^2}$ ;  $y = 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{C_1}{x^2} \Rightarrow f(x) = -\frac{C_1}{x} + C_3$ , deci  $f(z) = -\frac{C_1}{z} + C_3$ ,  $C_3 \in \mathbb{C}$ .

**III.** a) *Metoda 1.* Aplicând transformarea Laplace și notând  $\mathcal{L}[x](p) = X(p)$ ,  $\mathcal{L}[y](p) = Y(p)$ , sistemul devine:

$$\begin{cases} pY(p) + 2X(p) - Y(p) = 0 \\ 2(pX(p) - \frac{1}{2}) + p^2Y(p) + 1 = 2\frac{1}{p^2} - \frac{p}{p^2+4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (p-1)Y(p) + 2X(p) = 0 \\ pY(p) + 2X(p) = \frac{2}{p^3} - \frac{p}{p^2+4}. \end{cases}$$

Scăzând a doua ecuație din prima, rezultă:

$$-Y(p) = -\frac{2}{p^3} + \frac{p}{p^2+4} \Leftrightarrow Y(p) = 2\frac{1}{p^3} - \frac{1}{2}\frac{2}{p^2+4},$$

deci  $y(t) = t^2 - \frac{1}{2}\sin(2t)$ . Din prima ecuație a sistemului inițial, rezultă

$$x(t) = \frac{y(t) - y'(t)}{2} = \frac{t^2 - 2t}{2} - \frac{1}{4}\sin(2t) + \frac{\cos(2t)}{2}.$$

*Observație.* Determinarea lui  $x(t)$  se putea face și aflând  $X(p)$  și apoi originalul transformatei Laplace.

*Metoda 2.* Rezolvăm sistemul:  $\begin{cases} y' + 2x - y = 0 \\ 2x' + y'' = 2t - \cos(2t) \end{cases}$ . Înlocuind în a doua ecuație pe  $x$  extras din prima, avem:

$$2x = y - y' \Rightarrow 2x' = y' - y'' \Rightarrow y' = 2t - \cos(2t) \Rightarrow y = t^2 - \frac{\sin(2t)}{2} + C_1.$$

Cum  $y(0) = 0$ , rezultă  $C_1 = 0$ , deci  $y = t^2 - \frac{\sin(2t)}{2}$ . Analog metodei 1, obținem  $x(t) = \frac{t^2 - 2t}{2} - \frac{1}{4}\sin(2t) + \frac{\cos(2t)}{2}$ .

b) Rezolvăm ecuația  $\varphi(t) - \int_0^t e^{t-u}(t-u)\varphi(u)du = \cos t$ . Aplicăm transformarea

Laplace ecuației integrale, făcând observația că  $\int_0^t e^{t-u}(t-u)\varphi(u)du = e^t \cdot t * \varphi(t)$ .  
Obținem

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\varphi(t)](p) - \mathcal{L}[e^t \cdot t](p) \cdot \mathcal{L}[\varphi(t)](p) &= \mathcal{L}[\cos t](p) \Leftrightarrow \frac{p^2 - 2p}{(p-1)^2} \cdot \mathcal{L}[\varphi(t)](p) = \frac{p}{p^2+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathcal{L}[\varphi(t)](p) &= \frac{(p-1)^2}{(p^2+1)(p-2)} = \frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{C}{p-2} \Rightarrow \begin{cases} A+C=1 \\ -2A+B=-2 \\ -2B+C=1. \end{cases} \end{aligned}$$

Rezultă  $A = \frac{4}{5}$ ,  $B = -\frac{2}{5}$ ,  $C = \frac{1}{5}$ , deci

$$\mathcal{L}[\varphi(t)](p) = \frac{4}{5} \frac{p}{p^2+1} - \frac{2}{5} \frac{1}{p^2+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{p-2} \Rightarrow \varphi(t) = \frac{4}{5} \cos t - \frac{2}{5} \sin t + \frac{1}{5} e^{2t}.$$

**III.** a) Calculăm integrala  $\int_{|z|=2} (z^2 + 2z + 1)e^{\frac{1}{z-1}} dz$ . Fie  $g(z) = (z^2 + 2z + 1)e^{\frac{1}{z-1}}$ .

Se observă că  $z = 1$  este punct singular esențial pentru  $g$ . Folosind egalitățile

$$\begin{cases} e^{\frac{1}{z-1}} = 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \cdots, \\ z^2 + 2z + 1 = (z-1)^2 + 4z = (z-1)^2 + 4(z-1) + 4, \end{cases}$$

funcția  $g$  se rescrie:

$$g(z) = [(z-1)^2 + 4(z-1) + 4] \cdot \left(1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \cdots\right),$$

$$\text{deci } c_{-1} = \frac{1}{3!} + \frac{4}{2!} + \frac{4}{1!} = \frac{1}{6} + 6 = \frac{37}{6} \Rightarrow \int_{|z|=2} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 1) = \frac{37\pi i}{3}.$$

b) Notăm integrala definită căutată prin  $b_n = \int_0^{2\pi} \frac{\sin(2nx)}{5+3\sin x} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Construim  $a_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2nx)}{5+3\sin x} dx$  și observăm că  $a_n + ib_n = \int_0^{2\pi} \frac{e^{i2nx}}{5+3\sin x} dx$ . Notând  $e^{ix} = z$ , rezultă

$$a_n + ib_n = \int_{|z|=1} \frac{z^{2n}}{5+3\frac{z^2-1}{2iz}} \frac{dx}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{2z^{2n}}{10iz+3z^2-3} dx.$$

Fie  $g(z) = \frac{2z^{2n}}{3z^2+10iz-3}$ . Pentru  $g$ ,  $z_1 = -\frac{i}{3}$  și  $z_2 = -3i$  sunt poli de ordinul 1. Dar  $|z_1| = \frac{1}{3} < 1$  și  $|z_2| = 3 > 1$ , deci  $\int_{|z|=1} g(z) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}\left(g, -\frac{i}{3}\right)$ . De asemenea, obținem:

$$\operatorname{Rez}\left(g, -\frac{i}{3}\right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{i}{3}} \left(z + \frac{i}{3}\right) \frac{z^{2n}}{3(z + \frac{i}{3})(z + 3i)} = \frac{(-\frac{i}{3})^{2n}}{8i} = \frac{i^{2n-1}}{3^{2n} \cdot 8}.$$

$$\text{Rezultă } a_n + ib_n = 4\pi i \frac{i^{2n-1}}{3^{2n} \cdot 8} = \frac{\pi(-1)^n}{3^{2n} \cdot 2}, \text{ deci } \begin{cases} a_n = \frac{\pi(-1)^n}{3^{2n} \cdot 2} & \text{și } \int_0^{2\pi} \frac{\sin(2nx)}{5+3\sin x} dx = 0. \\ b_n = 0 & \end{cases}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2005-2006

**I.** a)  $I = \int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^3}$ ;  $\gamma = Fr(D)$ , unde  $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R, 0 < \arg z < \pi\}$  (vezi Fig. 3). Fie  $g(z) = \frac{1}{1+z^3}$ . Funcția are 3 puncte singulare (poli de ordinul 1):  $z_1 = -1$ ,  $z_2 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$  și  $z_3 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ . Dar  $I_m(z_3) = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$ , deci  $z_3 \notin Int(\gamma)$ . Pe de altă parte,  $|z_1| = |z_2| = 1$ . Distingem trei cazuri: i)  $0 < R < 1 \Rightarrow I = 0$ . ii)  $R = 1 \Rightarrow I = \pi i (\operatorname{Rez}(g, -1) + \operatorname{Rez}(g, z_2))$ . Prin calcul direct obținem:

$$\begin{cases} \operatorname{Rez}(g, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z+1)}{1+z^3} = \frac{1}{3} \\ \operatorname{Rez}(g, z_2) = \lim_{z \rightarrow (\frac{1+i\sqrt{3}}{2})} (z-z_2) \cdot \frac{1}{(z+1)(z-z_2)(z-z_3)} = \frac{1}{3z_2^2} = \frac{-i\sqrt{3}-1}{6}, \end{cases}$$

$$\text{deci } I = \frac{\pi i(1-i\sqrt{3})}{6}. \text{ iii) } R > 1 \Rightarrow 2\pi i (\operatorname{Rez}(g, -1) + \operatorname{Rez}(g, z_2)) = \frac{\pi i(1-i\sqrt{3})}{3}.$$

$$\text{b) Calculăm } \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}. \text{ Construim } \gamma = [0, R] \cup \gamma_R \cup \overline{AO} \text{ (vezi Fig. 4).}$$




Figura 4.

Alegem  $R > 1$  și observăm că în interiorul lui  $\gamma$  nu se află decât un punct singular al funcției  $g(z)$  (vezi punctul a)) și anume  $z_2$ . Atunci

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, z_2) = 2\pi i \left( \frac{-1 - i\sqrt{3}}{6} \right).$$

Pe de altă parte, avem  $\int_{\gamma} g(z) dz = \int_0^R g(x) dx + \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{AO} g(z) dz$ . Pentru a calcula  $\int_{AO} g(z) dz$ , parametrizăm  $AO$ ,  $z = (R - \rho) \cdot e^{2\pi i/3}$ ,  $\rho \in [0, R]$  și deci  $dz = -e^{\frac{2\pi i}{3}} d\rho$ , de unde rezultă

$$\int_{AO} g(z) dz = - \int_0^R \frac{1}{1 + (R - \rho)^3 \cdot e^{2\pi i}} \cdot e^{\frac{2\pi i}{3}} d\rho = -e^{\frac{2\pi i}{3}} \int_0^R \frac{dr}{1 + r^3}.$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} g(z) dz &= -e^{\frac{2\pi i}{3}} \int_0^R \frac{dx}{1 + x^3} + \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_0^R \frac{dx}{1 + x^3} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left( \int_0^R \frac{dx}{1 + x^3} \right) (1 - e^{\frac{2\pi i}{3}}) + \int_{\gamma_R} g(z) dz = 2\pi i \left( \frac{-i\sqrt{3} - 1}{6} \right). \end{aligned}$$

Trecând la limită  $R \rightarrow \infty$  în această relație, rezultă:

$$\begin{aligned} (1 - e^{\frac{2\pi i}{3}}) \int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^3} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz &= 2\pi i \left( \frac{-i\sqrt{3} - 1}{6} \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \left( \frac{3}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \right) \int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^3} &= \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi i}{6} \Leftrightarrow \int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^3} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

**II.** Avem  $\int_0^{\infty} g(u) \cdot \sin(ut) du = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin \frac{t}{4}, & 0 < t < 2\pi \\ \frac{\pi}{4}, & t = 2\pi \\ 0, & t > 2\pi. \end{cases}$ . Utilizând formula

inversei transformării Fourier prin sinus, obținem:

$$\begin{aligned} g(u) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{t}{4} \sin(ut) dt = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(\frac{t}{4} - ut) - \cos(\frac{t}{4} + ut)}{2} dt = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(\frac{t}{4} - u)}{\frac{1}{4} - u} \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin(\frac{t}{4} + ut)}{\frac{1}{4} + u} \Big|_0^{2\pi} \right) = 2 \left( \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\pi u)}{1 - 4u} - \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + 2\pi u)}{1 + 4u} \right) = \\ &= 2 \left( \frac{\cos(2\pi u)}{1 - 4u} - \frac{\cos(2\pi u)}{1 + 4u} \right) = \frac{16u \cdot \cos(2\pi u)}{1 - 16u^2}. \end{aligned}$$

*Observație.* Considerând formula transformării Fourier prin sinus sub forma  $\hat{f}_s(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \sin(\xi x) dx$ , atunci rezultatul este  $g(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{16u \cdot \cos(2\pi u)}{1 - 16u^2}$ .

**III.**  $x'' - 2x' + x = e^t$ ;  $x(0) = 0$ ;  $x'(0) = 1$ . Aplicând ecuației date transformarea Laplace și notând:  $X(p) = [\mathcal{L}(f)](p)$ , rezultă

$$\begin{aligned} p^2 X(p) - 1 - 2pX(p) + X(p) &= \frac{1}{(p-1)^3} \Leftrightarrow X(p)(p-1)^2 = 1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow X(p)(p-1)^2 = 1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \Leftrightarrow X(p) = \frac{p}{(p-1)^3}. \end{aligned}$$

Fie  $G(p) = \frac{p}{(p-1)^3} \cdot e^{pt}$ ;  $p = 1$  este pol de ordinul 3 pentru  $G$ , deci

$$\text{Rez } (G, 1) = \frac{1}{2} \lim_{p \rightarrow 1} (pe^{pt})'' = \frac{1}{2}(t^2 + 2t)e^t \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2}(t^2 + 2t)e^{2t}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2005-2006

**I. a)**  $\text{Im}(f(z)) = \text{arctg} \left( \frac{y}{x} \right)$ ,  $f(1) = 0$ . Notăm  $v(x, y) = \text{arctg} \left( \frac{y}{x} \right)$ . Verificăm armonicitatea funcției  $v$ . Obținem succesiv:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{cases} \Rightarrow \Delta v = 0,$$

deci  $v$  este armonică. Atunci  $f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i(-\frac{y}{x^2 + y^2})$ . Pentru  $y = 0$  obținem  $f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f(x) = \ln x + C$ , și efectuând substituția  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = \ln z + C$ . Dar  $f(1) = 0 \Leftrightarrow C = 0$ , deci  $f(z) = \ln z$ .

b)  $\text{Re}(f(z)) = \varphi \left( \frac{x^2 + y^2}{x} \right)$ . Notăm  $u(x, y) = \varphi \left( \frac{x^2 + y^2}{x} \right) = \varphi(t)$ , unde am notat  $t(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x}$ . Atunci

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{2y}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(t) \cdot \left( \frac{x^2 - y^2}{x^2} \right)^2 + \varphi'(t) \cdot \frac{2y^2}{x^3} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(t) \cdot \frac{4y^2}{x^2} + \varphi'(t) \cdot \frac{2}{x} \end{cases}$$

Impunem condiția ca  $u$  să fie armonică, și obținem

$$\begin{aligned} \Delta u = 0 &\Leftrightarrow \varphi''(t) \left( \frac{x^4 - 2x^2y^2 + y^4}{x^4} + \frac{4y^2}{x^2} \right) + \varphi'(t) \left( \frac{2y^2}{x^3} + \frac{2}{x} \right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^4} + \frac{2(x^2 + y^2)}{x^3} \cdot \varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot t + 2\varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2}{t} \Leftrightarrow \ln(\varphi'(t)) = -2 \ln t + \ln C = \ln \left( \frac{C}{t^2} \right) \Rightarrow \varphi'(t) = \frac{C}{t^2}, \end{aligned}$$

deci  $\varphi(t) = -\frac{C}{t} + D$ ,  $C, D \in \mathbb{R}$ . Dacă  $\varphi(t) \neq -\frac{C}{t} + D$ , atunci nu putem construi  $f$  olomorfă cu  $\operatorname{Re}(f(z)) = \varphi(t)$ . Dacă  $\varphi(t) = -\frac{C}{t} + D$ , atunci

$$\varphi\left(\frac{x^2+y^2}{x}\right) = -\frac{Cx}{x^2+y^2} + D = u(x, y).$$

Obținem  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{C(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} - i \frac{2Cxy}{(x^2+y^2)^2}$ . Pentru  $y = 0$  avem  $f'(x) = \frac{C}{x^2}$ , deci  $f(x) = -\frac{C}{x} + E$ ,  $E \in \mathbb{R}$ . Substituind  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = -\frac{C}{z} + E$ ,  $z \neq 0$ ;  $C, E \in \mathbb{C}$ .

**III.** a)  $I_1 = \int_{|z|=r} z^2 \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$ . Fie  $g(z) = z^2 \sin\left(\frac{1}{z}\right)$ ;  $z = 0$  punct singular (esențial) pentru  $g$ . Folosind dezvoltarea  $\sin\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ , obținem

$$z^2 \sin\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{2n-1} (2n+1)!} = z - \frac{1}{z \cdot 3!} + \frac{1}{z^2 \cdot 5!} - \dots,$$

deci  $c_1 = -\frac{1}{3!} \Rightarrow \operatorname{Rez}(g, 0) = -\frac{1}{6}$ . Din teorema reziduurilor rezultă

$$I_1 = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 0) = -\frac{2\pi i}{6} = -\frac{\pi i}{3}.$$

b)  $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^{2006}} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^{2006}}$ . Fie  $g(z) = \frac{1}{(z^2+1)^{2006}}$ ;  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$ ,  $R > 1$ , unde  $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq 0\}$  (vezi Fig. 3).

Pe de-o parte,  $\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i)$ . Dar are loc egalitatea

$$\int_{\gamma} g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx,$$

relație care pentru  $R \rightarrow \infty$  conduce la  $\int_{\gamma} g(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$ , de unde rezultă

$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i)$ . Deoarece  $z = i$  este pol de ordinul 2006 pentru  $g$ , avem

$$\operatorname{Rez}(g, i) = \frac{1}{2005!} \cdot \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{1}{(z+i)^{2006}} \right)^{(2005)} = \frac{1}{2005!} \cdot \frac{2006 \cdot 2007 \cdots 4010}{2^{4011} \cdot i}$$

și deci  $I_2 = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2005!} \cdot \frac{2006 \cdot 2007 \cdots 4010}{2^{4011} \cdot i} = \frac{4010! \cdot \pi}{(2005!)^2 \cdot 2^{4011}}$ .

**III.** a)  $\varphi''(t) + \int_0^t e^{2(t-u)} \cdot \varphi'(u)du = e^{2t}$ ,  $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ . Aplicând ecuației date transformarea Laplace, rezultă

$$\mathcal{L}[\varphi''(t)](p) + \mathcal{L}[e^{2t} * \varphi'(t)](p) = \frac{1}{p-2} \Leftrightarrow p^2 \cdot \mathcal{L}[\varphi(t)](p) + \frac{1}{p-2} \cdot p \cdot \mathcal{L}[\varphi(t)] = \frac{1}{p-2}.$$

Notăm  $\mathcal{L}[\varphi(t)] = \Phi(p)$  și obținem  $p(p^2 - 2p + 1) \cdot \Phi(p) = 1$ , deci

$$\Phi(p) = \frac{1}{p(p-1)^2}. \quad (25)$$

Fie  $G(p) = \frac{e^{pt}}{p(p-1)^2}$ ; pentru  $G$  avem polii  $p = 0$  (pol de ordinul 1) și  $p = 1$  (pol de ordinul 2), deci

$$\begin{cases} \text{Rez } (g, 0) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{e^{pt}}{(p-1)^2} = 1 \\ \text{Rez } (g, 1) = \lim_{p \rightarrow 1} \left( \frac{e^{pt}}{p} \right)' = \lim_{p \rightarrow 1} \frac{te^{pt} \cdot p - e^{pt}}{p^2} = e^t(t-1). \end{cases}$$

Aplicând egalității (25) transformarea Laplace inversă, rezultă

$$\varphi(t) = \text{Rez } (g, 0) + \text{Rez } (g, 1) \Rightarrow \varphi(t) = 1 + e^t(t-1).$$

b) Folosind definiția transformării Fourier, obținem  $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot e^{i\xi x} dx$ ;

rezultă

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{i\xi x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\frac{x^2}{2} - i\xi x)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\frac{x^2}{2} - ix\xi - \frac{\xi^2}{2} + \frac{\xi^2}{2})} dx \\ &= e^{-\frac{\xi^2}{2}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\frac{x-i\xi}{\sqrt{2}})^2} dx = e^{-\frac{\xi^2}{2}} \cdot \sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{2\pi} \cdot e^{-\frac{\xi^2}{2}}, \end{aligned}$$

unde s-a folosit substituția  $y = \frac{x-i\xi}{\sqrt{2}}$  și egalitatea  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$ .

*Observație.* Dacă se folosește definiția alternativă a transformării Fourier  $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot e^{i\xi x} dx$ , rezultă  $\hat{f}(e^{-x^2/2}) = e^{-\xi^2/2}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2006-2007

**I. a)** Derivând ecuația  $xy'' - (x+z)y' + y = 0$ , rezultă  $xy''' - (x+1)y'' = 0$ . Notând  $y'' = z$ , obținem  $xz' = (x+1)z \Rightarrow \frac{z'}{z} = 1 + \frac{1}{x}$ . Deci

$$\ln|z| = x + \ln|x| + \ln C_1, \quad C_1 > 0 \Leftrightarrow \ln|z| = \ln|xe^x C_1| \Rightarrow z = \pm C_1 xe^x,$$

și deci se obține ecuația diferențială  $y'' = xe^x C_1$ ,  $C_1 \in \mathbb{R}$ . Integrând rezultă

$$y' = C_1 \int xe^x dx + C_2 = C_1 e^x(x+1) + C_2$$

și deci  $y = C_1 e^x(x+2) + C_2 + C_3$ ,  $C_1 > 0, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ .

b)  $x^2 y'' - xy' + y = \ln x, x > 0$  este ecuație diferențială de tip Euler, deci facem schimbarea de variabilă  $y(x) = z(\ln x)$ ; obținem

$$x^2 \left( z''(\ln x) \cdot \frac{1}{x^2} - z'(\ln x) \cdot \frac{1}{x^2} \right) - xz'(\ln x) \frac{1}{x} + z(\ln x) = xz''(\ln x) - 2z'(\ln x) + z(\ln x) = \ln x.$$

Notând  $\ln x = t$ , obținem  $z''(t) - 2z'(t) + z(t) = t$ , ecuație diferențială liniară cu coeficienți constanți de ordinul 2. Ecuația caracteristică asociată este:

$$r^2 - 2r + 1 = 0 \Leftrightarrow (r-1)^2 = 0,$$

deci  $r_1 = r_2 = 1$  iar quasipolinoamele asociate sunt  $z_1(t) = e^t$  și  $z_2(t) = te^t$ . Căutam în cele ce urmează o soluție particulară de forma:  $z_0(t) = C_1(t)e^t + C_2(t)te^t$ . Înlocuind, rezultă sistemul liniar în necunoscutele  $C_1'(t)$  și  $C_2'(t)$ :

$$\begin{cases} C'_1(t)e^t + C'_2(t)te^t = 0 \\ C'_1(t)e^t + C'_2(t)te^t(t+1) = t. \end{cases}$$

Prin scădere obținem:  $C_2(t)e^t = t \Rightarrow C_2'(t) = te^{-t}$ , deci

$$C_2(t) = \int te^t dt = -te^{-t} + \int e^{-t} dt = -te^{-t} - e^{-t} = -e^{-t}(t+1).$$

Înlocuind în prima ecuație, rezultă  $C_1'(t)e^t + t^2 = 0 \Rightarrow C_1'(t) = -t^2e^{-t}$ , deci

$$\begin{aligned} C_1(t) &= \int -t^2e^{-t} dt = t^2e^{-t} - \int 2te^{-t} dt = t^2e^{-t} - \int 2te^{-t} dt = \\ &= t^2e^{-t} + 2te^{-t} - 2 \int e^{-t} dt = t^2e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t} = e^{-t}(t^2 + 2t + 2). \end{aligned}$$

Prin urmare  $z_0(t) = t^2 + 2t + 2 - t^2 - t = t + 2$ . Soluția generală este

$$z(t) = k_1 e^t + k_2 te^t + t + 2, \quad k_{1,2} \in \mathbb{R},$$

și deci  $y(x) = k_1 x + k_2 \ln x \cdot x + \ln x + 2$ ,  $k_{1,2} \in \mathbb{R}$ .

**II.** Sistemul  $\begin{cases} x' = 2x + 2z \\ y' = 2x - 2z \\ z' = 2x - 2y \end{cases}$  se rescrie  $X' = AX$ , unde  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ .

Aflăm valorile proprii ale matricei  $A$ . Ecuația caracteristică asociată este:

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 2 \\ 2 & -\lambda & -2 \\ 2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(8-\lambda^2) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{2, \pm 2\sqrt{2}\}.$$

Aflăm vectorii proprii asociați fiecărei valori proprii:

i) pentru  $\lambda_1 = 2$ , avem

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2c = 0 \\ a - b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = b \\ b \in \mathbb{R} \end{cases},$$

deci  $(a, b, c)^t = b \underbrace{(1, 1, 0)}_{v_1}^t$ .

ii) pentru  $\lambda_2 = 2\sqrt{2}$ , avem

$$\begin{pmatrix} 2 - 2\sqrt{2} & 0 & 2 \\ 2 & -2\sqrt{2} & -2 \\ 2 & -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (1 - \sqrt{2})a + c = 0 \\ a - \sqrt{2}b - c = 0 \\ a - b - \sqrt{2}c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = (\sqrt{2} + 1)b \\ c = b, b \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

deci  $(a, b, c)^t = b \underbrace{(\sqrt{2} + 1, 1, 1)}_{v_2}^t$ .

iii) pentru  $\lambda_3 = -2\sqrt{2}$ , avem

$$\begin{pmatrix} 2 + 2\sqrt{2} & 0 & 2 \\ 2 & 2\sqrt{2} & -2 \\ 2 & -2 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (1 + \sqrt{2})a + c = 0 \\ a + \sqrt{2}b - c = 0 \\ a - b + \sqrt{2}c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = (1 - \sqrt{2})b \\ c = b, b \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

deci  $(a, b, c)^t = b \underbrace{(1 - \sqrt{2}, 1, 1)}_{v_3}^t$ . Deci soluția generală a sistemului diferențial omogen

dat este:

$$X = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2\sqrt{2}t} \begin{pmatrix} \sqrt{2} + 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{-2\sqrt{2}t} \begin{pmatrix} \sqrt{2} - 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

**III.** Fie  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $v(x, y) = \varphi(x^2 - y^2)$ .

a)  $v$  armonică d.n.d.  $\Delta v = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ .

Notăm  $t(x, y) = x^2 - y^2$  și obținem

$$\begin{aligned} 4x^2\varphi''(t) + 2\varphi'(t) + 4y^2\varphi''(t) - 2\varphi'(t) &= 0 \Leftrightarrow \varphi''(t)(4x^2 + 4y^2) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \varphi''(t) = 0 &\Rightarrow \varphi'(t) = C_1 \Rightarrow \varphi(t) = C_1 t + C_2, \quad C_{1,2} \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow v(x, y) &= C_1(x^2 - y^2) + C_2, \quad C_{1,2} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b)  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ . Avem

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -2yC_1 + i2C_1x.$$

Pentru  $y = 0$ , obținem

$$f'(x) = 2iC_1x \Rightarrow f(x) = 2iC_1 \frac{x^2}{2} + C_2 = x^2iC_1 + C_2.$$

Înlocuind apoi  $x$  cu  $z$ , rezultă  $f(z) = z^2iC_1 + C_2$ ,  $C_{1,2} \in \mathbb{C}$ .

c) Folosind teorema fundamentală Cauchy, obținem

$$\int_{|z|=1} \frac{(z^2iC_1 + C_2) \sin z}{z^2} dz = \underbrace{\int_{|z|=1} iC_1 \sin z dz}_{=0 \text{ (T.fundam.Cauchy)}} + \int_{|z|=1} C_2 \frac{\sin z}{z^2} dz = C_2 \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz.$$

Pentru  $g(z) = \frac{\sin z}{z^2}$ , avem  $\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \frac{1}{z} = \infty$ , deci  $z = 0$  este pol de ordinul 1. Prin urmare  $\frac{\sin z}{z^2} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots}{z^2} = \frac{z}{z^2} - \frac{z^3}{3!z^2} + \frac{z^5}{5!z^2} - \dots = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} - \dots$ , deci  $c_{-1} = 1$  și deci  $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz = 1$ . Rezultatul este  $0 + C_2 = C_2$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2006-2007

**I.** a) Avem  $\operatorname{Re} f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y)$ . Se observă ușor că  $\operatorname{Re} f$  este funcție armonică, deci

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial x} - i \frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial y} = \\ &= e^x(x \cos y - y \sin y + \cos y) - ie^x(-x \sin y - \sin y - y \cos y). \end{aligned}$$

Pentru  $y = 0$  obținem  $f'(x) = e^x(x + 1)$ , deci  $f(x) = e^x + C_1$  schimbând  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = ze^z + C_1$ . Dar  $f(0) = 0$ , deci  $C_1 = 0 \Rightarrow f(z) = ze^z$ .

b)  $\operatorname{Re} f = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ .  $\operatorname{Re} f$  trebuie să fie armonică, deci  $\Delta(\operatorname{Re} f) = 0$ . Notând  $t(x, y) = \frac{y}{x}$ , rezultă  $\varphi''(t)\frac{y^2}{x^4} + \varphi'(t)\left(\frac{2y}{x^3}\right) + \varphi''(t)\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ . Această ecuație se rescrie

$$\varphi''(t)(t^2 + 1) + 2t\varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2t}{t^2 + 1}.$$

Integrând în ambii membri obținem  $\ln(\varphi'(t)) = -\ln(t^2 + 1) \ln C_1$ ,  $C_1 > 0$ , deci  $\varphi'(t) = \frac{C_1}{t^2 + 1} \Rightarrow \varphi(t) = C_1 \operatorname{arctg} t + C_2$ , și deci

$$f'(z) = \frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial x} - i \frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial y} = C_1 \frac{-y}{x^2 + y^2} - iC_1 \frac{x}{x^2 + y^2},$$

iar pentru  $y = 0$  obținem  $f'(x) = -iC_1 \frac{1}{x} \Rightarrow f(x) = iC_1 \ln x + C_3$ ; schimbând  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = -iC_1 \ln z + C_3$ ,  $C_{1,3} \in \mathbb{C}$ .

**II.** a)  $f(z) = \frac{1}{z^2+z-6} = \frac{1}{(z+3)(z-2)} = \frac{A}{z+3} + \frac{B}{z-2} = -\frac{1}{5} \frac{1}{z+3} + \frac{1}{5} \frac{1}{z-2}$ . Distingem următoarele cazuri:

i) Dacă  $|z| < 2$ , atunci

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-2} &= \frac{-1}{2(1-\frac{z}{2})} = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \dots + \frac{z^n}{2^n} + \dots\right) \\ \frac{1}{z+3} &= \frac{1}{3(\frac{z}{3}+1)} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{z}{3} + \frac{z^2}{9} + \dots + \frac{(-1)^n z^n}{3^n} + \dots\right). \end{aligned}$$

Rezultă

$$f(z) = -\frac{1}{15} \left(1 - \frac{z}{3} + \frac{z^2}{9} + \dots + \frac{(-1)^n z^n}{3^n} + \dots\right) - \frac{1}{10} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \dots + \frac{z^n}{2^n} + \dots\right).$$

ii) Dacă  $2 < |z| < 3$ , atunci  $\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z(1-\frac{2}{z})} = \frac{1}{z} \left( 1 + \frac{2}{z} + \left(\frac{2}{z}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{z}\right)^n + \dots \right)$   
 și  $\frac{1}{z+3} = \frac{1}{3} \left( 1 - \frac{z}{3} + \frac{z^2}{9} + \dots \right)$ . Rezultă

$$f(z) = -\frac{1}{15} \left( 1 - \frac{z}{3} + \frac{z^2}{9} + \dots + \frac{(-1)^n z^n}{3^n} + \dots \right) + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \dots + \frac{2^n}{z^{n+1}} + \dots \right).$$

iii) Dacă  $|z| > 3$ , atunci

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \dots + \frac{2^n}{z^n} + \dots, \quad \frac{1}{z+3} = \frac{1}{z(1+\frac{3}{z})} = \frac{1}{z} \left( 1 - \frac{3}{z} + \left(\frac{3}{z}\right)^2 + \dots \right).$$

Rezultă

$$f(z) = -\frac{1}{5} \left( \frac{1}{z} - \frac{3}{z^2} + \frac{9}{z^3} + \dots + \frac{(-1)^n 3^n}{z^{n+1}} + \dots \right) + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \dots + \frac{2^n}{z^n} + \dots \right).$$

iv) Dacă  $|z-2| > 1$ , atunci  $\left| \frac{1}{z-2} \right| < 1$ , iar  $\frac{1}{z+3} = \frac{1}{(z-2)+5}$  și deci apare discuția:

iv.1) Dacă  $1 < |z-2| < 5$ , atunci  $\frac{1}{z+3} = \frac{1}{5(\frac{z-2}{5}+1)} = \frac{1}{5} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^n (-1)^n}{5^n}$  și deci

$$f(z) = \frac{1}{5} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{25} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-2)^n}{5^n}.$$

iv.2) Dacă  $|z-2| > 5$ , atunci

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{(z-2)(1+\frac{5}{z-2})} = \frac{1}{z-2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{(z-2)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{(z-2)^n}$$

$$\text{și deci } f(z) = \frac{1}{5} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{(z-2)^{n+1}}.$$

b) Ecuația  $\sin z = 2$  se rescrie  $\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 2$ , deci  $e^{iz} - e^{-iz} = 4i$ . Notând  $e^{iz} = t$ , obținem  $t - \frac{1}{t} = 4i$ , sau echivalent,  $t^2 - 4it - 1 = 0$ . Soluțiile ecuației de gradul doi sunt  $t_{1,2} = i(2 \pm \sqrt{3})$ . Rezolvând ecuațiile  $e^{iz} = t_{1,2}$ , obținem

$$z \in \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i(2 \pm \sqrt{3}) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

III. a)  $I_1 = \int_{|z|=R} z^3 e^{\frac{1}{z-1}} dz$ ,  $R > 0$ ,  $R \neq 1$ . Funcția  $g(z) = z^3 e^{\frac{1}{z-1}}$  are  $z = 1$

punct singular esențial, iar  $e^{\frac{1}{z-1}} = 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \dots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \dots$ , deci

$$\begin{aligned} z^3 e^{\frac{1}{z-1}} &= (z-1+1)^3 e^{\frac{1}{z-1}} = ((z-1)^3 + (z-1)^2 + 3(z-1) + 1) e^{\frac{1}{z-1}} = \\ &= ((z-1)^3 + (z-1)^2 + 3(z-1) + 1) \left( 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \dots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \dots \right), \end{aligned}$$

deci  $c_{-1} = \frac{1}{4!} + 3\frac{1}{3!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{1!} = \frac{1}{24} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 1 = \frac{73}{24}$ , de unde rezultă  $\operatorname{Rez}(g, 1) = \frac{73}{24}$ .

Distingem cazurile:

i) Dacă  $R < 1$  atunci  $I_1 = 0$  (teorema fundamentală Cauchy);

ii) Dacă  $R > 1$  atunci  $I_1 = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 1) = 2\pi i \cdot \frac{73}{24} = \frac{73\pi i}{12}$ .

b)  $I_2 = \int_0^\pi \frac{dx}{1 - 2a \cos x + a^2}$  pentru  $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ . Observăm că  $I_2$  este pară,

deci  $I_2 = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{dx}{1 - 2a \cos x + a^2}$ . Notând  $e^{ix} = z$  obținem

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{1 - 2a \frac{z^2+1}{2z} + a^2} = \frac{1}{2i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a}.$$

Fie  $g(z) = \frac{dz}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a}$ . Funcția  $g$  are doi poli  $z_1 = a$ , iar  $\operatorname{Rez}(g, a) = \frac{1}{1-a^2}$  și  $z_2 = \frac{1}{a}$ , iar  $\operatorname{Rez}(g, \frac{1}{a}) = \frac{1}{a^2-1}$ . Distingem cazurile:

i) Dacă  $|a| < 1$  atunci  $z_1 \in \operatorname{Int}(\gamma)$  și  $z_2 \in \operatorname{Ext}(\gamma)$ , deci

$$I_2 = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \operatorname{Rez}(g, a) = \pi \frac{1}{1-a^2}.$$

ii) Dacă  $|a| > 1$  atunci  $z_1 \in \operatorname{Ext}(\gamma)$  și  $z_2 \in \operatorname{Int}(\gamma)$ , deci

$$I_2 = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \operatorname{Rez}(g, \frac{1}{a}) = \pi \frac{1}{a^2-1}.$$

**IV.**  $\begin{cases} x' - 4x - y = -36t \\ y' + 2x - y = -2e^t \end{cases}$ , unde  $z(0) = 0$ ,  $y(0) = 1$ . Aplicăm transformarea Laplace și obținem

$$\begin{cases} pX(p) - 4X(p) - Y(p) = -36\frac{1}{p^2} \\ pY(p) - 1 + 2X(p) - Y(p) = -\frac{2}{p^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (p-4)X - Y = \frac{-36}{p^2} \\ (p-1)Y + 2X = 1 - \frac{2}{p-1} = \frac{p-3}{p-1}. \end{cases}$$

Discriminantul sistemului liniar obținut este

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-4 & -1 \\ 2 & p-1 \end{vmatrix} = (p-4)(p-1) + 2 = p^2 - 5p + 4 + 2 = p^2 - 5p + 6,$$

iar minorii asociați necunoscutelor sunt:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} \frac{-36}{p^2} & -1 \\ \frac{p-3}{p-1} & p-1 \end{vmatrix} = \frac{-36(p-1)^2 + p}{p^2(p-1)}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} p-4 & \frac{-36}{p^2} \\ p-1 & \frac{p-3}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{(p-3)(p-4)}{p-1} + \frac{72}{p^2},$$

deci

$$X(p) = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-36p^2 + 72p - 36 + p^3 - 3p^2}{p^2(p-1)(p-2)(p-3)} = \frac{p^3 - 39p^2 + 72p - 36}{p^2(p-1)(p-2)(p-3)}.$$

Realizăm descompunerea în fracții simple

$$X = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p-1} + \frac{D}{p-2} + \frac{E}{p-3} \tag{26}$$

și folosind expresia (26) a lui  $X$  rezultă succesiv

$$\left\{ \begin{array}{l} p = 0 \Rightarrow -36 = -6B \Rightarrow B = 6 \\ p = 1 \Rightarrow 1 - 39 + 72 - 36 = 2C \Rightarrow -2 = 2C \Rightarrow C = -1 \\ p = 2 \Rightarrow 8 - 39 \cdot 4 + 72 \cdot 2 - 36 = 4 \cdot (-1)D \Rightarrow -40 = -4D \Rightarrow D = 10 \\ p = 3 \Rightarrow 27 - 39 \cdot 9 + 72 \cdot 3 - 36 = 18E \Rightarrow -144 = 18E \Rightarrow E = 8 \\ p = -1 \Rightarrow -40 - 72 - 36 = -A + B - \frac{C}{2} + \frac{D}{-3} + \frac{E}{-4} \Rightarrow \\ \Rightarrow A = 148 + 6 + \frac{1}{2} - \frac{10}{3} - 2 = \frac{895}{6}, \end{array} \right.$$

deci, aplicând relației (26) transformarea Laplace inversă, rezultă

$$x(t) = A + B \cdot t + C \cdot e^t + D \cdot e^{2t} + E \cdot e^{3t} = \frac{895}{6} + 6t - e^t + 10e^{2t} + 8e^{3t}.$$

Înlocuind  $x$  în prima ecuație a sistemului, rezultă  $y$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profilele mecanic și electric, 2007-2008

**I.** Folosind transformarea Laplace, obținem

$$\begin{aligned} p^3 \cdot Y(p) + \frac{241}{27} - 3p \cdot Y(p) + 2Y(p) &= \mathcal{L}[x^2 e^x](p) = \mathcal{L}[x^2](p-1) = \frac{2}{(p-1)^3} \Rightarrow \\ \Rightarrow (p^3 - 3p + 2) \cdot Y(p) &= \frac{2}{(p-1)^3} - \frac{241}{27}, \end{aligned}$$

deci  $Y(p) = \frac{2}{(p-1)^5 \cdot (p+2)} - \frac{241}{27} \cdot \frac{1}{(p-1)^2 \cdot (p+2)}$ . Funcția  $G_1(p) = \frac{2}{(p-1)^5 \cdot (p+2)} \cdot e^{pt}$  are polii  $p_1 = 1$  (pol de ordinul 5) și  $p_2 = -2$  (pol de ordinul 1), deci

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rez } (G_1, -2) = \lim_{p \rightarrow -2} \frac{2}{(p-1)^2} \cdot e^{pt} = -\frac{2}{3^5} \cdot e^{-2t} \\ \text{Rez } (G_1, 1) = \frac{1}{4!} \lim_{p \rightarrow 1} \left( \frac{2e^{pt}}{p+2} \right)^{(4)} = \frac{1}{12} \cdot e^t \left( \frac{t^4}{3} - \frac{4t^2}{9} + \frac{4t^2}{9} - \frac{8t}{27} + \frac{8}{81} \right). \end{array} \right.$$

Funcția  $G_2(p) = \frac{1}{(p-1)^2 \cdot (p+2)} \cdot e^{pt}$  are polii  $p_1 = 1$  (pol de ordinul 2) și  $p_2 = -2$  (pol de ordinul 1), deci

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rez } (G_2, -2) = \lim_{p \rightarrow -2} \frac{1}{(p-1)^2} \cdot e^{pt} = \frac{e^{-2t}}{9} \\ \text{Rez } (G_2, 1) = \lim_{p \rightarrow 1} \left( \frac{e^{pt}}{p+2} \right)' = e^t \cdot t \cdot \frac{1}{3} - e^t \cdot \frac{1}{9} = e^t \left( \frac{t}{3} - \frac{1}{9} \right), \end{array} \right.$$

deci

$$\begin{aligned} y(t) &= \operatorname{Rez}(G_1, -2) + \operatorname{Rez}(G_1, 1) - \frac{241}{27} [\operatorname{Rez}(G_2, -2) + \operatorname{Rez}(G_2, 1)] = \\ &= \frac{25}{243} e^{-2t} + e^t \left( \frac{t^4}{36} - \frac{t^3}{27} + \frac{t^2}{27} - \frac{972}{12 \cdot 27} t - \frac{956}{81 \cdot 12} \right). \end{aligned}$$

*Observație.* Exercițiul se poate rezolva și folosind teoria de la ecuațiile diferențiale de ordinul 2, cu coeficienți constanți, neomogene.

**II.** Sistemul se rescrie  $Y' = AY$ ,  $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}$ ;  $Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Rezolvăm

ecuația caracteristică asociată matricii  $A$ ; obținem:  $\det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow (2 - \lambda)^2 \cdot (3 - \lambda) = 0$ , deci valorile proprii sunt  $\lambda_1 = 2$  ( $m_{\lambda_1} = 2$ ) și  $\lambda_2 = 3$  ( $m_{\lambda_2} = 1$ ). Pentru a afla subspațiile proprii asociate valorilor proprii, rezolvăm sistemele caracteristice:

- pentru  $\lambda_1 = 2$ , avem  $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -5 & 5 & -5 \\ -6 & 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow b = a + c$ , deci  $(a, b, c) = a(1, 1, 0) + c(0, 1, 1)$ ,  $a, c \in \mathbb{R}$  și deci obținem doi vectori proprii liniar independenti  $v_1 = (0, 1, 1)^t$  și  $v_2 = (1, 1, 0)^t$ ;

- pentru  $\lambda_2 = 3$ , avem  $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -5 & 4 & -5 \\ -6 & 6 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + c = 0 \\ 5a + 2b = 0 \end{cases}$ , deci  $(a, b, c) = \frac{a}{2}(2, -5, -6)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , deci obținem un vector propriu liniar independent,  $v_3 = (2, -5, -6)^t$ . Soluția generală a sistemului este

$$Y(x) = C_1 \cdot e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \cdot e^{3x} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix},$$

soluție care se rescrie

$$Y(x) = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 2e^{3x} \\ -5e^{3x} \\ -6e^{3x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}. \quad (27)$$

Impunând condiția inițială  $Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$  rezultă  $\begin{cases} C_2 + 2C_3 = 1 \\ C_1 + C_2 - 5C_3 = 0 \\ C_1 - 6C_3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_3 = 0 \\ C_2 = 1 \\ C_1 = -1 \end{cases}$  care, prin înlocuire în (27), conduce la soluția  $Y(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 0 \\ -e^{2x} \end{pmatrix}$ .

*Observație.* Sistemul se poate rezolva și folosind transformarea Laplace.

**III.** Notăm  $v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)) = \ln(x^2 + y^2) + x - 2y$ . Verificăm armonicitatea funcției  $v$ ; obținem:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2} + 1; \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2} - 2; \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}; \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2};$$

rezultă  $\Delta v = 0$  deci  $v$  armonică. Atunci

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2y}{x^2 + y^2} - 2 + i\left(\frac{2x}{x^2 + y^2} + 1\right).$$

Pentru  $y = 0$  avem  $f'(x) = i(\frac{2}{x} + 1)$ , deci  $f(x) = 2i \cdot \ln(x) + ix + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ . Substituind  $x \rightarrow z$ , rezultă  $f(z) = 2i \cdot \ln(z) + iz + C$ ,  $C \in \mathbb{C}$ . Determinăm constanta  $C$ :  $f(1+i) = -i - 3 + 2i \cdot \ln \sqrt{2} \Rightarrow 2i \cdot \ln(1+i) + i - 1 + C = -i - 3 + 2i \cdot \ln \sqrt{2}$ . Dar  $\ln(1+i) = \ln \sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , deci obținem

$$2i \cdot \ln \sqrt{2} - \frac{\pi}{2} - 4k\pi + i - 1 + C = -i - 3 + 2i \cdot \ln \sqrt{2},$$

de unde rezultă  $C = -2i - 2 + \frac{\pi}{2} + 4k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , și deci

$$f(z) = 2i(\ln z - 1) + iz - \frac{\pi}{2} + 4k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

**IV.**  $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{4 - \sin^2 x}$ . Notând  $e^{ix} = z$ , se observă că

$$\begin{aligned} I &= \int_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{4 - (\frac{z^2-1}{2iz})^2} = \int_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{(2 - \frac{z^2-1}{2iz})(2 + \frac{z^2-1}{2iz})} = \\ &= \int_{|z|=1} \frac{4iz}{(-z^2 + 4iz + 1)(z^2 + 4iz - 1)} dz. \end{aligned}$$

Căutăm singularitățile funcției  $g(z) = \frac{4iz}{(-z^2 + 4iz + 1)(z^2 + 4iz - 1)}$ . Avem

$$-z^2 + 4iz + 1 = 0 \Leftrightarrow z \in \{i(2 \pm \sqrt{3})\}, \quad z^2 + 4iz - 1 = 0 \Leftrightarrow z \in \{i(\pm\sqrt{3} - 2)\}.$$

Se observă că  $|z_1| = 2 - \sqrt{3} < 1$ ;  $|z_2| = 2 + \sqrt{3} > 1$ ;  $|z_3| = 2 - \sqrt{3} < 1$ ;  $|z_4| = 2 + \sqrt{3} > 1$ ; deci  $z_1$  și  $z_3$  sunt poli de ordinul 1 în interiorul domeniului  $|z| = 1$ . Reziduurile funcției  $g$  în cei doi poli sunt:

$$\begin{cases} \text{Rez}(g, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{4iz(z - z_1)}{-(z - z_1)(z - z_2)(z^2 + 4iz - 1)} = \frac{4iz_1}{(z_2 - z_1)(z_1^2 + 4iz_1 - 1)} = \frac{1}{4i\sqrt{3}} \\ \text{Rez}(g, z_3) = \lim_{z \rightarrow z_3} \frac{4iz(z - z_3)}{(-z^2 + 4iz + 1)(z - z_3)(z - z_4)} = \frac{4iz_3}{(-z_3^2 + 4iz_3 + 1)(z_3 - z_4)} = \frac{1}{4i\sqrt{3}}, \end{cases}$$

deci

$$I = 2\pi i(\text{Rez}(g, z_1) + \text{Rez}(g, z_3)) = 2\pi i \left( \frac{1}{4i\sqrt{3}} + \frac{1}{4i\sqrt{3}} \right) = 2\pi i \cdot \frac{2}{4i\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}.$$

**V.**  $J = \int_{|z|=R} z^2 \cdot e^{\frac{1}{z-1}} dz$ ,  $R > 0$ ,  $R \neq 1$ . Fie  $g(z) = z^2 \cdot e^{\frac{1}{z-1}}$ . Se observă că  $z = 1$

este punct singular esențial pentru  $g$ . Atunci  $\text{Rez}(g, 1) = c_{-1}$  = coeficientul lui  $\frac{1}{z-1}$  din dezvoltarea în serie Laurent a funcției  $g$  în jurul lui  $z = 1$ . Folosind dezvoltarea

$$e^{\frac{1}{z-1}} = 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \cdots,$$

obținem

$$\begin{aligned} z^2 e^{\frac{1}{z-1}} &= [(z-1+1)^2] e^{\frac{1}{z-1}} = [(z-1)^2 + 2(z-1) + 1] e^{\frac{1}{z-1}} = \\ &= [(z-1)^2 + 2(z-1) + 1] \left( 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \frac{1}{3!(z-1)^3} + \cdots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \cdots \right), \end{aligned}$$

$$\text{deci } c_{-1} = \frac{1}{3!} + \frac{2}{2!} + \frac{1}{1!} = \frac{1}{6} + 2 = \frac{13}{6}.$$




Figura 5.

Distingem două cazuri (vezi Fig. 5):

- i) Dacă  $R \in (0, 1)$ , atunci  $J = 0$  (teorema fundamentală a lui Cauchy);
- ii) Dacă  $R > 1$ , atunci  $J = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 1) = 2\pi i \cdot \frac{13}{6} = \frac{13\pi i}{3}$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza locală, anul II, profil electric, 2008-2009

**I.** Valorile proprii ale matricii  $A$  se obțin rezolvând ecuația caracteristică

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow -\lambda(\lambda + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \{-3, 0\}.$$

Atunci soluția sistemului este de forma:

$$Y = (m + nt)e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} d \\ r \\ s \end{pmatrix} = (m + nt)e^{-3t} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d \\ r \\ s \end{pmatrix}.$$

Punând condiția  $Y' = AY$ , rezultă  $n = 0$ ,  $c = -a - b$ ,  $r = s = d$ , deci fără a reduce generalitatea, pentru  $a = 1$  obținem

$$Y = e^{-3t} \begin{pmatrix} a \\ b \\ -a - b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d \\ d \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae^{-3t} + d \\ be^{-3t} + d \\ (-a - b)e^{-3t} + d \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Impunând condiția initială  $y(0) = (0, -1, 1)^t$ , rezultă

$$\begin{cases} a + d = 0 \\ b + d = -1 \\ -a - b + d = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow Y = e^{-3t} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

*Metoda 2.* Ca la metoda anterioară, aflăm  $\sigma(A) = \{0, -3\}$ . Pentru  $\lambda_1 = 0$  ( $\mu_1 = 2$ ), obținem sistemul caracteristic

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2a + b + c = 0 \\ a - 2b + c = 0 \\ a + b - 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R},$$

deci alegem  $v_1 = (1, 1, 1)^t$ . Pentru  $\lambda_2 = 3$  ( $\mu_2 = 1$ ), obținem sistemul caracteristic

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a + b + c = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

deci alegem  $v_2$  și  $v_3$  liniar independenți, spre exemplu  $v_2 = (1, 0, -1)^t$ ,  $v_3 = (0, 1, -1)^t$ .

Atunci

$$Y = ce^{0t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + ae^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + be^{-3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad c, a, b \in \mathbb{R}.$$

În continuare se procedează ca în metoda anterioară.

*Metoda 3.* Notând  $Y(t) = (x(t), y(t), z(t))^t$ , sistemul se rescrie

$$\begin{cases} x' = -2x + y + z \\ y' = x - 2y + z \\ z' = x + y - 2z \end{cases} \Rightarrow x' + y' + z' = 0 \Rightarrow x + y + z = k \Rightarrow \begin{cases} x' = -3x + k \\ y' = -3y + k \\ z' = -3z + k. \end{cases}$$

Rezolvăm ecuația diferențială liniară  $x' = -3x + k$ . Soluția ecuației omogene asociate  $x' = -3x$  este  $x = ae^{-3t}$ , iar o soluție particulară  $x_P = a(t)e^{-3t}$  va satisface ecuația neomogenă doar dacă  $a'(t)e^{-3t} = k \Leftrightarrow a'(t) = ke^{3t} \Rightarrow (t) = \frac{ke^{3t}}{3} + m$ . Alegem  $m = 0$ , deci  $x_P = \frac{k}{3}$  și deci  $x = ae^{-3t} + \frac{k}{3}$ . Analog  $y = be^{-3t} + \frac{k}{3}$ ,  $z = ce^{-3t} + \frac{k}{3}$ .

Înlocuind în prima ecuație, rezultă  $a + b + c = 0$ , și deci notând  $d = \frac{k}{3}$ , avem

$$Y(t) = (ae^{-3t} + d, be^{-3t} + d, (-a - b)e^{-3t} + d),$$

deci soluția (28). Rezolvarea continuă ca în metoda 1.

**II. b)** Rezolvăm prin reducere la absurd. Presupunem că există o soluție a ecuației date, care admite un maxim interior pozitiv. Atunci există  $x_0 \in (a, b)$ , astfel încât  $y(x_0) > 0$ ;  $y'(x_0) = 0$ ;  $y''(x_0) < 0$ , deci pentru  $x = x_0$  avem

$$r(x_0, y'(x_0))y''(x_0) + p(x_0, y'(x_0)) \cdot y'(x_0) = q(x_0, y'(x_0))y(x_0),$$

și deci  $r(x_0, 0) \cdot y''(x_0) = q(x_0, 0) \cdot y(x_0)$ , deci

$$\frac{r(x_0, 0)}{q(x_0, 0)} = \frac{y(x_0)}{y''(x_0)} < 0. \quad (29)$$

Pe de altă parte, din ipoteză,  $q(x_0, 0) > 0$ ;  $r(x_0, 0) \geq 0$ , deci

$$\frac{r(x_0, 0)}{q(x_0, 0)} \geq 0. \quad (30)$$

Din (29) și (30) rezultă contradicția. Analog se tratează cazul minimului interior negativ.

**III.** Restrângând pătratele, ecuația cercului se rescrie

$$\Gamma : x^2 + y^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \Gamma : (x + 1)^2 + y^2 = 1. \quad \text{Fie } g(z) = z^2 e^{\frac{2z}{z+1}}.$$

Rezultă că  $z = -1$  este punct singular esențial și  $z = -1$  se află în interiorul drumului  $\Gamma$ , deci  $\int_{\Gamma} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, -1)$ . Dar

$$\begin{aligned} g(z) &= z^2 e^{\frac{2z}{z+1}} = (z+1-1)^2 e^{\frac{2(z+1-1)}{z+1}} = [(z+1)^2 - 2(z+1) + 1] e^2 \cdot e^{-\frac{2}{z+1}} = \\ &= e^2 [(z+1)^2 - 2(z+1) + 1] \left[ 1 + \frac{-2}{1!(z+1)} + \frac{(-2)^2}{2!(z+1)^2} + \frac{(-2)^3}{3!(z+1)^3} + \dots \right], \end{aligned}$$

deci  $\operatorname{Rez}(g, -1) = e^2 \left( -\frac{8}{3!} - \frac{8}{2!} - \frac{2}{1!} \right) = -e^2 \cdot \frac{22}{3}$ . Rezultă  $\int_{\Gamma} g(z) dz = -\frac{44\pi i e^2}{3}$ .

**IV.** a) Notăm  $X = \operatorname{Ref} = \varphi(t)$ ,  $t = \frac{x^2+y^2}{x}$ . Pentru a putea obține  $f$  olomorfă cu  $\operatorname{Ref} = X$  dat, impunem condiția de armonicitate:  $\Delta x = \frac{\partial^2 x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial y^2} = 0$ . Avem

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial x} &= \varphi'(t) \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2}; \quad \frac{\partial x}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{2y}{x}; \\ \frac{\partial^2 x}{\partial x^2} &= \varphi''(t) \cdot \left( \frac{x^2 - y^2}{x^2} \right)^2 + \varphi'(t) \cdot \frac{2y^2}{x^3}; \quad \frac{\partial^2 x}{\partial y^2} = \varphi''(t) \cdot \frac{4y^2}{x^2} + \varphi'(t) \cdot \frac{2}{x}. \end{aligned}$$

Deci

$$\begin{aligned} \Delta x = 0 &\Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^4} + \varphi'(t) \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2} = 0 \Leftrightarrow t \cdot \varphi''(t) + \varphi'(t) \cdot 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2}{t} \Rightarrow \ln(\varphi'(t)) = -2 \ln t + \ln C_1 \Rightarrow \ln \varphi' = \ln \left( \frac{C_1}{t^2} \right) \\ &\Rightarrow \varphi'(t) = \frac{C_1}{t^2} \Rightarrow \varphi(t) = -\frac{C_1}{t} + C_2. \end{aligned}$$

Rezultă  $X = -\frac{C_1 x}{x^2 + y^2} + C_2$ . Avem

$$f'(z) = \frac{\partial X}{\partial x} - i \frac{\partial X}{\partial y} = C_1 \cdot \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - i \cdot \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} C_1.$$

Pentru  $y = 0$ , rezultă

$$f'(x) = C_1 \cdot \frac{1}{x^2} \Rightarrow f(x) = -\frac{C_1}{x} + C_3 \Rightarrow f(z) = -\frac{C_1}{z} + C_3; \quad C_1 \in \mathbb{R}, \quad C_3 \in \mathbb{C}.$$

b) Fie  $g(z) = \left( -\frac{C_1}{z} + C_3 \right)^3 \cdot \sin z = \left( -\frac{C_1^3}{z^3} + 3 \frac{C_1^2}{z^2} C_3 - 3 \frac{C_1}{z} C_3^2 + C_3^3 \right) \cdot \sin z$ . Deci  $z = 0$  este punct singular esențial pentru  $g$  și rezultă

$$g(z) = \left( -\frac{C_1^3}{z^3} + 3 \frac{C_1^2}{z^2} C_3 - 3 \frac{C_1}{z} C_3^2 + C_3^3 \right) \left( z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right),$$

deci  $\operatorname{Rez}(g, 0) = 3C_1^2 C_3$  și prin urmare  $\int_{|z|=R} g(z) dz = 6\pi i C_1^2 C_3$ .

**V.** Efectuăm schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$  și obținem

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{\left(3 + \frac{z^2+1}{2z}\right)^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{4}{i} \int_{|z|=1} \frac{z}{(z^2 + 6z + 1)^2} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{z}{(z^2 + 6z + 1)^2}$ . Atunci  $z_1 = -3 + 2\sqrt{2}$  și  $z_2 = -3 - 2\sqrt{2}$  sunt poli de ordinul 2 pentru  $g$ , dar doar  $z_1$  se află în interiorul drumului  $|z| = 1$ . Avem

$$\operatorname{Rez}(g, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \left[ (z - z_1)^2 \cdot \frac{z^2}{(z - z_1)^2 (z - z_2)^2} \right]' = \frac{-z_1 - z_2}{(z_1 - z_2)^3} = \frac{3}{64\sqrt{2}},$$

$$\text{deci } I = \frac{4}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{3}{64\sqrt{2}} = \frac{3\pi}{8\sqrt{2}}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2008-2009

**I.** a) și b) coincid cu subiectul **IV** punctul a) de la profilul electric.

**II.** a) Funcția  $f$  se rescrie:

$$f(z) = (z-1)^3 \cdot e^{\frac{1}{z-1}} = (z-1)^3 \cdot \left( 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \cdots + \frac{1}{n!(z-1)^n} + \cdots \right).$$

$$\text{Atunci } \operatorname{Rez}(f, 1) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}.$$

b)  $\sin z = i \Leftrightarrow \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = i \Leftrightarrow e^{iz} - e^{-iz} = -2$ . Notăm  $e^{iz} = a \Rightarrow a - \frac{1}{a} = -2 \Leftrightarrow a^2 + 2a - 1 = 0$  și obținem  $\Delta = 4 + 4 = 8 \Rightarrow a_1 = \frac{-2+2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} - 1$ ,  $a_2 = -\sqrt{2} - 1$ ; atunci  $e^{iz} = a_1 = \sqrt{2} - 1 \Rightarrow iz = \ln(\sqrt{2} - 1) = \ln(\sqrt{2} - 1) + i \cdot 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , deci  $z = -i \ln(\sqrt{2} - 1) + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Analog se tratează cazul  $e^{iz} = a_2$ .

**III.** Efectuăm schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$ ; rezultă

$$I_n = \int_{|z|=1} \frac{(1-a^2)z^n}{1-2a \cdot \frac{z^2+1}{2z} + a^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1-a^2}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{z^n}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a}$ . Dacă  $a = 0$ , atunci  $g(z) = \frac{z^n}{z} = z^{n-1}$  și distingem cazurile:

- pentru  $n \geq 1 \Rightarrow I_n = 0$ ;
- pentru  $n = 0 \Rightarrow g(z) = \frac{1}{z} \Rightarrow \operatorname{Rez}(g, 0) = 1 \Rightarrow I_0 = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot 1 = 2\pi$ .

Dacă  $a \neq 0$ , atunci  $-az^2 + z(a^2 + 1) - a = 0$ , deci  $z_1 = \frac{1}{a}$  și  $z_2 = a$  sunt poli de ordinul 1. Distingem cazurile:

- dacă  $|a| < 1$ , atunci  $z_2 \in \operatorname{Int}(|z|=1) \Rightarrow I_n = \frac{1-a^2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, a)$ ; dar

$$\operatorname{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{z^n}{-a(z-a)(z-\frac{1}{a})} = \frac{a^n}{1-a^2} \Rightarrow I_n = \frac{1-a^2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{a^n}{1-a^2} = 2\pi a^n;$$

- dacă  $|a| > 1$ , atunci  $z_1 \in \text{Int}(|z| = 1) \Rightarrow I_n = \frac{1-a^2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Rez}(g; 1/a)$ ; dar

$$\text{Rez} \left( g, \frac{1}{a} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{a}} \left( z - \frac{1}{a} \right) \cdot \frac{z^n}{-a(z-a)(z-\frac{1}{a})} = \frac{\frac{1}{a^n}}{-a(\frac{1}{a}-a)} = \frac{1}{a^n(a^2-1)},$$

și rezultă  $I_n = (1-a^2) \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{a^n(a^2-1)} = -\frac{2\pi}{a^n}$ ;

- cazul  $|a| = 1$  este exclus din ipoteză.

**IV.** Avem sistemul diferențial  $\begin{cases} x' + y = t \\ x + y' = 1 \end{cases}$ . Aplicăm transformarea Laplace sistemului și notăm  $\mathcal{L}[x(t)](p) = X(p)$ ,  $\mathcal{L}[y(t)](p) = Y(p)$ . Obținem

$$\begin{cases} pX(p) - 1 + Y(p) = \frac{1}{p^2} \\ X(p) + pY(p) + 1 = \frac{1}{p} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} pX(p) + Y(p) = \frac{p^2 + 1}{p^2} \\ X(p) + pY(p) = \frac{1-p}{p}. \end{cases}$$

Reducem  $Y(p)$  și rezultă  $(p^2 - 1)X(p) = \frac{p^2 + 1}{p} - \frac{1-p}{p} \Rightarrow (p^2 - 1)X(p) = p + 1$ , deci  $X(p) = \frac{p+1}{p^2-1} = \frac{1}{p-1} \Rightarrow x(t) = e^t$ . Folosind prima ecuație a sistemului, deducem  $e^t + y = t \Rightarrow y = t - e^t$ , deci soluția este  $x(t) = e^t$ ,  $y(t) = t - e^t$ .

*Metoda 2.* Sistemul se rescrie

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}}_{X'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X + \underbrace{\begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}}_b.$$

Soluția generală a sistemului omogen asociat  $X_0' = AX_0$  este  $X_0(t) = e^{At} \cdot k$ ,  $k \in \mathbb{R}^2$ . Pentru  $A$  obținem valorile proprii  $\{\pm 1\}$  și baza diagonalizatoare  $\{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ . Deoarece  $C^{-1}AC = D$ , unde  $C = [v_1, v_2] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ , rezultă  $A = CDC^{-1} \Rightarrow At = C(Dt)C^{-1}$ , deci

$$\begin{aligned} X_0 &= e^{At} = Ce^{Dt}C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t + e^{-t} & -e^t + e^{-t} \\ -e^t + e^{-t} & e^t + e^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t & -\operatorname{sh} t \\ -\operatorname{sh} t & \operatorname{ch} t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pentru  $k = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ , obținem  $X_0 = k_1 \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t \\ -\operatorname{sh} t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -\operatorname{sh} t \\ \operatorname{ch} t \end{pmatrix}$ . Același rezultat se obține și sub forma combinațiilor liniare,

$$X_0 = \alpha e^{\lambda_1 t} v_1 + \beta e^{\lambda_2 t} v_2 = \alpha e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

de unde obținem, pentru  $\alpha = \frac{k_1-k_2}{2}$ ,  $\beta = \frac{k_1+k_2}{2}$  rezultatul de sus.

Pentru a afla soluția sistemului neomogen dat, aplicăm metoda variației constanțelor. Înlocuind în sistem  $X_P(t) = e^{At} \cdot k(t)$ , obținem  $e^{At} \cdot k'(t) = b(t)$ , deci

$$k'(t) = e^{-At}b(t) = (e^{At})^{-1} \cdot b(t) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t & \operatorname{sh} t \\ \operatorname{sh} t & \operatorname{ch} t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cdot \operatorname{ch} t + \operatorname{sh} t \\ t \cdot \operatorname{sh} t + \operatorname{ch} t \end{pmatrix},$$

și prin urmare

$$k(t) = \begin{pmatrix} t \cdot \operatorname{sh} t \\ t \cdot \operatorname{ch} t \end{pmatrix} \Rightarrow X_P(t) = e^{At} k(t) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t & -\operatorname{sh} t \\ -\operatorname{sh} t & \operatorname{ch} t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \cdot \operatorname{sh} t \\ t \cdot \operatorname{ch} t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}.$$

Rezultă soluția generală a sistemului,

$$X(t) = X_0(t) + X_P(t) = k_1 \begin{pmatrix} \operatorname{ch} t \\ -\operatorname{sh} t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -\operatorname{sh} t \\ \operatorname{ch} t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix},$$

deci  $X(t) = \begin{cases} x(t) = k_1 \cdot \operatorname{ch} t - k_2 \cdot \operatorname{sh} t \\ y(t) = -k_1 \cdot \operatorname{ch} t + k_2 \cdot \operatorname{sh} t + t \end{cases}$ . Folosind condițiile inițiale, obținem

$$\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = \operatorname{ch} t + \operatorname{sh} t = e^t \\ y(t) = -\operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t + t = t - e^t. \end{cases}$$

*Metoda 3.* Eliminăm  $y$  din sistem. Derivăm prima ecuație și scădem din ecuația rezultată ecuația a doua. Obținem  $x'' - x = 0$ . Ecuația caracteristică asociată  $r^2 - 1 = 0$  are rădăcinile  $\{\pm 1\}$  cu quasipolinoamele asociate  $\{e^{\pm t}\}$ , deci soluția acestei ecuații este  $x(t) = ae^t + be^{-t}$ . Înlocuind în a doua ecuație a sistemului, rezultă  $y'(t) = 1 - (ae^t + be^{-t}) \Rightarrow y(t) = t - ae^t + be^{-t}$ . Condițiile initiale  $x(0) = 1$ ,  $y(0) = -1$  conduc la sistemul liniar

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ -a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = t - e^t. \end{cases}$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2009-2010

**I.** Ecuația algebrică  $r^3 + r^2 + 2r = 0$  are soluțiile  $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = -2$ , de unde soluția ecuației omogene este  $\bar{y}(x) = c_1 + c_2 \cdot e^x + c_3 \cdot e^{-x}$ ,  $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ . Pentru determinarea soluției particulare, folosim metoda variației constantelor, astfel căutăm soluția  $y_p(x) = c_1(x) + c_2(x) \cdot e^x + c_3(x) \cdot e^{-x}$ , unde funcțiile  $c_i(x)$  se determină rezolvând sistemul

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)e^{-2x} + c_3'(x)e^{-2x} = 0 \\ c_2'(x)e^x - c_3'(x)e^{-2x} = 0 \\ c_2'(x)e^x + 4c_3'(x)e^{-2x} = \ln(e^x + 1) \end{cases}$$

Obținem

$$c_3'(x) = \frac{1}{6}e^x \ln(1 + e^x), \quad c_2'(x) = \frac{1}{3}e^{-x} \ln(e^x + 1) \quad c_1'(x) = -\frac{1}{2} \ln(1 + e^x).$$

Pe rând, rezultă

$$\begin{aligned}
 c_3(x) &= \frac{1}{6} \int e^{2x} \ln(1 + e^x) dx \stackrel{e^x=t}{=} \frac{1}{6} \int t \ln(t+1) dt \stackrel{\text{prin părți}}{=} \\
 &= \frac{t^2 - 6}{12} \ln(t+1) - \frac{1}{4}(t-1)^2 = \frac{e^{2x} - 6}{12} \ln(e^x + 1) - \frac{1}{4}(e^x - 1)^2, \\
 c_2(x) &= \frac{1}{3} \int e^{-x} \ln(e^x + 1) dx = \frac{1}{3} \int e^{-x} (\ln(e^{-x} + 1) + 1) dx = \\
 &= \frac{1}{3} \int e^{-x} \ln(e^{-x} + 1) dx + \int x e^{-x} dx = \\
 &= \frac{1}{3} (e^{-x} + 1 - e^{-x} \ln(e^{-x} + 1)) + \frac{1}{3} e^{-x} (x+1), \\
 c_1(x) &= -\frac{1}{2} \int \ln(1 + e^x) dx \stackrel{e^x=t}{=} -\frac{1}{2} \int \frac{\ln(t+1)}{t} dt
 \end{aligned}$$

și dezvoltând în serie Taylor în jurul lui  $t = 0$  și apoi integrând, obținem

$$c_1(x) = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \cdot e^{x \cdot (n+1)}.$$

Soluția ecuației diferențiale este

$$\begin{aligned}
 y(x) = & C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-2x} - \frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} e^{x \cdot (n+1)} - \frac{1}{4} e^{-2x} (e^x - 1)^2 + \\
 & + \frac{1}{3} (2 + x + e^x - \ln(e^{-x} + 1)) + \frac{1 - 6e^{-2x}}{12} \ln(e^x + 1).
 \end{aligned}$$

Impunând condițiile Cauchy, se determină constantele  $C_1, C_2, C_3$ .

**II.** Notăm  $\operatorname{Re}(f(x)) = u(x, y)$ . Impunem condiția ca funcția  $u(x, y)$  să fie armonică. Dacă  $t = \frac{x^2+y^2}{x}$ , din armonicitate obținem  $\varphi''(t)t^2 + \varphi''(t)2t = 0$ , de unde  $\varphi(t) = \frac{-C_1}{t} + C_2$ ,  $C_{1,2} \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{C_1(x^2 - y^2)}{(x^2 - y^2)^2} - i \frac{2yC_1}{(x^2 - y^2)^2}, \\
 f'(x) &= \frac{C_1}{x^2} \Rightarrow f(x) = \frac{-C_1}{x} + C_3, \quad C_3 \in \mathbb{R}, \\
 f(z) &= \frac{C_1}{z} + C_3, \quad C_{1,3} \in \mathbb{R}.
 \end{aligned}$$

**III. a)** Folosind formula Euler, avem  $\operatorname{tg}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} - e^{-iz})} = \frac{5i}{3}$ . Notând  $e^{iz} = t$ , obținem ecuația  $8t^2 + 2 = 0$  de unde  $t = \pm \frac{i}{2}$ . Rezolvând ecuațiile  $e^{iz} = \pm \frac{i}{2}$ , obținem multimea soluțiilor

$$\left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi + i \ln 2 \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{3\pi}{2} + 2k\pi + i \ln 2 \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

b) Efectuăm substituția  $e^{ix} = z$ . Integrala devine

$$I = \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2(-3z^2 + 10iz + 3)} dz.$$

Notăm  $g(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2(-3z^2 + 10iz + 3)}$ . Pentru  $g$ ,  $z_1 = 0$  este pol de ordinul II,  $z_2 = \frac{i}{3}$  și  $z_3 = 3i$  sunt poli de ordinul I. Folosind teorema reziduurilor, rezultă  $I = \pi i(Rez(g, 0) + Rez(g, \frac{i}{3}))$ . Dar  $Rez(g, 0) = \frac{-10i}{9}$ , și  $Rez(g, \frac{i}{3}) = \frac{8i}{9}$ , deci

$$I = \pi i \left( \frac{-10i}{9} + \frac{8i}{2} \right) = \pi i \frac{-2i}{9} = \frac{2\pi}{9}.$$

**IV.** a) Dacă  $r < 1$ , atunci integrala se anulează (teorema fundamentală Cauchy).

Dacă  $r = 1$ , folosind teorema semireziduurilor, obținem  $I = \pi i \operatorname{Rez} \left( \frac{z^2 e^z}{(z-1)^{n+1}}, 1 \right)$ .

Cum  $z = 1$  este pol de ordin  $n+1$ , rezultă că

$$\operatorname{Rez} \left( \frac{z^2 \cdot e^z}{(z-1)^{n+1}}, 1 \right) = \frac{1}{n!} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} (z^2 \cdot e^z)^{(n)} \stackrel{\text{inductie}}{=} \frac{(n^2 + n + 1) \cdot e}{n!}.$$

Deci  $I = \frac{\pi \cdot i \cdot (n^2 + n + 1) \cdot e}{n!}$ . Dacă  $r > 1$ , atunci folosim teorema reziduurilor și obținem

$$I = 2\pi i \operatorname{Rez} \left( \frac{z^2 e^z}{(z-1)^{n+1}}, 1 \right) = \frac{2\pi i (n^2 + n + 1) e}{n!}.$$

b) Observăm că funcția  $f(x) = \frac{x \sin x}{x^2 + a^2}$  este pară, deci  $\int_0^\infty f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ .

Notăm

$$J = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} \sin x dx, \quad I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} \cos x dx.$$

Calculăm

$$I + iJ = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot e^{ix}}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \sum_{\substack{z_k - \text{poli} \\ \operatorname{Im}(z_k) > 0}} \operatorname{Rez} \left( \frac{z \cdot e^{iz}}{z^2 + a^2}, z_k \right).$$

Dacă  $a > 0$ , atunci

$$I + iJ = \pi i \operatorname{Rez} \left( \frac{ze^{iz}}{z^2 + a^2}, ai \right) = \pi i \cdot \lim_{z \rightarrow ai} \frac{ze^{iz}}{z + ai} = \pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} \Rightarrow I = 0, \quad J = \frac{\pi e^{-a}}{2}.$$

Dacă  $a = 0$ , atunci

$$I + iJ = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \frac{1}{2} \cdot \pi i \cdot \operatorname{Rez} \left( \frac{e^{iz}}{z}, 0 \right) = \frac{\pi i}{2} \Rightarrow I = 0, \quad J = \frac{\pi}{2}.$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profil mecanic, 2009-2010

**I.** a) Impunem condiția de armonicitate  $\Delta F = 0$ . Obținem  $F''(t)t + F'(t) = 0$ , de unde  $F(t) = 2c_1\sqrt{t} + c_2$ ,  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ . Rezultă

$$F(t(x, y)) = 2c_1\sqrt{\sqrt{x^2 + y^2} - x} + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Prin calcul direct, obținem

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{c_1}{\sqrt{\sqrt{x^2 + y^2} - x}} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \right) - i \frac{c_1}{\sqrt{\sqrt{x^2 + y^2} - x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Pentru  $y = 0$ , avem  $f'(z) = \frac{c_1}{\sqrt{|x|-x}} \left( \frac{x}{|x|-1} \right)$ . Cum  $x \geq 0$  nu este posibil, rezultă  $x < 0$ , deci

$$f'(x) = \frac{c_1}{\sqrt{-2x}}(-2) \Rightarrow f(z) = 2\sqrt{2}c_1\sqrt{-z} + c_3, \quad c_3 \in \mathbb{R}.$$

**II.** a)  $z = 2$  este punct singular esențial al funcției  $f$ , deci  $Rez(f, 2) = c_{-1}$  (coeficientul seriei Laurent). Cum

$$\begin{aligned} f(z) &= [(z-2)+2]^3 \cdot \left( 1 + \frac{1}{(z-2)1!} + \frac{1}{(z-2)^22!} + \dots + \frac{1}{(z-2)^nn!} + \dots \right) = \\ &= [(z-2)^3 + 6(z-2)^2 + 12(z-2) + 8] \cdot \\ &\quad \cdot \left( 1 + \frac{1}{(z-2)1!} + \frac{1}{(z-2)^22!} + \dots + \frac{1}{(z-2)^nn!} + \dots \right), \end{aligned}$$

$$\text{rezultă } c_{-1} = \frac{1}{4!} + \frac{6}{3!} + \frac{12}{2!} + \frac{8}{1!} = \frac{361}{24}.$$

b) Rezolvare identică cu subiectul 3) a) de la profilul electric.

**III.** Obținem  $I = \int_{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1} \frac{\operatorname{tg}(z)}{z^2(z^2+1)} dz$ . Pentru funcția

$$g(z) = \frac{\operatorname{tg} z}{z^2(z^2+1)} = \frac{\sin z}{z^2(z^2+1)\cos z},$$

punctele singulare sunt  $z = 0$  (pol de ordinul I) și soluțiile ecuației  $\cos z = 0$ .

$$\cos z = 0 \Leftrightarrow \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 0 \stackrel{e^{iz} = t}{\Leftrightarrow} t^2 + 1 = 0 \Rightarrow t = \pm i.$$

$e^{iz} = i \Rightarrow iz = \operatorname{Ln} i = i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{R}$  de unde  $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (poli de ordinul I și)  $z = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (poli de ordinul I). Dar ne sunt necesare doar punctele singulare aflate în interiorul elipsei, deci

$$I = 2\pi i(Rez(g, 0)) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} z}{z(z^2+1)} = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} z}{z} \frac{1}{z^2+1} = 2\pi i.$$

**IV.** Avem

$$J = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} dx \stackrel{e^{ix}=z}{=} \frac{1}{2i} \int_{|z|=1} \frac{z^2 - 2az + 1}{z[-az^2 + z(a^2 + 1) - a]} dz.$$

Funcția  $g(z) = \frac{z^2 - 2az + 1}{z[-az^2 + z(a^2 + 1) - a]}$  are trei puncte singulare:  $z_1 = 0, z_2 = \frac{1}{a}$  și  $z_3 = a$ . Impunem condiția  $a \neq 0$ . Cum  $|a| < 1$ , folosind teorema rezidurilor, avem

$$J = \frac{1}{2i} 2\pi i (Rez(g, 0) + Rez(g, a)) = \pi \left( -\frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right) = 0.$$

$$\text{Dacă } a = 0, \text{ atunci } J = \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

**V.** Folosim transformarea Laplace:

$$\begin{cases} p^2 \mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] = \frac{1}{p^2} \\ p^2 \mathcal{L}[y] - \mathcal{L}[x] = \frac{1}{p}. \end{cases}$$

Rezultă că

$$\mathcal{L}[x] = \frac{1}{p(p-1)(p^2+1)} = -\frac{1}{p} + \frac{1}{2(p-1)} + \frac{p}{p^2+1} - \frac{1}{p^2+1},$$

de unde  $x = -t + \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} \sin t$ . Analog,  $\mathcal{L}[y] = \frac{p^2-p+1}{p^2(p-1)(p^2+1)}$  și descompunând în fracții simple, determinăm  $y$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”

Faza locală, anul II, profil electric, 2010-2011

**I. Metoda I.** Determinăm valorile proprii ale matricei  $A$ . Din ecuația caracteristică  $\det(A - \lambda I_3) = 0$ , rezultă valorile proprii (cu multiplicitățile algebrice aferente)  $\lambda_1 = 1$ ,  $m_a(\lambda_1) = 2$  și  $\lambda_2 = -1$ ,  $m_a(\lambda_2) = 1$ . Vectorii proprii ce formează baze în cele două spații proprii asociate acestor valori proprii sunt  $v_{11} = (1, 0, 1)^t, v_{12} = (0, 1, 0)^t; v_{21} = (-1, 0, 1)^t$ . Deci soluția generală a sistemului diferențial este

$$Y = C_1 e^x (1, 0, 1)^t + C_2 x e^x (0, 1, 0)^t + C_3 e^{-x} (-1, 0, 1)^t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

*Metoda 2.* Folosim transformarea Laplace. Astfel,

$$\begin{cases} \mathcal{L}[y_1'] = \mathcal{L}[y_3] \\ \mathcal{L}[y_2'] = \mathcal{L}[y_2] \\ \mathcal{L}[y_3'] = \mathcal{L}[y_1] \end{cases}, \quad \text{unde} \quad \begin{cases} y_1(0) = a \\ y_2(0) = b \\ y_3(0) = c \end{cases}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Din ecuația a doua rezultă  $\mathcal{L}[y_2] = \frac{b}{p-1}$ , de unde  $y_2 = b e^x$ . Obținem

$$\begin{cases} p\mathcal{L}[y_1] - a = \mathcal{L}[y_3] \\ p\mathcal{L}[y_3] - c = \mathcal{L}[y_1] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{L}[y_3] = \frac{a+cp}{p^2-1} \\ \mathcal{L}[y_1] = \frac{ap+c}{p^2-1}. \end{cases}$$

Rezultă deci  $y_3 = \frac{c-a}{2} \cdot e^x + \frac{a+c}{2} e^{-x}$ , iar  $y_1 = \frac{a+c}{2} e^x + \frac{a-c}{2} e^{-x}$ .

*Metoda 3.* Sistemul diferențial poate fi scris sub forma  $\begin{cases} y_1' = y_3 \\ y_2' = y_2 \\ y_3' = y_1 \end{cases}$ . Din ecuația

a doua, rezultă  $\frac{y_2'}{y_2} = 1$ , deci  $\ln y_2 = x + \ln C_1 \Rightarrow y_2 = C_1 \cdot e^x$ . Prima și a treia ecuație conduc la  $y_3'' = y_3 \Leftrightarrow y_3'' - y_3 = 0$ . Ecuația algebrică asociată  $r^2 - 1 = 0$  are ca rădăcini  $r_1 = 1$  și  $r_2 = -1$ , de unde  $y_3 = C_2 e^x + C_3 e^{-x}$ . Atunci

$$y_1 = y_3' = C_2 e^x - C_3 e^{-x}, \quad C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

**II.** a) Derivăm ecuația în raport cu  $x$ . Obținem

$$2xy'' + (x^2 + 1)y''' - 2y' - 2xy'' + 2y' = 2x \Leftrightarrow (x^2 + 1)y''' = 2x \Leftrightarrow y''' = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Integrând, obținem  $y'' = \ln(x^2 + 1) + C_1$ ,  $C_1 \in \mathbb{R}$  care conduce la

$$y_1' = x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \operatorname{arctg} x + C_1 x + C_2, \quad C_2 \in \mathbb{R},$$

și deci, în final,

$$y = \frac{x^2 - 1}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) - \frac{3x^2}{2} + 2x \operatorname{arctg} x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 \cdot x + C_3.$$

Verificând ecuația inițială, rezultă  $C_1 + C_3 = 1$ , de unde  $C_3 = 1 - C_1$ . Prin urmare

$$y = \frac{x^2 - 1}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) - \frac{3x^2}{2} + 2x \operatorname{arctg} x + 1 + C_1 \left( \frac{x^2}{2} - 1 \right) + C_2 \cdot x.$$

b) Ecuația  $x^2 y'' + xy' + \lambda y = 0$  este de tip Euler. Folosind substituția  $y(x) = z(\ln x)$ , obținem  $z''(\ln x) + \lambda z(\ln x) = 0$ . Notând  $\ln x = t$ , obținem ecuația diferențială de ordinul 2, cu coeficienți constanti, liniară și omogenă  $z''(t) + \lambda z(t) = 0$ . Rezolvarea ecuației algebrice  $r^2 + \lambda = 0$  conduce la cazurile:  $\lambda < 0$ ,  $\lambda = 0$ ,  $\lambda > 0$ . Examinăm aceste cazuri.

Cazul I.  $\lambda < 0 \Rightarrow r^2 = -\lambda \Rightarrow r_{1,2} = \pm\sqrt{-\lambda}$ , deci

$$z(t) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}t} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Rezultă  $y(x) = C_1 x^{\sqrt{-\lambda}} + C_2 x^{-\sqrt{-\lambda}}$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ . Impunând condițiile inițiale, obținem  $C_1 = C_2 = 0$ .

Cazul II.  $\lambda = 0 \Rightarrow r = 0$ , deci  $z(t) = C_1 + C_2 t$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  de unde obținem  $y(x) = C_1 + C_2 \ln(x)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ . Impunând condițiile inițiale, rezultă  $C_1 = C_2 = 0$ .

Cazul III.  $\lambda > 0 \Rightarrow r^2 = -\lambda \Rightarrow r_{1,2} = \pm i\sqrt{\lambda}$ , deci

$$z(t) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}t) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

de unde obținem  $y(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} \ln x)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ . Impunând condițiile inițiale, rezultă sistemul

$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_1 \cos(\sqrt{\lambda}) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 \sin(\sqrt{\lambda}) = 0. \end{cases}$$

Dacă  $\lambda \in \{k^2\pi^2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ , atunci  $C_2$  nu este neapărat nulă, deci soluția astfel determinată nu este identic nulă pe intervalul  $(0, \infty)$ .

**III.** Avem  $I = \int_{\Gamma:|z|^2=2 \operatorname{Re} z=0} \frac{z^3 e^{z/(z-1)}}{(z-1)^2} dz$ . Drumul  $\Gamma : |z|^2 - 2 \operatorname{Re} z = 0$  este cercul de centru  $(1, 0)$  și rază 1. Fie  $f(z) = \frac{z^3 e^{z/(z-1)}}{(z-1)^2}$ . Se observă că  $z_0 = 1$  este singurul punct singular și este punct singular esențial. Din teorema reziduurilor, rezultă  $I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(f, 1)$ . Atunci

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{(z-1+1)^3}{(z-1)^2} \cdot e^{1+\frac{1}{z-1}} = \frac{(z-1)^3 + 3(z-1)^2 + 3(z-1) + 1}{(z-1)^2} \cdot e \cdot e^{\frac{1}{z-1}} \\ &= e \left[ (z-1) + 3 + 3 \cdot \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2} \right] \cdot \left( 1 + \frac{1}{1!(z-1)} + \frac{1}{2!(z-1)^2} + \dots \right), \end{aligned}$$

deci  $\operatorname{Rez}(f, 1) = e \left( \frac{1}{2!} + \frac{3}{1!} + 3 \right) = \frac{13e}{2}$  și  $I = 13i\pi e$ .

**IV.** Fie  $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \cos(nx)}{13 - 12 \cos x} dx$  și  $J_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \sin(nx)}{13 - 12 \cos x} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Calculăm  $I_n + iJ_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \cdot e^{inx}}{13 - 12 \cos x} dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Folosind substituția  $e^{ix} = z$ , obținem

$$I_n + iJ_n = \int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)z^{n-1}}{2i(13z - 6z^2 - 6)} dz = \frac{1}{2i} \int_{|z|=1} g(z) dz.$$

Funcția  $g(z) = \frac{(z^2 + 1)z^{n-1}}{13z - 6z^2 - 6}$  are: 1) două puncte singulare:  $z_1 = \frac{2}{3}, z_2 = \frac{3}{2}$ , dacă  $n \geq 1$ ; 2) trei puncte singulare  $z_1 = \frac{2}{3}, z_2 = \frac{3}{2}, z_3 = 0$ , dacă  $n = 0$ .

Cazul 1) Dacă  $n \geq 1$ , atunci

$$I_n + iJ_n = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Rez} \left( g, \frac{2}{3} \right) = \pi \operatorname{Rez} \left( g, \frac{2}{3} \right) = \frac{13}{45} \cdot \left( \frac{2}{3} \right)^{n-1} \cdot \pi.$$

Cazul 2) Dacă  $n = 0$ , atunci

$$I_0 + iJ_0 = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \left[ \operatorname{Rez} \left( g, \frac{2}{3} \right) + \operatorname{Rez} (g, 0) \right] = \pi \left( \frac{13}{30} - \frac{1}{6} \right) = \frac{4\pi}{15}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2010-2011

**I.** Funcțiile  $u(x, y)$  și  $v(x, y)$  trebuie să fie armonice. Obținem

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} = F'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = F'(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right), \quad (31)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = F'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = F'(t) \cdot \frac{1}{x}, \quad (32)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = F''(t) \cdot \frac{y^2}{x^4} + F'(t) \frac{2y}{x^3}, \quad (33)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = F''(t) \cdot \frac{1}{x^2}. \quad (34)$$

Dar  $\Delta u = 0$  și  $\Delta v = 0$ , deci suma expresiilor (33) și (34) este nulă. Rezultă deci

$$\frac{1}{x^2} \cdot F''(t) \left( \frac{y^2}{x^2} + 1 \right) + F'(t) \cdot \frac{2y}{x^3} = 0 \Rightarrow F''(t)(t^2 + 1) + F'(t) \cdot 2t = 0.$$

Integrând, rezultă  $\ln F'(t) = -\ln(t^2 + 1) + \ln C_1$ ,  $C_1 \in \mathbb{R}$ , deci

$$F'(t) = \frac{C_1}{t^2 + 1} \Rightarrow F(t) = C_1 \operatorname{arctg} t + C_2, \quad C_2 \in \mathbb{R}.$$

Scăzând din (31) expresia (32) înmulțită cu  $i$ , rezultă

$$\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{C_1 x^2}{x^2 + y^2} \left( -\frac{y}{x^2} - i \frac{1}{x} \right).$$

Dar  $\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = f'(z)$  și  $\frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = f'(z)$ , deci  $f'(z) - i f'(z) = \frac{C_1 x^2}{y^2 + x^2} \left( -\frac{y}{x^2} - i \frac{1}{x} \right)$ . Pentru  $y = 0$ , avem  $f'(x)(1-i) = C_1 \left( -\frac{i}{x} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{-C_1 i}{x(1-i)} = \frac{C_3}{x}$ , unde  $C_3 = \frac{-C_1 i}{1-i}$ . Atunci  $f(x) = C_3 \ln x + C_4$ , deci  $f(z) = C_3 \ln z + C_4$ .

**II. a)** Avem  $f(z) = (z-3+3)^3 \cdot e^{1/(z-3)}$ , deci

$$f(z) = [(z-3)^3 + 9(z-3)^2 + 27(z-3) + 27] \cdot \left[ 1 + \frac{1}{1!(z-3)} + \frac{1}{2!(z-3)^2} + \dots \right],$$

de unde rezultă  $\operatorname{Rez}(f, 3) = \frac{1}{4!} + \frac{9}{3!} + \frac{27}{2!} + \frac{27}{1!} = \frac{303}{8}$ .

b) Folosind formula lui Euler  $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$  și substituția  $e^{iz} = t$ , obținem  $t^2 + 4t - 1 = 0$ , de unde  $t_1 = \frac{-4+2\sqrt{5}}{2} = -2 + \sqrt{5}$  și  $t_2 = -2 - \sqrt{5}$ . De asemenea,  $e^{iz} = -2 \pm \sqrt{5}$  implică  $iz = \operatorname{Ln}(-2 \pm \sqrt{5}) = \operatorname{Ln}| -2 \pm \sqrt{5} | + i \cdot k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Considerând ramura principală, rezultă  $z = -i \operatorname{Ln}| -2 \pm \sqrt{5} |$ .

**III.** Ecuația  $9x^2 + 25y^2 = 225$  descrie o elipsă de ecuație  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Punctele singulare ale funcției  $f(z) = \frac{\sin z}{z^2(z^2+4)}$  sunt  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 2i$ ,  $z_3 = -2i$ . Folosind teorema reziduurilor, rezultă că  $I = 2\pi i(\operatorname{Rez}(f, 0) + \operatorname{Rez}(f, 2i) + \operatorname{Rez}(f, -2i))$ . Cum toate punctele singulare sunt poli de ordinul 1, rezultă

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \left( \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \cdot \frac{1}{z^2 + 4} + \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{\sin z}{z^2(z + 2i)} + \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{\sin z}{z^2(z - 2i)} \right) \\ &= 2\pi i \left( \frac{1}{4} + \frac{\sin(2i)}{-16i} + \frac{\sin(-2i)}{16i} \right) = 2\pi i \left( \frac{1}{4} + \frac{e^{2i} - e^{-2i}}{16} \right). \end{aligned}$$

**IV.** Considerăm integrala  $J_n = \int_0^{2\pi} \frac{\sin(nx)}{b - ia \cos x} dx$ ,  $a > 0, b > 0, x \in \mathbb{N}$ .

Calculând  $I_n + iJ_n$ , obținem  $\int_0^{2\pi} \frac{e^{inx}}{b - ia \cos x} dx$ . Folosim substituția  $e^{ix} = z$  și rezultă  $I_n + iJ_n = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{2zb - ia(z^2 + 1)} dz$ . Fie  $g(z) = \frac{z^n}{2zb - ia(z^2 + 1)}$ . Ecuația  $-iaz^2 + 2zb - ia = 0$  are discriminantul  $\Delta = 4(a^2 + b^2)$ , și rădăcinile  $z_1 = \frac{-b + \sqrt{a^2 + b^2}}{ia}$  și  $z_2 = \frac{-b - \sqrt{a^2 + b^2}}{ia}$ , care sunt puncte singulare ale lui  $g$ . Cum  $a > 0, b > 0$ ,

rezultă că  $|z_1| < 1$  și  $|z_2| > 1$ , deci  $I_n + iJ_n = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, z_1)$ . Cum  $z_1$  este pol de ordinul I, avem

$$\operatorname{Rez}(g, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^n}{-ia(z - z_2)} = \frac{z_1^n}{-ia(z_1 - z_2)} = \frac{\left(\frac{-b+\sqrt{a^2+b^2}}{ia}\right)^n}{-ia \cdot \frac{2\sqrt{a^2+b^2}}{ia}} = -\frac{(-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{i^n \cdot a^n \cdot 2\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Atunci

$$\begin{aligned} I_n + iJ_n &= 4\pi \left( -\frac{(-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{i^n \cdot a^n \cdot 2\sqrt{a^2+b^2}} \right) = -\frac{2\pi(-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{i^n \cdot a^n \cdot 2\sqrt{a^2+b^2}} = \\ &= \frac{2\pi i^n (-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{a^n \sqrt{a^2+b^2}} = \frac{2\pi \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)^n (-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{a^n \sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{2\pi \left( \cos \frac{n\pi}{2} + i \sin \frac{n\pi}{2} \right) (-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{a^n \sqrt{a^2+b^2}}, \end{aligned}$$

$$\text{de unde } I_n = \frac{2\pi \cos \frac{n\pi}{2} (-b+\sqrt{a^2+b^2})^n}{a^n \sqrt{a^2+b^2}}.$$

**V. Metoda 1.** Rezolvăm ecuația omogenă atașată. Din ecuația algebrică asociată  $r^2 + 4 = 0$ , rezultă  $r_1 = 2i$  și  $r_2 = -2i$ , de unde soluția ecuației omogene este  $y_{om} = C_1 \cdot \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ . Căutăm o soluție particulară de forma  $y_p = C_1(t) \cos(2t) + C_2(t) \sin(2t)$  folosind metoda variației constanțelor. Obținem

$$\begin{cases} C_1'(t) \cos(2t) + C_2'(t) \sin(2t) = 0 \\ -2C_1'(t) \sin(2t) + 2C_2'(t) \cos(2t) = 4(\cos(2t) - \sin(2t)) \end{cases}$$

sistem liniar care se rezolvă în raport cu  $C_{1,2}(t)$  și apoi se integrează

$$\begin{cases} C_2'(t) = 2 \cos^2(2t) - \sin(4t) \\ C_1'(t) = 2 \sin^2(2t) - \sin(4t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2(t) = t + \frac{\sin(4t) + \cos(4t)}{4} \\ C_1(t) = t + \frac{\cos(4t) - \sin(4t)}{4} \end{cases},$$

de unde rezultă

$$\begin{aligned} y_p &= t \cos 2t + t \sin 2t + \frac{\cos(4t) \cos(2t) - \sin(4t) \cos(2t) + \sin(4t) \sin(2t) + \cos(4t) \sin(2t)}{4} \\ &= t \cos 2t + t \sin 2t + \frac{\cos(4t-2t) + \sin(2t-4t)}{4} = t \cos 2t + t \sin 2t + \frac{\cos 2t - \sin 2t}{4}. \end{aligned}$$

Soluția generală este  $y = y_{om} + y_p$ . Impunând condițiile initiale, obținem sistemul  $\begin{cases} C_1 + \frac{1}{4} = 1 \\ 2C_2 + 1 + \frac{1}{2} = 3 \end{cases}$ , de unde  $C_1 = \frac{3}{4}$  și  $C_2 = \frac{3}{4}$ .

**Metoda 2.** Se folosește transformarea Laplace.

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza locală, anul II, profilele electric și mecanic, 2011-2012

**I. a)** Impunem condiția  $\Delta\varphi = 0$ . Obținem  $9\varphi''(t)(x^2+y^2)^2 = 0$ , de unde  $\varphi''(t) = 0$  și  $\varphi(t) = at + b$ ,  $a, b$  constante reale.

b)  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = a(3x^2 - 3y^2) + 6axy$ , de unde  $f'(x) = 3ax^2$ , și deci rezultă  $f(z) = az^3 + c$ , unde  $c$  este o constantă complexă.

**II.** a) Avem  $\frac{z}{\sin z} = \frac{z - \pi + \pi}{\sin(z - \pi + \pi)} = \frac{(z - \pi) + \pi}{-\sin(z - \pi)}$ , deci

$$\frac{z}{\sin z} = \frac{(z - \pi) + \pi}{-(z - \pi) \left( 1 - \frac{(z - \pi)^2}{3!} + \frac{(z - \pi)^4}{5!} - \dots \right)} = c_{-1} \frac{1}{z - \pi} + c_0 + c_1(z - \pi) + \dots,$$

de unde  $c_{-1} = -\pi$  și  $c_0 = -1$ .

b) Ecuatia  $\sin z = 0$  are soluțiile  $z = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , dar în interiorul drumului cerut se află doar  $\pi$ . Cum anterior am obținut dezvoltarea în serie Laurent a funcției în jurul lui  $\pi$ , rezultă că integrala este egală cu  $2\pi i \operatorname{Rez}(g, \pi) = 2\pi i c_{-1} = -2\pi^2 i$ .

**III.** Calculăm  $I = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^n e^{int} dt$ . Făcând schimbarea de variabilă  $e^{it} = z$ , integrala devine

$$I = \int_{|z|=1} \left( 1 - \frac{z^2 + 1}{2z} \right)^n \cdot z^n \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2^n i} \int_{|z|=1} \frac{(2z - z^2 - 1)^n}{z} dz = \frac{1}{2^n i} \cdot 2\pi i \cdot (-1)^n = \pi \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}.$$

Integrala cerută este partea imaginată a lui  $I$ , deci 0.

**IV.** Obținem, folosind fie metoda valorilor proprii, fie metoda transformării Laplace,  $y = 2 \sin t - 2t \cos t$  și  $x = t \sin t - t \cos t + \sin t$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2012-2013

**I.** Apare discuția după R. Dacă  $R < 1$ , integrala este 0 (Teorema fundamentală Cauchy). Dacă  $R > 1$ ,  $I = 2\pi i \operatorname{Rez}(f, 1)$ . Cum  $z = 1$  este punct singular esențial, aflăm dezvoltarea în serie Laurent a funcției în jurul acestui punct. Astfel,

$$\begin{aligned} (z - 1)^{2012} \cos \left( \frac{\pi}{4} \cdot \frac{z - 1 + 1}{z - 1} \right) &= (z - 1)^{2012} \cos \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \frac{1}{z - 1} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (z - 1)^{2012} \left( \cos \left( \frac{\pi}{4} \frac{1}{z - 1} \right) - \sin \left( \frac{\pi}{4} \frac{1}{z - 1} \right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (z - 1)^{2012} \left( \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(\pi/4)^{2n}}{(z - 1)^{2n} (2n)!} - \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(\pi/4)^{2n+1}}{(z - 1)^{2n+1} (2n+1)!} \right), \end{aligned}$$

de unde  $\operatorname{Rez}(f, 1) = c_{-1} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left( \frac{\pi}{4} \right)^{2013} \frac{1}{2013!}$  și  $I = -\frac{i\pi^{2014}\sqrt{2}}{4^{2013}2013!}$ .

**II.** a) Din condiția de armonicitate rezultă  $a = b$ .

b) Notăm cu  $t(x, y) = x^2 - y^2$ . Impunând condiția  $\Delta \operatorname{Re} f = 0$ , obținem  $\varphi''(t) = 0$ , de unde  $\varphi(t) = At + B$ ,  $A, B \in \mathbb{R}$ . Se obține  $f(z) = aze^z + Az^2 + C$ ,  $C \in \mathbb{C}$ . Atunci  $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\cos 2x + 1)}{x^2 - 6x + 13} dx = I_1 + I_2$ , unde

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 - 6x + 13} dx, \quad I_2 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{x^2 - 6x + 13} dx.$$

**III.** Avem

$$\begin{aligned} I_1 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{2x - 6 + 6}{x^2 - 6x + 13} dx = \frac{1}{4} \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{\varepsilon^2 - 6\varepsilon + 13}{\varepsilon^2 + 6\varepsilon + 13} \right) + \\ &+ \frac{3}{4} \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \left( \operatorname{arctg} \left( \frac{\varepsilon - 3}{2} \right) - \operatorname{arctg} \left( \frac{-\varepsilon - 3}{2} \right) \right) = 0 + \frac{3}{4} \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

Pentru calculul integralei  $I_2$ , considerăm integrala  $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{2ix}}{x^2 - 6x + 13} dx$ . Pentru  $f(z) = \frac{ze^{2iz}}{z^2 - 6z + 13}$ , punctele singulare sunt  $3 \pm 2i$ , poli de ordinul 1. Cum doar  $3 + 2i$  este în semiplanul superior și  $\operatorname{Rez}(f, 3+2i) = \frac{3+2i}{4i} e^{6i-4}$ , rezultă  $J = \frac{\pi}{2} (3+2i) e^{6i-4}$ . Dar  $I_2 = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(J)$ , deci  $I_2 = \frac{\pi}{4} e^{-4} (3 \cos 6 - 2 \sin 6)$ .

**IV.** a) Valorile proprii sunt  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ ,  $\lambda_3 = 14$ , iar vectorii proprii corespunzători acestora sunt  $v_1 = (3, 0, 2)^t$ ,  $v_2 = (0, 3, 1)^t$ , respectiv  $v_3 = (2, 1, -3)^t$ . Soluția generală este

$$y_1(t) = 3C_1 + 2C_3 e^{14t}, \quad y_2(t) = 3C_2 + C_3 e^{14t}, \quad y_3(t) = 2C_1 + C_2 - 3C_3 e^{14t}.$$

b)  $\sin z = 5C_1 + 4C_2 = 10$ , de unde  $z \in \{\ln(10 \pm 3\sqrt{11}) + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2012-2013

**I.** A se vedea problema I de la profilul electric.

**II.** a) Din condiția de armonicitate rezultă  $a = b$ .

b) Obținem  $f(z) = aze^z + c$ , unde  $c$  este o constantă complexă.

**III.** Se cere  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(\frac{\pi}{2}x)}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$ . Calculăm  $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{i\frac{\pi}{2}x}}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$ . Pentru  $f(z) = \frac{ze^{i\frac{\pi}{2}z}}{z^4 + 2z^2 + 1}$ ,  $z = i$  este singurul punct singular aflat în semiplanul superior și este pol de ordin doi. Avem  $\operatorname{Rez}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{ze^{i\frac{\pi}{2}z}}{(z+i)^2} \right)' = \frac{\pi e^{-\frac{\pi}{2}}}{8}$ . Integrala  $J = 2\pi i \operatorname{Rez}(f, i)$ , iar  $I = \operatorname{Im}(J) = \frac{\pi^2}{4} e^{-\frac{\pi}{2}}$ .

**IV.** Valorile proprii sunt  $\lambda_1 = -2$ ,  $\lambda_2 = 2$ ,  $\lambda_3 = -1$ , iar vectorii proprii corespunzător acestora sunt  $v_1 = (1, -1, 0)^t$ ,  $v_2 = (1, 1, 2)^t$ , respectiv  $v_3 = (-1, -1, 1)^t$ . Atunci soluția generală a sistemului este  $Y(t) = C_1 e^{-2t} v_1 + C_2 e^{2t} v_2 + C_3 e^{-t} v_3$ . Impunând condițiile inițiale, se determină constantele  $C_i$ ,  $i = \overline{1, 3}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil electric, 2013-2014

**I.** Ecuația  $z^3 \sin z = 0$  are soluțiile  $z = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . În interiorul drumului  $|z| = 7$  se află  $z = 0$ , care este pol de ordin 4,  $z = \pm\pi$  și  $z = \pm 2\pi$ , care sunt poli de ordin 1. Avem

$$\begin{aligned} \operatorname{Rez}(f, \pi) &= \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) \frac{1}{z^3 \sin z} = \frac{1}{\pi^3} \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z - \pi}{\sin(z - \pi + \pi)} = \\ &= \frac{1}{\pi^3} \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{z - \pi}{-\sin(z - \pi)} = -\frac{1}{\pi^3}. \end{aligned}$$

Analog,  $\operatorname{Rez}(f, -\pi) = \frac{1}{\pi^3}$ ,  $\operatorname{Rez}(f, 2\pi) = -\frac{1}{8\pi^3}$ , iar  $\operatorname{Rez}(f, -2\pi) = \frac{1}{8\pi^3}$ . Pentru aflarea reziduului în 0, aflăm dezvoltarea în serie Laurent a funcției în jurul lui 0. Astfel,  $\frac{1}{z^3 \sin z} = \frac{1}{z^3 \cdot z \cdot (1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots)} = \frac{1}{z^4} (a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots)$ . Obținem  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ ,  $a_2 - \frac{a_0}{3!} = 0 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{6}$ ,  $a_3 - \frac{a_1}{3!} \Rightarrow a_3 = 0$ ,  $a_4 - \frac{a_2}{3!} \Rightarrow a_4 = \frac{1}{36}$ , etc. Deci  $\operatorname{Rez}(f, 0) = a_3 = 0$ . Integrala este 0.

**II.** a) Din  $\Delta F = 0$ , rezultă  $a - b + (b^2 - a^2) \cos(ax) \operatorname{sh}(by) = 0$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , de unde  $a = b$ .

b) Cum  $u, v$  sunt funcții armonice,  $3u + 5v$  este tot o funcție armonică, deci  $a = b$ .

Derivând în raport cu  $x$  și  $y$ , obținem sistemul  $\begin{cases} 3\frac{\partial u}{\partial x} + 5\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial x} \\ 3\frac{\partial u}{\partial y} + 5\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y}. \end{cases}$

Folosind relațiile Cauchy-Riemann, sistemul este echivalent cu  $\begin{cases} 3\frac{\partial u}{\partial x} - 5\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial x} \\ 3\frac{\partial u}{\partial y} + 5\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \end{cases}$

de unde  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{3\frac{\partial F}{\partial x} + 5\frac{\partial F}{\partial y}}{34}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{3\frac{\partial F}{\partial y} - 5\frac{\partial F}{\partial x}}{34}$ . Atunci  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y}$ , iar pentru  $y = 0$ , obținem  $f'(x) = \frac{6ax + 5a \cos ax}{34} - i\frac{3ax \cos ax - 10ax}{34}$  și

$$f(x) = \frac{ax^2}{34}(3 + 5i) + \frac{\sin ax}{34}(5 - 3i) + \mathcal{C}.$$

Deoarece  $f(0) = 0$ , rezultă  $f(z) = \frac{az^2}{34}(3 + 5i) + \frac{\sin az}{34}(5 - 3i)$ .

**III.** Calculăm

$$J_k = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(x^2 + 1)^2} dx = 2\pi i \operatorname{Rez} \left( \frac{e^{ikz}}{(z^2 + 1)^2}, i \right) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{e^{ikz}}{(z + i)^2} \right)' = \frac{\pi}{2} e^{-k}(k+1).$$

Atunci

$$I_k = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos kx}{(x^2 + 1)^2} dx = Re(J_k) = \frac{\pi}{2} e^{-k}(k + 1), \quad k = \overline{1, n}.$$

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_1 + I_2 + \dots + I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^n e^{-k}(k + 1)$ . Dar  $\left( \sum_{k=0}^{n+1} x^k \right)' = \left( \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x} \right)'$ ,

sau, echivalent,  $\sum_{k=1}^{n+1} kx^{k-1} = \frac{-(n+2)x^{n+1}(1-x) + 1 - x^{n+2}}{(1-x)^2}$ . Înlocuind  $x = e^{-1}$  și

punând  $n \rightarrow \infty$ , obținem  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n e^{-k}(k + 1) = \frac{1}{(1 - e^{-1})^2}$ .

**IV.** Metoda cea mai ușoară de rezolvare a sistemului este aplicarea transformării Laplace. Sistemul devine

$$\begin{cases} (p-5)\mathcal{L}[x](p) + \mathcal{L}[y](p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ (p-3)\mathcal{L}[y](p) - \mathcal{L}[x](p) = \frac{p}{p^2 + 1}, \end{cases}$$

de unde  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2 - 5p + 1}{(p^2 + 1)(p - 4)^2}$ , iar  $y(t) = \frac{1}{289}(-75 \cos t - 40 \sin t + 75e^{4t} - 51te^{4t})$  și

$$x(t) = y'(t) - 3y(t) - \cos t = \frac{1}{289}(195 \sin t - 104 \cos t + 24e^{4t} - 51te^{4t}).$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2013-2014

**I.** Integrala este 0. (a se vedea soluția problemei I, profil electric, faza locală, 2013-2014).

**II.** a) Din  $\Delta F = 0$ , rezultă  $a = b$ .

b) Cum  $u, v$  sunt funcții armonice,  $5u + 3v$  este tot o funcție armonică, deci  $a = b$ .

Derivând în raport cu  $x$  și  $y$ , obținem sistemul  $\begin{cases} 5\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial x} \\ 5\frac{\partial u}{\partial y} + 3\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y}. \end{cases}$

Folosind relațiile Cauchy-Riemann, sistemul este echivalent cu  $\begin{cases} 5\frac{\partial u}{\partial x} - 3\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial x} \\ 5\frac{\partial u}{\partial y} + 3\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \end{cases}$

de unde rezultă  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{5\frac{\partial F}{\partial x} + 3\frac{\partial F}{\partial y}}{34}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{5\frac{\partial F}{\partial y} - 3\frac{\partial F}{\partial x}}{34}$ . Atunci  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y}$ ,

iar pentru  $y = 0$ , obținem  $f'(x) = \frac{10ax}{34} + i\frac{6ax}{34}$ ,  $f(x) = \frac{ax^2}{34}(5 + 3i) + C$  și cum  $f(0) = 0$ , avem  $f(z) = \frac{az^2}{34}(5 + 3i)$ .

**III.** Calculăm

$$\begin{aligned} J &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 e^{ix}}{(x^2 - 6x + 13)^2} dx = 2\pi i \operatorname{Rez} \left( \frac{z^2 e^{iz}}{(z^2 - 6z + 13)^2}, 3 + 2i \right) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{z^2 e^{iz}}{(z - 3 + 2i)^2} \right)' = 2\pi i \frac{24 - 23i}{32} e^{3i-2} = \frac{\pi}{16} e^{-2} (24i + 23)(\cos 3 + i \sin 3), \end{aligned}$$

de unde integrala cerută este  $\operatorname{Re}(J) = \frac{\pi e^{-2}}{16} (23 \cos 3 - 24 \sin 3)$ .

**IV.** A se vedea soluția problemei IV, profil electric, faza locală, 2013-2014.

## CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza locală, anul II, profil mecanic, 2019-2020

**I. a)** Discriminantul este  $\Delta = b^2 - 4ac = (\cos \theta_b + i \sin \theta_b)^2 (|a| - |c|)^2$ , deci

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{[-(|a| + |c|) \pm (|a| - |c|)] \cdot [\cos(\theta_b - \theta_a) + i \sin(\theta_b - \theta_a)]}{2|a|}.$$

Atunci  $z_1 = -[\cos(\theta_b - \theta_a) + i \sin(\theta_b - \theta_a)] \Rightarrow |z_1| = 1$ .

**b)** Folosind  $|b| = 2$ ,  $\arg a = 0$ ,  $\arg c = \pi$ , rezultă  $\arg b = \frac{\pi}{2}$ . Atunci  $b = 2i$  și  $f(z) = z^2 + 2iz - 1 = (z + i)^2$  și  $I = \int_{|z+i|=1} \frac{e^{\frac{1}{(z+i)^2}}}{z(z+i)^2} dz$ , cu punctele singulare  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = -i$ . Notând  $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + i| < 1\}$ , avem: (i)  $0 \in \operatorname{Fr}(D)$  este pol de ordinul 1; (ii)  $-i \in D$  este punct esențial. Rezultă  $I = \pi i \operatorname{Rez}(f, 0) + 2\pi i \operatorname{Rez}(f, -i)$ . Dar  $\operatorname{Rez}(f, 0) = -e^{-1}$  și

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1 + \frac{1}{(z+i)^2} + \frac{1}{(z+i)^4} + \frac{1}{(z+i)^6} + \dots}{(z+i)^2} \cdot \frac{1}{z} \\ &= \left( \frac{1}{(z+i)^2} + \frac{1}{1!(z+i)^4} + \frac{1}{2!(z+i)^6} + \dots \right) \cdot \frac{1}{(z+i)-i} \\ &= i \left( \frac{1}{(z+i)^2} + \frac{1}{1!(z+i)^4} + \frac{1}{2!(z+i)^6} + \dots \right) \cdot \left( 1 + \frac{z+i}{i} + \frac{(z+i)^2}{i^2} + \dots \right), \end{aligned}$$

pentru  $|z + i| < 1$ . Atunci

$$C_{-1} = i \left( \frac{1}{1!i^3} + \frac{1}{2!i^5} + \frac{1}{3!i^7} + \dots \right) = \frac{\left(\frac{1}{i}\right)^2}{1!} + \frac{\left(\frac{1}{i}\right)^4}{2!} + \frac{\left(\frac{1}{i}\right)^6}{3!} + \dots = e^{\frac{1}{i^2}} - 1 = e^{-1} - 1.$$

Prin urmare  $\operatorname{Rez}(f, -i) = e^{-1} - 1$ , iar  $I = \pi i(e^{-1} - 2)$ .

**II.** Integrala se rescrie

$$I = \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(2nx)}{(5 + 3 \sin x)^2} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(2nx)}{(5 + 3 \sin x)^2} dx}_{I_2}.$$

Atunci, notând  $e^{ix} = z$ , rezultă

$$I_1 + iI_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{2nix}}{(5 + 3 \sin x)^2} dx = -\frac{4}{i} \int_{|z|=1} f(z) dz,$$

unde  $f(z) = \frac{z^{2n+1}}{(3z^2 + 10iz - 3)^2}$ . Atunci

$$I_1 + iI_2 = -\frac{4}{i} \cdot \operatorname{Rez}(f, -\frac{i}{3}) = -8\pi \cdot \frac{(-1)^{n+1} \cdot (8n+5)}{3^{2n+2} \cdot 4 \cdot 64} = \frac{\pi(-1)^n(8n+5)}{32 \cdot 3^{2n+2}}.$$

În concluzie, avem  $I_1 = \operatorname{Re}(I_1 + iI_2) = \frac{\pi(-1)^n(8n+5)}{32 \cdot 3^{2n+2}}$  și  $I_2 = 0$ , iar  $I = I_1 + iI_2 = I_1$ .

**III.** Egalitatea din enunț se rescrie  $y \cdot U(x, y) = x \cdot v(x, y)$ . Derivând de două ori după  $x$  și de două ori după  $y$ , obținem

$$2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + y \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 2 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + x \left( \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right).$$

Dar  $f$  este olomorfă, deci  $u$  și  $v$  sunt funcții armonice și avem

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (*)$$

Au loc relațiile Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} & (*1) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. & (*2) \end{cases}$$

Din  $(*)$  și  $(*1)$  rezultă  $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ , deci  $u = C_1 + \Phi(x)$ ,  $C_1 \in \mathbb{R}$  și deci  $v = \frac{y}{x}(C_1 + \Phi(x))$ .

Din  $(*1)$  obținem  $\Phi'(x) = \frac{C_1 + \Phi(x)}{x}$ , deci

$$x\Phi'(x) - \Phi(x) = C_1,$$

care prin împărțire la  $x^2$  conduce la

$$\frac{x\Phi'(x) - \Phi(x)}{x^2} = \frac{C_1}{x^2} \Rightarrow \left( \frac{\Phi(x)}{x} \right)' = \frac{C_1}{x^2} \Rightarrow \frac{\Phi(x)}{x} = \frac{-C_1}{x} + C_2,$$

deci  $\Phi(x) = -C_1 + C_2 \cdot x$ ,  $C_2 \in \mathbb{R}$  și  $u(x, y) = C_2 \cdot x$ ,  $v(x, y) = C_2 \cdot y$  și  $f(z) = C_2 \cdot z$ .

**IV.** a) Avem  $(\mathcal{L}[\theta(t)](p))^n = C \cdot \mathcal{L}[t^8](p)$ , deci  $(\frac{1}{p})^n = \frac{8!C}{p^8}$ , de unde  $n = 9$  și  $C = \frac{1}{8!}$ .

b) Aplicând transformarea Laplace ecuației, obținem


$$\mathcal{L}[y](p) = -\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p^2(p-1)^2} = -\mathcal{L}[e^t](p) + \frac{1}{p^2(p-1)^2}.$$

Notăm  $G(p) = \frac{e^{pt}}{p^2(p-1)^2}$ ,  $t \geq 0$ . Atunci  $\operatorname{Rez}(G, 0) = t+2$  și  $\operatorname{Rez}(G, 1) = e^t(t-2)$ .  
 Prin urmare  $\frac{1}{p^2(p-1)^2} = \mathcal{L}[t+2+e^t(t-2)](p)$  și deci  $y = e^t(t-3)+t+2$ ,  $t \geq 0$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2002-2003

**I.**  $I = \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx$ . Considerăm conturul  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, -r] \cup (-\gamma_r) \cup [r, R]$ ,  $R > 1$ ,  $r < 1$  (vezi Fig. 6).



**Figura 6.**

Fie  $g(z) = \frac{(\ln z)^2}{1+z^2}$ . Pentru funcția  $\ln z$  (funcție complexă multiformă) considerăm ramura  $\ln z = \ln|z| + i \cdot \arg z$ ,  $0 < \arg z < \pi$ , și avem  $\int_\gamma g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i)$ . Dar

$$\int_\gamma g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^{-r} \frac{(\ln|x| + i)}{1+x^2} g(z) dx - \int_{\gamma_r} g(z) dz + \int_r^R \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx.$$

Trecând la limită ( $r \rightarrow 0$ ,  $R \rightarrow \infty$ ) obținem

$$\begin{aligned} 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i) &= \lim_{\substack{R \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-\infty}^0 \frac{(\ln|x| + i\pi)^2}{1+x^2} dx - \\ &\quad - \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} \int_{\gamma_r} g(z) dz + \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx. \end{aligned}$$

Din  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{1+z^2} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{1+z^2} = 0$ , rezultă  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz = 0$ ,  $\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} g(z) dz = 0$ , deci egalitatea devine  $\int_{-\infty}^0 \frac{(\ln|x| + i\pi)^2}{1+x^2} dx + \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i)$ , care se rescrie

$$\int_0^\infty \frac{(\ln x + i\pi)^2}{1+x^2} dx + \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, i) \quad (35)$$

Dar  $\operatorname{Rez}(g, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \cdot \frac{(\ln z)^2}{(z-i)(z+i)} = \frac{-\pi^2}{8i}$ , deci înlocuind membrul drept și dezvoltând pătratul în prima integrală, (35) devine

$$2 \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx - \pi^2 \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx + 2\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = -\frac{\pi^3}{4},$$

de unde rezultă

$$\int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx - \pi^2 \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = -\frac{\pi^3}{4}, \quad \int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0.$$

Cum  $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{2}$ , rezultă  $2 \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx = \frac{\pi^3}{2} - \frac{\pi^3}{4}$ , deci  $\int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx = \frac{\pi^3}{8}$ .

**III. a)**  $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \lambda \\ 0, & x > \lambda. \end{cases}$  Avem  $\int_0^\infty |f(x)| dx = \int_0^\lambda dx = \lambda \in \mathbb{R}_+^*$ , deci

$f \in L^1((0, +\infty), \mathbb{C})$  și deci  $f$  admite transformată Fourier prin cosinus. Analog se procedează și pentru funcția  $g$ .

b) Transformatele Fourier directă și inversă prin cosinus sunt date respectiv de formulele

$$F_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \cos(\xi x) dx, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty F_c(\xi) \cos(\xi x) d\xi,$$

deci

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(x)g(x) dx &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty (g(x) \int_0^\infty F_c(\xi) \cos(\xi x) d\xi) dx = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty F_c(\xi) (\int_0^\infty g(x) \cos(\xi x) dx) d\xi. \end{aligned}$$

Dar  $G_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty g(x) \cos(\xi x) dx$ , deci  $\int_0^\infty g(x) \cos(\xi x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} G_c(\xi)$ ; deci în final obținem  $\int_0^\infty f(x)g(x) dx = \int_0^\infty F_c(\xi)G_c(\xi) d\xi$ .

c) Avem  $F_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\lambda \cos(\xi x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\lambda \xi)}{\xi}$  și  $G_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\mu \xi)}{\xi}$ ; de asemenea observăm că  $f(x) \cdot g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \min(\lambda, \mu) \\ 0, & x > \min(\lambda, \mu) \end{cases}$ . Utilizând rezultatul de la punctul b), avem

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin(\lambda t) \cdot \sin(\mu t)}{t^2} dt &= \int_0^\infty f(x)g(x) dx \min(\lambda, \mu) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_0^\infty \frac{\sin(\lambda t) \cdot \sin(\mu t)}{t^2} dt &= \frac{\pi}{2} \min(\lambda, \mu). \end{aligned}$$

**IV. a)**  $f(x) = \frac{a \cos x - a^2}{1 - 2a \cos x + a^2}$ ,  $-1 < a < 1$ . Coeficienții seriei Fourier trigonometrice a funcției  $f$  sunt date de:

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x) e^{inx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{a \cos x - a^2}{1 - 2a \cos x + a^2} e^{inx} dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{a \frac{z^2+1}{2z} - a^2}{1 - 2a \cos \frac{z^2+1}{2z} + a^2} \cdot z^n \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{a}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 2za + 1)z^{n-1}}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a} dz. \end{aligned}$$

Pentru  $n \geq 1$ , fie

$$g(z) = \frac{(z^2 - 2za + 1)z^{n-1}}{-a(z - \frac{1}{a})(z - a)};$$

polii funcției  $g$  sunt  $z_1 = \frac{1}{a}$ ,  $z_2 = a$ . Dar  $a \in (-1, 1)$ , deci  $z_2 = a \in \text{Int}(|z| = 1)$ ,  $z_1 = \frac{1}{a} \in \text{Ext}(|z| = 1)$ ; rezultă

$$\text{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{(z^2 - 2za + 1)z^{n-1}}{-a(z - \frac{1}{a})} = a^{n-1},$$

și deci  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \cdot a^{n-1}$ . Rezultă  $a_n + ib_n = \frac{a}{2\pi i} \cdot 2\pi i \cdot a^{n-1} = a^n$ , deci  $a_n = a^n$  și  $b_n = 0$  pentru  $n \geq 1$ .

Pentru  $n = 0$  se observă că funcția

$$h(z) = \frac{z^2 - 2za + 1}{-az(z - \frac{1}{a})(z - a)}$$

are polii  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = \frac{1}{a}$  și  $z_3 = a$  (pol de ordinul 1), iar  $\frac{1}{a} \in \text{Ext}(|z| = 1)$ ; obținem

$$\begin{cases} \text{Rez}(h, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - 2za + 1}{-az^2 + z(a^2 + 1) - a} = -\frac{1}{a} \\ \text{Rez}(h, a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^2 - 2za + 1}{-az(z - \frac{1}{a})} = \frac{1 - a^2}{-a(a^2 - 1)} = \frac{1}{a}, \end{cases}$$

rezultă  $\int_{|z|=1} h(z) dz = 2\pi i \left( -\frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right) = 0 \Rightarrow a_0 + ib_0 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$ . În final obținem  $f(x) = \sum_{n \geq 1} a^n \cos(nx)$ .

b) Aplicăm formula Parseval:  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$ , care se rescrie

$$\sum_{n \geq 1} a^{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} a^2 \left( \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} \right)^2 dx. \quad (36)$$

Dar pentru  $a \in (-1, 1)$  avem  $\sum_{n \geq 1} (a^2)^n = \sum_{n \geq 1} (a^2)^n - 1 = \frac{1}{1 - a^2} - 1 = \frac{a^2}{1 - a^2}$ , deci înlocuind în membrul stâng din (36) rezultă:

$$\frac{a^2}{1 - a^2} = \frac{a^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} \right)^2 dx \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{\cos x - a}{1 - 2a \cos x + a^2} \right)^2 dx = \frac{\pi}{1 - a^2}.$$

**I.** 1) Impunem condiția ca  $v(x, y)$  să fie armonică

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot 2 \frac{x}{y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{y^2 - x^2}{y^2};$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \varphi''(t) \cdot 4 \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \varphi'(t) \cdot 2 \cdot \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \varphi''(t) \cdot \frac{(y^2 - x^2)^2}{y^4} + \varphi'(t) \cdot \frac{2x^2}{y^3},$$

unde  $t = \frac{x^2 + y^2}{y}$ . Atunci

$$\Delta v = 0 \Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot \frac{(x^2 + y^2)^2}{y^4} + 2 \cdot \frac{(x^2 + y^2)}{y^3} \cdot \varphi'(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2}{y} \cdot \varphi''(t) + 2\varphi'(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow t \cdot \varphi''(t) + 2\varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2}{t},$$

deci  $\ln(\varphi'(t)) = -2\ln(t) + \ln C_1 \Rightarrow \ln(\varphi'(t)) = \ln\left(\frac{C_1}{t^2}\right) \Rightarrow \varphi'(t) = \frac{C_1}{t^2}$ , și deci  $\varphi(t) = -\frac{C_1}{t} + C_2$ . Dacă  $\varphi(t) \neq -\frac{C_1}{t} + C_2$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ , atunci  $v(x, y)$  nu este armonică, deci nu se poate construi  $f$ . Dacă  $\varphi(t) = -\frac{C_1}{t} + C_2$ , atunci

$$v(x, y) = -\frac{C_1 y}{x^2 + y^2} + C_2 \Rightarrow f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = C_1 \cdot \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \cdot C_1 \cdot \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

Pentru  $y = 0$ , avem  $f'(x) = -\frac{C_1}{x^2} \Rightarrow f(x) = \frac{C_1}{x} + C_3$ ; înlocuind  $x$  cu  $z$ , obținem  $f(z) = \frac{C_1}{z} + C_3$ .

b) Pentru a calcula integrala  $I = \int_{\gamma} \frac{e^{1/z}}{(1-z)^2} dz$ , unde  $\gamma : |z| = r$ ,  $r > 0$ ,  $r \neq 1$

(vezi Fig. 3); notăm  $f(z) = \frac{e^{1/z}}{(1-z)^2}$ . Se observă că  $f$  are două puncte singulare:  $z = 0$  (punct esențial) și  $z = 1$  (pol de ordin 2). Avem  $\text{Rez}(f, 0) = c_{-1}$  din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $f$  în jurul lui 0. Observăm că funcția  $f$  se descrie  $f(z) = e^{1/z} \cdot \frac{1}{(1-z)^2} = e^{1/z} \cdot \left(\frac{1}{1-z}\right)^2$ , deci

$$f(z) = \left(1 + \frac{1}{z \cdot 1!} + \frac{1}{z^2 \cdot 2!} + \cdots + \frac{1}{z^n \cdot n!} + \cdots\right) \left(1 + 2z + 3z^2 + \cdots + nz^{n-1} + \cdots\right)$$

pentru  $|z| < 1$ ; atunci rezultă

$$c_{-1} = \frac{1}{1!} + \frac{2}{2!} + \frac{3}{3!} + \cdots + \frac{n}{n!} + \cdots = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots = e,$$

deci  $\text{Rez}(f, 0) = e$ . Pe de altă parte,

$$\text{Rez}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1)^2 \cdot \frac{e^{1/z}}{(1-z)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} e^{1/z} \left(-\frac{1}{z^2}\right) = -e.$$

Pentru raza cercului  $\gamma$ , apare discuția:

- a) dacă  $r < 1 \Rightarrow I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(f, 0) = 2\pi ie$ ;  
b) dacă  $r > 1 \Rightarrow I = 2\pi i \cdot (\operatorname{Rez}(f, 0) + \operatorname{Rez}(f, 1)) = 0$ .

**II.** Avem  $r \in [0, 1)$ ;  $f(\theta) = \frac{1-r^2}{2(1-2r\cos\theta+r^2)}$ . Ca să determinăm coeficienții  $a_n$  și  $b_n$  ai seriei trigonometrice Fourier, calculăm  $a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cdot e^{in\theta} d\theta$ ; obținem

$$a_n + ib_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} \cdot e^{in\theta} d\theta = \frac{1-r^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{in\theta}}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta.$$

Efectuăm schimbarea de variabilă  $e^{i\theta} = z$ , (deci  $\cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}$  și  $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ) și rezultă

$$a_n + ib_n = \frac{1-r^2}{2\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{1-2r \cdot \frac{z^2+1}{2z} + r^2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1-r^2}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{z - r(z^2 + 1) + r^2 z} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{z^n}{z - r(z^2 + 1) + r^2 z}$ . Punctele singulare ale funcției  $g$  sunt  $z_1 = r$  și  $z_2 = \frac{1}{r}$ , dar cum  $r \in [0, 1)$ , rezultă că  $z_1 \in \operatorname{Int}(\gamma)$ , iar  $z_2 \in \operatorname{Ext}(\gamma)$ ;  $z_1$  este pol de ordinul unu, deci

$$\operatorname{Rez}(g, r) = \lim_{z \rightarrow r} (z - r) \cdot \frac{z^n}{-r(z - r)(z - \frac{1}{r})} = \frac{r^n}{-r(r - \frac{1}{r})} = \frac{r^n}{1 - r^2}.$$

Atunci  $a_n + ib_n = 2\pi i \cdot \frac{1-r^2}{2\pi i} \cdot \frac{r^n}{1-r^2} = r^n$ , de unde  $a_n = r^n$  și  $b_n = 0$ . Pentru  $n = 0$ , rezultă  $a_0 = 1$ , de unde obținem dezvoltarea în serie trigonometrică Fourier a funcției  $f$ ,  $f(\theta) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cdot \cos(n\theta)$ .

**III.** a) Folosim definiția transformatei Fourier  $\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot e^{i\lambda x} dx$  de unde rezultă  $\hat{f}_c(\lambda) = \int_0^{\infty} f(x) \cdot \cos(\lambda x) dx$ . Pentru  $f(x) = \frac{1}{(x^2+4)^2}$ , avem

$$\hat{f}_c(\lambda) = \int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2} \cdot \cos(\lambda x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2} \cdot \cos(\lambda x) dx,$$

unde s-a folosit paritatea integrandului. Notăm  $\hat{f}_c(\lambda) = I_1$ , și construim integrala definită impropriu  $I_2 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2} \sin(\lambda x) dx$ . Atunci

$$I_1 + iI_2 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+4)^2} \cdot e^{i\lambda x} dx.$$

Fie  $\gamma : \gamma_R \cup [-R, R]$ ;  $R > 2$  (vezi Fig. 3). Fie  $g(z) = \frac{1}{(z^2+4)^2} \cdot e^{i\lambda z}$ . Atunci, din teorema reziduurilor, obținem  $\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 2i)$ . Dar

$$\int_{\gamma} g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 2i). \quad (37)$$

Din lema lui Jordan, avem  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz = 0$ , deci relația (37) conduce pentru  $R \rightarrow \infty$  la egalitatea  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 2i)$ . Dar  $z = 2i$  este pol de ordin doi, deci

$$\operatorname{Rez}(g, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} \left[ (z - 2i)^2 \cdot \frac{e^{i\lambda z}}{(z - 2i)^2 (z + 2i)^2} \right]' = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{e^{i\lambda z} (i\lambda z - 2\lambda - 2)}{(z + 2i)^3} = e^{-2\lambda} \cdot \frac{2\lambda + 1}{32i}.$$

Atunci

$$I_1 + iI_2 = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot e^{-2\lambda} \cdot \frac{2\lambda + 1}{32i} = \frac{\pi(2\lambda + 1)}{32 \cdot e^{2\lambda}},$$

de unde rezultă  $\hat{f}_c(\lambda) = I_1 = \frac{\pi(2\lambda + 1)}{32 \cdot e^{2\lambda}}$ .

$$\text{b) Obținem } \hat{g}_s(\lambda) = \int_0^\infty \frac{x}{(x^2 + 4)^2} \cdot \sin(\lambda x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(\lambda x)}{(x^2 + 4)^2} dx.$$

Notăm  $J_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(\lambda x)}{(x^2 + 4)^2} dx$  și construim  $J_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos(\lambda x)}{(x^2 + 4)^2} dx$ . Calculăm

$$J_1 + iJ_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 4)^2} \cdot e^{i\lambda x} dx.$$

Fie  $h(z) = \frac{z}{(z^2 + 4)^2} \cdot e^{i\lambda z}$ . Prinr-o construcție similară cu cea de la punctul a), obținem  $J_1 + iJ_2 = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(h, 2i)$ . Cum  $z = 2i$  este pol de ordinul doi pentru  $h(z)$ , avem

$$\begin{aligned} \operatorname{Rez}(h, 2i) &= \lim_{z \rightarrow 2i} \left[ (z - 2i)^2 \cdot \frac{ze^{i\lambda z}}{(z + 2i)^2 (z - 2i)^2} \right]' \\ &= \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{e^{i\lambda z} (z^2 i\lambda - z - 2\lambda z + 2i)}{(z + 2i)^3} = \frac{\lambda e^{-2\lambda}}{8}. \end{aligned}$$

Rezultă  $J_1 + iJ_2 = 2\pi i \cdot \frac{\lambda e^{-2\lambda}}{8} = \frac{\pi i \lambda}{4e^{2\lambda}}$ , de unde  $J_2 = \frac{\pi \lambda}{4e^{2\lambda}}$  și deci  $\hat{g}_s(\lambda) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \lambda}{4e^{2\lambda}} = \frac{\pi \lambda}{8e^{2\lambda}}$ .

**IV.** Aplicăm transformarea Laplace ecuației integrale. Notând  $\mathcal{L}[\varphi] = \mathcal{L}[\varphi(t)](p)$ , avem

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\varphi(t)](p) - \mathcal{L}\left[\int_0^t e^{t-u} (t-u) \varphi(u) du\right](p) &= \mathcal{L}[\cos t](p) \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}[\varphi] - \mathcal{L}[e^t \cdot t * \varphi(t)] &= \frac{p}{p^2 + 1} \Leftrightarrow \mathcal{L}[\varphi] - \mathcal{L}[e^t \cdot t] \cdot \mathcal{L}[\varphi] = \frac{p}{p^2 + 1} \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}[\varphi] - \frac{1}{(p-1)^2} \cdot \mathcal{L}[\varphi] &= \frac{p}{p^2 + 1} \Leftrightarrow \frac{p^2 - 2p}{(p-1)^2} \cdot \mathcal{L}[\varphi] = \frac{p}{p^2 + 1} \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}[\varphi] &= \frac{(p-1)^2}{(p-2)(p^2+1)} = \frac{A}{p-2} + \frac{Bp+C}{p^2+1}. \end{aligned}$$

Obținem  $A = \frac{1}{5}$ ,  $B = \frac{4}{5}$ ,  $C = -\frac{2}{5}$ . Înlocuind  $A, B, C$  în descompunerea lui  $\mathcal{L}[\varphi]$  în fracții simple, rezultă

$$\mathcal{L}[\varphi] = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{p^2+1} = \frac{1}{5} \mathcal{L}[e^{2t}] + \frac{4}{5} \mathcal{L}[\cos t] - \frac{2}{5} \mathcal{L}[\sin t].$$

Deci  $\varphi(t) = \frac{1}{5}e^{2t} + \frac{4}{5} \cos t - \frac{2}{5} \sin t$ .

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2003-2004

**I.**  $I = \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + 1)^{2004}} dx$ . Cum  $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^{2004}}$  este funcție pară, rezultă  $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{2004}} dx$ . Fie  $g(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^{2004}}$  și  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$ ,  $R > 1$  (vezi Fig. 3). Din teorema reziduurilor, avem  $\int_\gamma g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i)$ . Dar  $\int_\gamma g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i)$ . Pentru  $R \rightarrow \infty$ , deoarece  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz = 0$  (lema lui Jordan), rezultă  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, i)$ . Dar  $z = i$  este pol de ordin 2004 pentru  $g(z)$ , deci

$$\begin{aligned} \operatorname{Rez}(g, i) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{2003!} \left[ (z - i)^{2004} \cdot \frac{1}{(z - i)^{2004} \cdot (z + i)^{2004}} \right]^{(2003)} \\ &= \frac{1}{2003!} \cdot \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{-2004}{(z + i)^{2005}} \right)^{(2002)} = \frac{1}{2003!} \lim_{z \rightarrow i} \left( \frac{(-2004)(-2005)}{(z + i)^{2006}} \right)^{(2001)} \\ &= \dots = \frac{1}{2003!} \cdot \lim_{z \rightarrow i} \frac{(-1)^{2003} \cdot 2004 \cdot 2005 \cdot \dots \cdot 4006}{(z + i)^{4007}} \\ &= -\frac{(4006)!}{(2003!)^2} \cdot \frac{1}{2^{4007} \cdot i^{4007}} = \frac{(4006)!}{(2003!)^2} \cdot \frac{1}{2^{4007} \cdot i}. \end{aligned}$$

$$\text{Rezultă } I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \frac{(4006)!}{(2003!)^2} \cdot \frac{1}{2^{4007} \cdot i} = \frac{\pi(4006)!}{2^{4007} \cdot (2003!)^2}.$$

**II.** Calculăm  $\Delta v$ , pentru funcția  $v(x, y) = e^x \cdot \sin y - \frac{y}{x^2 + y^2}$ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \sin y + \frac{y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y - \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = e^x \cos y + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}; \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= e^x \sin y + \frac{2y(x^2 + y^2)^2 - 2xy \cdot 2(x^2 + y^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^4} = e^x \sin y + \frac{2y^3 - 6x^2 y}{(x^2 + y^2)^3}; \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= -e^x \sin y + \frac{2y(x^2 + y^2)^2 - (y^2 - x^2) \cdot 2(x^2 + y^2) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^4} = -e^x \sin y + \frac{6x^2 y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3}. \end{aligned}$$

Deci  $\Delta v = 0 \Rightarrow v$  este armonică. Obținem succesiv

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \left[ e^x \sin y + \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \right]; \\ y = 0 \Rightarrow f'(x) &= e^x - \frac{1}{x^2} \Rightarrow f(x) = e^x + \frac{1}{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}; \\ x \Rightarrow z \Rightarrow f(z) &= e^z + \frac{1}{z} + C, \quad C \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Impunem condiția  $f(1) = e \Rightarrow e + 1 + C = e \Rightarrow C = -1$ ; funcția olomorfă căutată este  $f(z) = e^z + \frac{1}{z} - 1$ .

**III.** Determinăm coeficienții seriei trigonometrice Fourier pentru funcția  $f(\theta) = \frac{a \sin \theta}{a^2 - 2a \cos \theta + 1}$ ,  $|a| < 1$ ; calculăm

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \cdot e^{i\theta n} d\theta = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a \sin \theta}{a^2 - 2a \cos \theta + 1} \cdot e^{i\theta n} d\theta.$$

Schimbarea de variabilă  $e^{i\theta} = z$  conduce la relațiile  $\sin \theta = \frac{z^2 - 1}{2iz}$ ;  $\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}$ ;  $e^{in\theta} = z^n$ ;  $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ; deci obținem

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{a \cdot \frac{z^2 - 1}{2iz}}{a^2 - 2a \cdot \frac{z^2 + 1}{2z} + 1} \cdot z^n \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{a}{2\pi} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1) z^n}{z(-az^2 + za^2 + z - a)} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{(z^2 - 1) z^{n-1}}{-az^2 + za^2 + z - a}$ . Distingem, în funcție de valorile parametrului  $n \in \mathbb{N}$ , următoarele cazuri:

*Cazul 1.* Pentru  $n \geq 1$  funcția  $g$  are două puncte singulare  $z_1 = a$ ;  $z_2 = \frac{1}{a}$  care sunt poli de ordinul întâi, dar cum  $|a| < 1$ , rezultă  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, a)$ . Dar

$$\operatorname{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \cdot \frac{(z^2 - 1) z^{n-1}}{-a(z - a)(z - \frac{1}{a})} = \frac{(a^2 - 1) \cdot a^{n-1}}{-a(a - \frac{1}{a})} = -a^{n-1},$$

de unde  $a_n + ib_n = -\frac{a}{2\pi} \cdot 2\pi i \cdot (-a^{n-1}) = i \cdot a^n$ , și deci  $a_n = 0$ ;  $b_n = a^n$ ,  $n \geq 1$ .

*Cazul 2.*  $n = 0 \Rightarrow g(z) = \frac{z^2 - 1}{z(-az^2 + za^2 + z - a)}$  are trei puncte singulare:  $z_1 = 0$ ;  $z_2 = a$ ;  $z_3 = \frac{1}{a}$  și avem  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, a))$ . Calculăm cele două reziduuri

$$\begin{cases} \operatorname{Rez}(g, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - 1}{-az^2 + za^2 + z - a} = \frac{1}{a} \\ \operatorname{Rez}(g, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \cdot \frac{z^2 - 1}{z(-a)(z - a)(z - \frac{1}{a})} = \frac{a^2 - 1}{-a^2(a - \frac{1}{a})} = -\frac{1}{a}, \end{cases}$$

de unde  $\int_{|z|=1} g(z) dz = 0 \Rightarrow a_0 = 0$ . Dezvoltarea în serie trigonometrică Fourier este deci  $f(\theta) = \sum_{n \geq 1} a^n \cdot \sin(n\theta)$ .

**IV.** Vom folosi definițiile

$$\hat{f}_c(\lambda) = \int_0^\infty f(x) \cdot \cos(\lambda x) dx, \quad \hat{f}_s(\lambda) = \int_0^\infty f(x) \cdot \sin(\lambda x) dx.$$

Notăm  $I_1 = \hat{f}_c(\lambda) = \int_0^\infty e^{-at} \cdot \cos(\lambda t) dt$ ,  $I_2 = \hat{f}_s(\lambda) = \int_0^\infty e^{-at} \cdot \sin(\lambda t) dt$ . Atunci

$$I_1 + iI_2 = \int_0^\infty e^{-at} \cdot e^{i\lambda t} dt = \int_0^\infty e^{t(-a+i\lambda)} dt = \left. \frac{e^{t(-a+i\lambda)}}{-a+i\lambda} \right|_0^\infty = 0 - \frac{1}{-a+i\lambda} = \frac{1}{a-i\lambda},$$

deci  $I_1 + iI_2 = \frac{a+i\lambda}{a^2+\lambda^2}$ , de unde rezultă  $I_1 = \frac{a}{a^2+\lambda^2}$  și  $I_2 = \frac{\lambda}{a^2+\lambda^2}$ .

**V.** Notăm  $\mathcal{L}[x](p) = X(p)$  și  $\mathcal{L}[y](p) = Y(p)$ . Aplicând transformarea Laplace sistemului, acesta devine:

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} p^2 X(p) - 2 + 2pX(p) + X(p) + p^2 Y(p) - p + 2 + pY(p) - p = \frac{1}{p} \\ 2pX(p) + 2X(p) + p^2 Y(p) - p + 2 + 2pY(p) - 2 = \frac{2}{p^2} \end{array} \right. \\ & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (p+1)^2 \cdot X(p) + (p^2+p)Y(p) = \frac{2p^2+1}{p} \\ 2(p+1) \cdot X(p) + (p^2+2p)Y(p) = \frac{p^3+2}{p^2} \end{array} \right. \\ & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (p+1)X(p) + pY(p) = \frac{2p^2+1}{p(p+1)} \\ 2(p+1)X(p) + (p^2+2p)Y(p) = \frac{p^3+2}{p^2}. \end{array} \right. \end{aligned} \quad (38)$$

Reducem  $X(p)$  și obținem

$$p^2 \cdot Y(p) = \frac{p^3+2}{p^2} - \frac{4p^2+2}{p(p+1)} \Rightarrow Y(p) = \frac{1}{p} + \frac{2}{p^4} - \frac{4p^2+2}{p^3(p+1)}.$$

Funcția  $G(p) = \frac{4p^2+2}{p^3(p+1)} e^{pt}$ , are polii  $p = 0$  (pol de ordin 3) și  $p = -1$  (pol de ordinul 1), și avem

$$\begin{cases} \text{Rez } (G, -1) = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{4p^2+2}{p^3} e^{pt} = -6e^{-t} \\ \text{Rez } (G, 0) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \left( \frac{4p^2+2}{p+1} \cdot e^{pt} \right)'' = 6 - 2t + t^2, \end{cases}$$

deci  $y(t) = 1 + \frac{t^3}{3} + 6e^{-t} - 6 + 2t + t^2 = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 2t - 5 + 6e^{-t}$ . Revenim la sistemul (38) și reducem  $Y(p)$ ; obținem

$$p(p+1)X(p) = \frac{(2p^2+1)(p+2)}{p(p+1)} - \frac{p^3+2}{p^2} = \frac{2p^3+4p^2+p+2}{p(p+1)} - \frac{p^3+2}{p^2} = \frac{p^4+3p^3+p^2-2}{p^2(p+1)},$$

de unde rezultă

$$X(p) = \frac{p^4+3p^3+p^2-2}{p^3(p+1)^2} = \frac{p^2(p+1)^2+p^3-2}{p^3(p+1)^2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{(p+1)^2} - \frac{2}{p^3(p+1)^2}.$$

Funcția  $G(p) = \frac{2e^{pt}}{p^3(p+1)^2}$  are polii  $p = 0$  (pol de ordinul trei) și  $p = -1$  (pol de ordinul doi); calculăm  $\text{Rez } (G, 0) = \lim_{p \rightarrow 0} \left( \frac{e^{pt}}{(p+1)^2} \right)''$ ; obținem

$$\begin{aligned} \text{Rez } (G, 0) &= \lim_{p \rightarrow 0} \left( \frac{te^{pt}(p+1)^2 - e^{pt} \cdot 2(p+1)}{(p+1)^4} \right)' = \lim_{p \rightarrow 0} \left( \frac{e^{pt}(tp+t-2)}{(p+1)^3} \right)' \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{[te^{pt}(tp+t-2) + e^{pt} \cdot t](p+1)^3 - e^{pt} \cdot 3(tp+t-2)(p+1)^2}{(p+1)^6} \\ &= t(t-2) + t - 3(t-2) = t^2 - 4t + 6; \end{aligned}$$

$$\text{analog, } \operatorname{Rez}(G, -1) = 2 \lim_{p \rightarrow -1} \left( \frac{e^{pt}}{p^3} \right)' = 2 \lim_{p \rightarrow -1} \frac{te^{pt} \cdot p^3 - e^{pt} \cdot 3p^2}{p^6} = 2 \frac{te^{-t}(-1) - 3e^{-t}}{1}.$$

În concluzie, obținem soluția


$$x(t) = 1 + te^{-t} - t^2 + 4t - 6 + 2e^{-t}(t+3) = e^t(3t+6) - t^2 + 4t - 5.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2004-2005

**I.** a) Același subiect cu faza interuniversitară, profil electric (19.05.2007); folosim  $u(x, y) = \varphi(\frac{y}{x})$ ; se obține rezultatul  $f(z) = -iC_1 \ln z + C_3$ ,  $C_3 \in \mathbb{C}$ .

b)  $I = \int_{|z-1|=r} z^2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{z}\right) dz$ ,  $r \in (0, 2)$ ,  $r \neq 1$ . Avem conturul  $|z - 1| = r$ , cercul  $C((1, 0), r)$  (vezi Fig. 7).



**Figura 7.**

Fie  $g(z) = z^2 \sin\left(\frac{\pi}{z}\right)$ ; atunci  $z = 0$  este punct singular esențial pentru  $g$  și avem  $\operatorname{Rez}(g, 0) = C_{-1}$  coeficientul lui  $\frac{1}{z}$  din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $g$  în jurul lui  $z = 0$ . Avem

$$\sin\left(\frac{\pi}{z}\right) = \frac{\pi}{z} - \frac{\pi^3}{z^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{z^5 \cdot 5!} - \cdots + \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{z^{2n+1} \cdot (2n+1)!} + \cdots,$$

deci  $z^2 \sin\left(\frac{\pi}{z}\right) = \pi z - \frac{\pi^3}{z^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{z^5 \cdot 5!} + \cdots$ , de unde rezultă  $c_{-1} = -\frac{\pi^3}{3!}$ . Distingem două cazuri în calculul integralei:

- i)  $r \in (0, 1) \Rightarrow I = 0$  (teorema fundamentală a lui Cauchy);
- ii)  $r \in (1, 2) \Rightarrow I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 0) = 2\pi i \cdot \frac{-\pi^3}{6} = \frac{-\pi^4 i}{3}$ .

**II.**  $f : (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{\pi}{2sh\pi} \cdot e^t$ . Vom dezvolta  $f$  în serie Fourier complexă, apoi vom obține seria Fourier trigonometrică.

$$\begin{aligned} c_{-n} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi}{2sh\pi} \cdot e^t \cdot e^{int} dt = \frac{1}{4sh\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{t(1+in)} dt = \frac{1}{4sh\pi} \left( \frac{e^{t(1+in)}}{1+in} \Big|_{-\pi}^{\pi} \right) = \\ &= \frac{1}{4sh\pi} \cdot \frac{e^{\pi(1+in)} - e^{-\pi(1+in)}}{1+in} = \frac{1}{4sh\pi} \cdot (-1)^n \cdot \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{1+in} = \\ &= \frac{(-1)^n}{2(1+in)} = \frac{(-1)^n(1-in)}{2(1+n^2)}. \end{aligned}$$

Rezultă  $a_n = \frac{(-1)^n}{1+n^2}$  și  $b_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{1+n^2}$ , iar  $c_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow a_0 = 1$ . Prin urmare, seria Fourier trigonometrică este:

$$f(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n \geq 1} \left[ \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cdot \cos(nt) + \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{1+n^2} \cdot \sin(nt) \right].$$

Pentru  $t = 0$ , obținem  $f(0) = \frac{1}{2} + \underbrace{\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2}}_S$ , deci  $S = f(0) - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2\sinh\pi} - \frac{1}{2}$ .

**III.**  $x'' - 2x' + 5x = e^t \cos 2t$ ,  $x(0) = x'(0) = 1$ . Aplicând transformarea Laplace ecuației date, rezultă  $\mathcal{L}[x''](p) - 2\mathcal{L}[x'](p) + 5\mathcal{L}[x](p) = \mathcal{L}[e^t \cos 2t](p)$ . Deci, notând  $X(p) = \mathcal{L}[x](p)$ , avem

$$\begin{aligned} p^2 X(p) - p - 1 - 2(pX(p) - 1) + 5X(p) &= \mathcal{L}[\cos 2t](p-1) = \frac{(p-1)}{(p-1)^2 + 4} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (p^2 - 2p + 5)X(p) - p + 1 &= \frac{p-1}{p^2 - 2p + 5} \Leftrightarrow X(p) = \frac{p-1}{p^2 - 2p + 5} + \frac{p-1}{(p^2 - 2p + 5)^2}, \end{aligned}$$

deci  $X(p) = \mathcal{L}[e^t \cos 2t](p) + \frac{p-1}{(p^2 - 2p + 5)^2}$ . Notăm  $G(p) = \frac{(p-1)e^{pt}}{(p^2 - 2p + 5)^2}$ . Ecuația  $p^2 - 2p + 5 = 0$  are rădăcinile  $p_{1,2} = 1 \pm 2i$ , care sunt poli de ordinul 2. Obținem:

$$\begin{cases} \operatorname{Rez}(G, 1+2i) = \lim_{p \rightarrow 1+2i} \left( \frac{(p-1)e^{pt}}{(p-1+2i)^2} \right)' = \frac{e^{(1+2i)t} t}{8i} \\ \operatorname{Rez}(G, 1-2i) = \lim_{p \rightarrow 1-2i} \left( \frac{(p-1)e^{pt}}{(p-1-2i)^2} \right)' = \frac{e^{(1-2i)t} t}{-8i}, \end{cases}$$

deci

$$\begin{aligned} x(t) &= e^t \cos 2t + \frac{e^{(1+2i)t} t}{8i} - \frac{e^{(1-2i)t} t}{8i} = \\ &= e^t \cos 2t + e^t t \frac{(e^{2it} - e^{-2it})}{2i} \frac{1}{4} = \\ &= e^t \cos 2t + \frac{e^t t \sin(2t)}{4}. \end{aligned}$$

**IV.** Pentru a obține rezultatul corect folosim definiția transformatei prin sinus  $\hat{f}_s(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \sin(\xi x) dx$ . În acest caz definiția transformării Fourier este  $\hat{f}(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{i\xi x} dx$ . Cum  $f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  este funcție impară rezultă că funcția  $f(x) \sin(\xi x)$  este pară, deci

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(x) \sin(\xi x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(x) \sin(\xi x) dx.$$

Pe de altă parte  $f(x) \cos(\xi x)$  este funcție impară, deci  $\int_{-\infty}^\infty f(x) \cos(\xi x) dx = 0$ .

Atunci  $i \cdot \hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(\cos(\xi x) + i \sin(\xi x)) dx$ , și deci

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot i} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot i} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2/2} e^{i\xi x} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot i} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-x^2/2})' e^{i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot i} \left( e^{-x^2/2} e^{i\xi x} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} i\xi e^{i\xi x} dx \right) = \\ &= \frac{\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} e^{i\xi x} dx = \frac{\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\frac{x^2}{2} - i\xi x)} dx = \\ &= \frac{\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\frac{x-i\xi}{\sqrt{2}})^2 - \frac{\xi^2}{2}} dx = \frac{\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\frac{x-i\xi}{\sqrt{2}})^2} dx = \\ &= \frac{\xi e^{-\xi^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \xi e^{-\xi^2/2}.\end{aligned}$$

unde am efectuat substituția  $x - i\xi = \sqrt{2}y$ . Deci transformarea Fourier prin sinus a funcției  $f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  coincide cu funcția.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2005-2006

**I.** a) Verificăm armonicitatea funcției  $v(x, y) = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ . Calculăm derivatele parțiale:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x} &= e^{-x}(\sin y - x \sin y + y \cos y), & \frac{\partial v}{\partial y} &= e^{-x}(x \cos y - \cos y + y \sin y), \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= -e^{-x}(2 \sin y - x \sin y + y \cos y), & \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= e^{-x}(2 \sin y - x \sin y + y \cos y),\end{aligned}$$

de unde rezultă  $\Delta v = 0$ , deci  $v$  este armonica.

b) Determinăm funcția olomorfă  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ . Avem


$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^{-x}(x \cos y - \cos y + y \sin y) + ie^{-x}(\sin y - x \sin y + y \cos y).$$

Pentru  $y = 0$ ,  $f'(x) = e^{-x}(x - 1)$ , deci

$$f(x) = \int e^{-x}(x-1) dx = -e^{-x}(x-1) + \int e^{-x} dx = -e^{-x}(x-1) - e^{-x} + C = -xe^{-x} + C.$$

Substituția  $x \rightarrow z$  conduce la  $f(z) = -ze^{-z} + C$ , iar  $f(0) = 0 \Leftrightarrow C = 0$ , deci  $f(z) = -ze^{-z}$ .

c) Avem  $I = \int_{|z|=r} \frac{f(\frac{1}{z})}{1-z} dz = \int_{|z|=r} \frac{-\frac{1}{z}e^{-1/z}}{1-z} dz = \int_{|z|=r} \frac{e^{-1/z}}{z(z-1)} dz$ . Numerele complexe  $z \in \mathbb{C} \equiv \mathbb{R}^2$  care satisfac condiția  $|z| = r$  au drept margini în planul complex punctele cercului  $C((0, 0), r)$ . Distingem trei situații (vezi Fig. 8): i)  $0 < r < 1$ ; ii)  $r = 1$ ; iii)  $r > 1$ .

**Figura 8.**

Fie  $g(z) = \frac{e^{-1/z}}{z(z-1)}$ . Observăm că  $z = 0$  și  $z = 1$  sunt singularități ale lui  $g$ ,  $z = 0$  este punct singular esențial și  $z = 1$  este pol de ordinul 1. Atunci

$$\operatorname{Rez}(g, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{-1/z}}{z} = \frac{e^{-1}}{1} = \frac{1}{e},$$

iar  $\operatorname{Rez}(g, 0) = c_{-1}$  este coeficientul lui  $\frac{1}{z}$  din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $g$  în jurul lui  $z = 0$ . Folosind  $e^{-1/z} = 1 - \frac{1}{z \cdot 1!} + \frac{1}{z^2 \cdot 2!} - \frac{1}{z^3 \cdot 3!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{z^{n+1} \cdot n!} + \dots$ , obținem

$$\frac{e^{-1/z}}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2 \cdot 1!} + \frac{1}{z^3 \cdot 2!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{z^{n+1} \cdot n!} + \dots$$

Pe de altă parte avem  $\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -1 - z - z^2 - \dots - z^n - \dots$ ,  $|z| < 1$ . Rezultă

$$g(z) = \left( \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2 \cdot 1!} + \frac{1}{z^3 \cdot 2!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{z^{n+1} \cdot n!} + \dots \right) (-1 - z - z^2 - \dots - z^n - \dots),$$

$$\text{deci } c_{-1} = -1 + \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \dots = -e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

- i) Dacă  $0 < r < 1$ , atunci  $I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 0) = -\frac{2\pi i}{e}$ .
- ii) Dacă  $r = 1$ , atunci  $I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 0) + \pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 1) = -\frac{2\pi i}{e} + \frac{\pi i}{e} = -\frac{\pi i}{e}$ .
- iii) Dacă  $r > 1$ , atunci  $I = 2\pi i(\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, 1)) = 2\pi i(\frac{1}{e} - \frac{1}{e}) = 0$ .

**II.** Dezvoltarea în serie Fourier a funcției  $f$  este

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cdot \cos x + b_n \cdot \sin x).$$

Se observă că  $f(x) = ch(ax)$  este funcție pară, deci coeficienții seriei sunt  $b_n = 0$ ,  $n \geq 1$ ;  $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch(ax) \cdot \cos(nx) dx$ ,  $n \geq 0$ . Integrând prin părți, obținem

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{1}{n} ch(ax) \cdot \sin(nx) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi sh(ax) \cdot \frac{a}{n} \cdot \sin(nx) dx \right] = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ sh(ax) \cdot \frac{a}{n^2} \cdot \cos(nx) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi ch(ax) \cdot \frac{a^2}{n^2} \cdot \cos(nx) dx \right] = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{a}{n^2} \cdot sh(a\pi) \cdot (-1)^n - \frac{a^2}{n^2} \int_0^\pi ch(ax) \cdot \cos(nx) dx \right]. \end{aligned}$$

Obținem astfel relația

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{a}{n^2} \cdot sh(a\pi) \cdot (-1)^n - \frac{a^2}{n^2} \cdot a_n \Leftrightarrow a_n = \frac{2a \cdot sh(a\pi) \cdot (-1)^n}{\pi(n^2 + a^2)};$$

de asemenea,  $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ch(ax)dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{sh(a\pi)}{a} \Big|_0^\pi = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{sh(a\pi)}{a}$ . Atunci  $f$  are seria trigonometrică Fourier asociată

$$f(x) = \frac{1}{\pi a} \cdot sh(a\pi) + \sum_{n \geq 1} \frac{2a(-1)^n}{\pi(n^2 + a^2)} \cdot sh(a\pi) \cdot \cos(nx)$$

Pentru determinarea sumei seriei  $S_1 = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2}$ , luăm  $x = \pi$  în dezvoltarea în serie Fourier a lui  $f$ . Rezultă  $ch(a\pi) = \frac{1}{\pi a} \cdot sh(a\pi) + \frac{2a \cdot sh(a\pi)}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2}$ , deci

$$S_1 = \frac{ch(a\pi) - \frac{1}{\pi a} \cdot sh(a\pi)}{\frac{2a \cdot sh(a\pi)}{\pi}} = \frac{\pi a \cdot ch(a\pi) - sh(a\pi)}{2a^2 \cdot sh(a\pi)}.$$

Pentru determinarea sumei seriei  $S_2 = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n^2 + a^2)^2}$  vom folosi formula lui Parseval  
 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx$ .

În cazul nostru, avem

$$\frac{2sh^2(a\pi)}{\pi^2 a^2} + \sum_{n \geq 1} \frac{4a^2 \cdot sh^2(a\pi)}{\pi^2 (n^2 + a^2)^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} ch^2(ax)dx. \quad (39)$$

Calculăm integrala din membrul drept. Folosind paritatea funcției  $ch$ , obținem

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} ch^2(ax)dx &= 2 \int_0^\pi ch^2(ax)dx = 2 \int_0^\pi \left( \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2} \right)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (e^{2ax} + 2 + e^{-2ax})dx = \frac{1}{2} \left( \frac{e^{2ax}}{2a} \Big|_0^\pi + 2x \Big|_0^\pi - \frac{e^{-2ax}}{2a} \Big|_0^\pi \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{e^{2a\pi} - 1}{2a} + 2\pi - \frac{e^{-2a\pi} - 1}{2a} \right) = \frac{1}{2a} sh(2a\pi) + \pi, \end{aligned}$$

deci (39) se rescrie  $\frac{2sh^2(a\pi)}{\pi^2 a^2} + \frac{4a^2 sh^2(a\pi)}{\pi^2} \cdot \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a\pi} \cdot sh(2a\pi) + 1$ , și deci

$$S_2 = \frac{\frac{1}{2a\pi} \cdot sh(2a\pi) + 1 - \frac{2sh^2(a\pi)}{\pi^2 a^2}}{\frac{4a^2 sh^2(a\pi)}{\pi^2}} = \frac{-4sh^2(a\pi) + 2\pi^2 a^2 + \pi a \cdot sh(2a\pi)}{4a^4 \cdot sh^2(a\pi)}.$$

*Metoda 2.* Determinăm suma seriei  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + a^2}$ . Considerăm  $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{\pi}{2sh(a\pi)} \cdot e^{ax}$ . Atunci coeficientul  $c_{-n}$  din dezvoltarea funcției  $f$  în serie Fourier

complexă este

$$\begin{aligned} c_{-n} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi}{2sh(a\pi)} \cdot e^{ax+inx} dx = \frac{1}{4sh(a\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} e^{x(a+in)} dx = \\ &= \frac{1}{4sh(a\pi)} \cdot \left. \frac{e^{x(a+in)}}{a+in} \right|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{4sh(a\pi)} \cdot \frac{e^{\pi(a+in)} - e^{-\pi(a+in)}}{a+in} = \\ &= \frac{1}{4sh(a\pi)} \cdot \frac{(-1)^n \cdot (e^{\pi a} - e^{-\pi a})}{a+in} = \frac{(-1)^n \cdot sh(\pi a)}{2sh(\pi a)} \cdot \frac{1}{a+in} = \frac{(-1)^n}{2} \cdot \frac{a-in}{a^2+n^2}, \end{aligned}$$

deci  $a_n = \frac{(-1)^n \cdot a}{a^2+n^2}$ ;  $b_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{a^2+n^2}$ ;  $a_0 = \frac{1}{a}$ . Aplicând formula Parseval, rezultă

$$\begin{aligned} \frac{1}{2a^2} + \sum_{n \geq 1} \frac{a^2+n^2}{(a^2+n^2)^2} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2}{4sh^2(a\pi)} \cdot e^{2ax} dx \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2a^2} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2} &= \frac{\pi}{4sh^2(a\pi)} \cdot \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{2a} = \frac{\pi \cdot sh(a\pi) \cdot ch(a\pi)}{2a \cdot sh^2(a\pi)} = \frac{\pi \cdot ch(a\pi)}{2a \cdot sh(a\pi)}. \end{aligned}$$

$$\text{Obținem în final } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi \cdot ch(a\pi)}{2a \cdot sh(a\pi)} - \frac{1}{2a^2} = \frac{\pi a \cdot ch(a\pi) - sh(a\pi)}{2a^2 \cdot sh(a\pi)}.$$

**III.**  $\int_0^\infty f(t) \cdot \cos(\omega t) dt = \frac{1}{(1+\omega^2)^2}$ ,  $\omega > 0$ . Folosind inversa transformării Fourier și paritatea funcției din membrul drept, rezultă

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1}{(1+\omega^2)^2} \cdot \cos(\omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^2} \cdot \cos(\omega t) d\omega.$$

Pentru calculul ultimei integrale, notăm  $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^2} \cdot \cos(\omega t) d\omega$  și  $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^2} \cdot \sin(\omega t) d\omega$ . Se observă că  $I_1$  este partea reală a integralei  $I_1 + iI_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega t}}{(1+\omega^2)^2} d\omega$ . Construim drumul  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$  (vezi Fig. 3), unde  $\gamma_R : x^2 + y^2 = R^2$ ,  $y > 0$ ,  $R > 1$ . Fie  $g(z) = \frac{e^{itz}}{(1+z^2)^2}$ . Deoarece  $\gamma$  este drum închis, aplicând teorema reziduurilor, rezultă

$$\int_\gamma g(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, i) \Leftrightarrow \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, i).$$

Trecând la limită  $R \rightarrow \infty$ , obținem  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, i)$ .

Limita din membrul stâng este 0 (lema lui Jordan), deci  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, i)$ .

Prin urmare  $I_1 + iI_2 = 2\pi i \cdot \text{Rez}(g, i)$ . Dar  $z = i$  este pol de ordinul 2, deci

$$\begin{aligned} \text{Rez}(g, i) &= \lim_{z \rightarrow i} \left[ (z-i)^2 \cdot \frac{e^{itz}(i+z)}{(z-i)^2(z+i)^2} \right]' = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{itz} \cdot it(z+i)^2 + e^{itz} \cdot z(z+i)}{(z+i)^4} = \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{itz}(itz-t-2)}{(z+i)^3} = \frac{e^{-t(-t-t-2)}}{-8i} = \frac{e^{-t}(t+1)}{4i}. \end{aligned}$$

Atunci avem  $I_1 + iI_2 = 2\pi i \cdot \frac{e^{-t}(t+1)}{4i} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{t+1}{e^t}$  și deci  $I_1 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{t+1}{e^t}$ ; prin urmare  $f(t) = \frac{1}{\pi} \cdot I_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{t+1}{e^t} = \frac{t+1}{2e^t}$ .

*Observație.* Dacă s-a folosit formula cu  $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$  în fața integralei, atunci  $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot I_1$ .

**IV.**  $y'' + 4y = f(t)$ ,  $y(0) = a$ ,  $y'(0) = a$ ,  $f(t) = \begin{cases} 1, & t \in [2, 3] \\ 0, & t \notin [2, 3] \end{cases}$ . Aplicăm ecuației date transformarea Laplace și notăm  $\mathcal{L}[y](p) = Y(p)$ . Obținem

$$p^2Y(p) - a + 4Y(p) = \mathcal{L}[f(t)](p). \quad (40)$$

Dar  $\mathcal{L}[f(t)](p) = \int_2^3 1 \cdot e^{-pt} dt = -\frac{e^{-pt}}{p} \Big|_2^3 = \frac{1}{p}(e^{-2p} - e^{-3p})$ , deci din relația (40), rezultă  $Y(p)(p^2 + 4) = a + \frac{1}{p}(e^{-2p} - e^{-3p})$ , deci

$$Y(p) = \frac{a}{p^2 + 4} + \frac{e^{-2p} - e^{-3p}}{p(p^2 + 4)}. \quad (41)$$

Se observă că pentru  $G(p) = \frac{e^{-2p} - e^{-3p}}{p(p^2 + 4)} \cdot e^{pt}$ ,  $p = 0$ ;  $p = 2i$ ;  $p = -2i$  sunt poli de ordinul 1, deci

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rez } (G, 0) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{(e^{-2p} - e^{-3p})e^{pt}}{p^2 + 4} = 0 \\ \text{Rez } (G, 2i) = \lim_{p \rightarrow 2i} e^{pt} \cdot \frac{e^{-2p} - e^{-3p}}{p(p + 2i)} = \frac{e^{-4i} - e^{-6i}}{-8} \cdot e^{2it} = \frac{e^{2i(t-3)} - e^{2i(t-2)}}{8} \\ \text{Rez } (G, -2i) = \lim_{p \rightarrow -2i} e^{pt} \cdot \frac{e^{-2p} - e^{-3p}}{p(p - 2i)} = e^{-2it} \cdot \frac{e^{4i} - e^{6i}}{-8} = \frac{e^{-2i(t-3)} - e^{-2i(t-2)}}{8}. \end{array} \right.$$

și deci  $\text{Rez } (G, 0) + \text{Rez } (G, 2i) + \text{Rez } (G, -2i) = \frac{\cos(2t-6) - \cos(2t-4)}{4}$ . Atunci, aplicând transformarea Laplace inversă în relația (41), rezultă

$$y(t) = \frac{a}{2} \sin(2t) + \frac{\cos(2t-6) - \cos(2t-4)}{4}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2005-2006

**I. a)**  $u(x, y) = \varphi(x^2 - y^2)$  unde  $f(0) = 0$ ;  $f(i) = -1$ . Funcția  $u$  trebuie să fie armonică deci vom impune condiția  $\Delta u = 0$ . Notăm  $t(x, y) = x^2 - y^2$  și obținem:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \varphi'(t) \cdot 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot (-2y), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \varphi''(t) \cdot 4x^2 + 2\varphi', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(t) \cdot 4y^2 - 2\varphi', \end{aligned}$$

de unde rezultă  $4(x^2 + y^2)\varphi''(t) = 0$ , deci  $\varphi''(t) = 0 \Rightarrow \varphi(t) = C_1 t + C_2$ , unde  $C_{1,2} \in \mathbb{R}$ . Prin urmare  $u(x, y) = C_1(x^2 - y^2) + C_2$ , iar  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = 2C_1x + 2iC_2y$ . Pentru

$y = 0$  avem  $f'(x) = 2C_1 \Rightarrow f(x) = C_1x^2 + C_3$  unde  $C_3 \in \mathbb{R}$ . Cu substituția  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = C_1z^2 + C_3$ . Punând condițiile date, obținem:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \Rightarrow C_3 = 0 \\ f(i) = -1 \Rightarrow -C_1 + C_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_3 = 0 \\ C_1 = 0, \end{cases}$$

deci  $f(z) = z^2$ .

b) Funcția  $g(z) = \frac{f(z) \cdot e^{2/z}}{z^2 - z} = \frac{z^2 e^{2/z}}{z(z-1)} = \frac{ze^{2/z}}{z-1}$  are  $z = 1$  pol de ordinul 1, deci  $\text{Rez}(g, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} ze^{2/z} = e^2$ .

c)  $z = 0$  este punct singular esențial pentru  $g$ , deci  $\text{Rez}(g, 0) = c_{-1}$  este coeficientul lui  $\frac{1}{z}$  din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $g$  în jurul lui 0. Avem  $e^{2/z} = 1 + \frac{2}{z \cdot 1!} + \frac{2^2}{z^2 \cdot 2!} + \dots + \frac{2^n}{z^n \cdot n!} + \dots$ , deci

$$\begin{cases} ze^{2/z} = z + \frac{2}{1!} + \frac{2^2}{z \cdot 2!} + \dots + \frac{2^n}{z^{n-1} \cdot n!} + \dots \\ \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -1 - z - z^2 - \dots - z^n - \dots, \end{cases}$$

unde  $|z| < 1$ ; rezultă

$$\frac{ze^{2/z}}{z-1} = \left( z + \frac{2}{1!} + \frac{2^2}{z \cdot 2!} + \dots + \frac{2^n}{z^{n-1} \cdot n!} + \dots \right) (-1 - z - z^2 - \dots - z^n - \dots),$$

deci  $c_{-1} = -\frac{2^2}{2!} - \frac{2^3}{3!} - \dots - \frac{2^n}{n!} - \dots = 3 - e^2 \Rightarrow \text{Rez}(g, 0) = 3 - e^2$ .

$$\text{d)} \int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i (\text{Rez}(g, 0) + \text{Rez}(g, 1)) = 2\pi i (e^2 + 3 - e^2) = 6\pi i.$$

II.  $f(x) = \frac{\sin x}{5+4 \cos x}$ , pentru  $x \in (-\pi, \pi)$ . Calculăm

$$a_n + ib_n = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{5+4 \cos x} \cdot e^{inx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{\frac{z^2-1}{2iz}}{5+4 \cdot \frac{z^2+1}{2z}} \cdot z^n \cdot \frac{dz}{iz},$$

deci

$$a_n + ib_n = -\frac{1}{2\pi} \int_{|z|=1} \frac{(z^2-1)z^{n-1}}{2z^2+5z+2} dz, \quad n \geq 1. \quad (42)$$

Fie  $g(z) = \frac{(z^2-1)z^{n-1}}{2z^2+5z+2}$ , unde s-au folosit relațiile

$$e^{ix} = z, \quad dx = \frac{dz}{iz}, \quad \sin x = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \quad \cos x = \frac{z^2 + 1}{iz}.$$

Rădăcinile polinomului  $2z^2 + 5z + 2 = 0$  sunt:

$$z_1 = -\frac{1}{2} \in \text{Int}(|z|=1), \quad z_2 = -2 \in \text{Ext}(|z|=1).$$

Considerăm doar  $z_1 = -\frac{1}{2}$ , care este pol de ordinul 1, deci

$$\text{Rez}\left(g, -\frac{1}{2}\right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{2}} \left(z + \frac{1}{2}\right) \frac{(z^2-1)z^{n-1}}{2(z+\frac{1}{2})(z+2)} = (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n+1}} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

Deci  $a_n + ib_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}$  și prin urmare  $a_n = 0$ ,  $b_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ .

Dar  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{5 + 4 \cos x} dx = 0$ , deci  $f(x) = \sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cos(nx)$ .

**III.** a) Transformata Fourier a funcției este:

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/a^2} \cdot e^{i\xi x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}-i\xi x\right)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}-i\xi x-\frac{\xi^2 a^2}{4}+\frac{\xi^2 a^2}{4}\right)} = \\ &= e^{-\frac{\xi^2 a^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{i\xi}{2}\right)^2} dx = e^{-\frac{\xi^2 a^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} \cdot a dy = ae^{-\frac{\xi^2 a^2}{4}} \sqrt{\pi}, \end{aligned}$$

unde s-a făcut substituția  $\frac{x}{a} - \frac{i\xi}{2} = y$ .

b) Considerăm definițiile inițiale ale transformatelor Fourier prin cosinus și respectiv prin sinus:

$$\hat{f}_c(\xi) = \int_0^{\infty} f(x) \cos(\xi x) dx, \quad \hat{f}_s(\xi) = \int_0^{\infty} f(x) \sin(\xi x) dx.$$

Calculăm

$$\begin{aligned} \hat{f}_c(\xi) + i\hat{f}_s(\xi) &= \int_0^{\infty} e^{-x} e^{i\xi x} dx = \int_0^{\infty} e^{x(i\xi-1)} dx = \frac{e^{x(i\xi-1)}}{i\xi-1} \Big|_0^{\infty} = \\ &= 0 - \frac{1}{i\xi-1} = \frac{1+i\xi}{\xi^2+1} = \frac{1}{\xi^2+1} + i\frac{\xi}{\xi^2+1}, \end{aligned}$$

deci  $\hat{f}_c(\xi) = \frac{1}{\xi^2+1}$  și  $\hat{f}_s(\xi) = \frac{\xi}{\xi^2+1}$ . Observație. Pentru definiția transformatei Fourier cu coeficientul  $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$  în față, obținem:  $\hat{f}_c(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\xi^2+1}$  și  $\hat{f}_s(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\xi}{\xi^2+1}$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil electric, 2006-2007

**I.** a) Impunem condiția ca  $u(x, y)$  să fie armonică. Prin calcul direct, notând  $t(x, y) = \frac{y}{x}$ , obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(t) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(t) \cdot \frac{1}{x}.$$

Atunci  $\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial y^2} = \varphi''(t) \cdot \left(\frac{y^2}{x^4} + \frac{1}{x^2}\right) + 2\frac{y}{x^3} \cdot \varphi'(t) = 0$ , iar  $\Delta u = 0 \Leftrightarrow \varphi''(t) \cdot (t^2 + 1) + 2t \cdot \varphi'(t) = 0$ , deci

$$\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2t}{t^2+1} \Rightarrow \ln |\varphi'(t)| = -\ln(t^2+1) + \ln C_1, \quad C_1 > 0,$$

$$\varphi'(t) = \frac{C_1}{t^2+1} \Rightarrow \varphi(t) = C_1 \cdot \operatorname{arctg}(t) + C_2, \quad C_1 \in \mathbb{R}^*, \quad C_2 \in \mathbb{R},$$

deci prelungind prin continuitate și ținând cont că  $\varphi(t) = C_2$  este soluție, rezultă  $u(x, y) = C_1 \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) + C_2$ ,  $C_{1,2} \in \mathbb{R}$ . Atunci  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{yC_1}{x^2+y^2} - i \frac{xC_1}{x^2+y^2}$ ,

deci pentru  $y = 0$  obținem  $f'(x) = -\frac{iC_1}{x}$ , deci  $f(x) = -iC_1 \ln x + C_3$ ,  $C_{1,3} \in \mathbb{R}$ . Efectuăm substituția  $x \rightarrow t$  și obținem  $f(z) = -iC_1 \cdot \ln z + C_3$ ,  $C_{1,3} \in \mathbb{C}$ .

b)  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$ . Fie  $\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$  și  $D$  domeniul mărginit de  $\gamma$ , unde  $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ , unde  $R > 1$  (vezi Fig. 3). Fie  $g(z) = \frac{z^2 + 1}{z^4 + 1}$ . Atunci, ținând cont că  $\{z \in \mathbb{C} \mid z^4 + 1 = 0\} \cap D = \{\pm \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}\}$ , avem

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 2\pi i \left( \operatorname{Rez} \left( g, \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}}_{z_1} \right) + \operatorname{Rez} \left( g, \underbrace{-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}}_{z_2} \right) \right). \quad (43)$$

Dar  $\int_{\gamma} g(z) dz = \int_{\gamma_R} g(z) dz + \int_{-R}^R g(x) dx$ . Trecând relația la limită pentru  $R \rightarrow \infty$ , și ținând cont de egalitatea (43) și de faptul că  $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} g(z) dz = 0$  (lema lui Jordan), rezultă  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 2\pi i \left( \operatorname{Rez} \left( g, \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}}_{z_1} \right) + \operatorname{Rez} \left( g, \underbrace{-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}}_{z_2} \right) \right)$ .

Dar  $z_1, z_2$  sunt poli de ordinul 1, și avem

$$\begin{cases} \operatorname{Rez}(g, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \cdot \frac{z^2 + 1}{z^4 + 1} = \frac{z_1^2 + 1}{4z_1^3} = \frac{1}{2i\sqrt{2}} \\ \operatorname{Rez}(g, z_2) = \lim_{z \rightarrow z_2} (z - z_2) \cdot \frac{z^2 + 1}{z^4 + 1} = \frac{z_2^2 + 1}{4z_2^3} = \frac{1}{2i\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Prin urmare,  $I = 2\pi i \cdot \frac{2}{2i\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2}$ .

**II.** Se observă că  $f(t) = \frac{\sin t}{5+3\cos t}$  este periodică cu perioada principală  $2\pi$ .

Considerăm restricția  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ , care se dezvoltă în serie Fourier

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt), \quad t \in [-\pi, \pi].$$

Calculăm  $a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{5+3\cos t} \cdot e^{int} dt$ . Notând  $e^{it} = z$  și ținând cont că  $\sin t = \frac{z^2 - 1}{2iz}$ ,  $\cos t = \frac{z^2 + 1}{2z}$ , obținem

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{\frac{z^2 - 1}{2iz}}{5 + \frac{3(z^2 + 1)}{2z}} \cdot z^n \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^{n-1}(z^2 - 1)}{3z^2 + 10z + 3} dz.$$

Se observă că integrandul, funcția  $g(z) = \frac{z^{n-1}(z^2 - 1)}{3z^2 + 10z + 3}$ ,  $n \geq 1$  are două singularități,  $z_1 = -\frac{1}{3} \in \operatorname{Int}(|z| = 1)$  și  $z_2 = -3 \notin \operatorname{Int}(|z| = 1)$ , prin urmare are loc egalitatea

$$\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez} \left( g, -\frac{1}{3} \right).$$

Dar  $z = -\frac{1}{3}$  este pol de ordinul 1, deci  $\operatorname{Rez}(g, -\frac{1}{3}) = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{z^{n-1}(z^2 - 1)}{3(z+3)} = \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{3}$ .

Rezultă

$$\int_{|z|=1} g(z) dz = 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{3}$$

și deci  $a_n + ib_n = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi i}{3} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{2(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} i$ , de unde obținem coeficienții seriei Fourier,

$$\left\{ \begin{array}{l} b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{3^{n+1}}, \quad a_n = 0, \quad n \geq 1 \\ a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\frac{\sin t}{5 + 3 \cos t}}_{\text{impară}} dt = 0 \end{array} \right| \Rightarrow f(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{2(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} \cdot \sin(nt).$$

b) Pentru a găsi acea funcție complexă atașată funcției  $f$  pe care să o putem dezvolta în serie Laurent, folosind relația  $e^{it} = z$  și relațiile  $\sin t = \frac{z^2 - 1}{2iz}$ ,  $\cos t = \frac{z^2 + 1}{2z}$ , observăm că  $f$  se rescrie

$$f(z) = \frac{z^2 - 1}{2iz} \cdot \frac{2z}{10z + 3z^2 + 3} = \frac{1}{i} \cdot \frac{z^2 - 1}{3z^2 + 10z + 3} = \frac{1}{3i} \left(1 - \frac{\frac{10}{3}z + 2}{z^2 + \frac{10}{3}z + 1}\right).$$

Descompunem funcția din paranteză în fracții simple:

$$\frac{\frac{10}{3}z + 2}{z^2 + \frac{10}{3}z + 1} = \frac{A}{z + \frac{1}{3}} + \frac{B}{z + 3} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A + B = \frac{10}{3} \\ 3A + \frac{B}{3} = 2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{1}{3} \\ B = 3 \end{array} \right.$$

și deci  $f(z) = \frac{1}{3i} \left(1 - \frac{\frac{1}{3}}{z + \frac{1}{3}} - \frac{3}{z + 3}\right)$ . Singura coroană pe care putem dezvolta funcția  $f$  în serie Laurent este  $\frac{1}{3} < |z| < 3$ . Pentru  $|z| > \frac{1}{3}$  (deci  $|\frac{1}{3z}| < 1$ ), avem

$$\frac{\frac{1}{3}}{z + \frac{1}{3}} = \frac{1}{3z + 1} = \frac{1}{3z(1 + \frac{1}{3z})} = \frac{1}{3z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{3^n \cdot z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{3^{n+1} \cdot z^{n+1}},$$

deci  $\frac{\frac{1}{3}}{z + \frac{1}{3}} = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n \cdot z^n}$ , iar pentru  $|z| < 3$  ( $\Leftrightarrow |\frac{z}{3}| < 1$ ), avem

$$\frac{3}{z + 3} = \frac{1}{\frac{z}{3} + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^n}{3^n} = 1 + \sum_{n \geq 1} (-1)^n \cdot \frac{z^n}{3^n},$$

și deci pentru  $|z| \in (\frac{1}{3}, 3)$ , obținem

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{3i} \left(1 - \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n \cdot 2^n} - 1 - \sum_{n \geq 1} (-1)^n \cdot \frac{z^n}{3^n}\right) \\ &= \frac{1}{3i} \cdot \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{3^n} \left(\frac{1}{z^n} - z^n\right) = \frac{1}{3i} \cdot \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} \left(z^n - \frac{1}{z^n}\right) \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} \cdot \frac{(z^n - \frac{1}{z^n})}{2i} \cdot 2. \end{aligned}$$

Folosind egalitatea  $\frac{1}{2i}(z^n - \frac{1}{z^n}) = \sin(nt)$ , rezultă  $f(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} \cdot 2 \sin(nt)$ ,  
 $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \in (\frac{1}{3}, 3)\}$ .

**III.**  $x(t) = \cos t + \int_0^t (t-\tau) \cdot e^{t\tau} x(\tau) d\tau$ . Aplicând transformarea Laplace, obținem  
 $\mathcal{L}[x(t)](p) = \mathcal{L}[\cos t](p) + \mathcal{L}[te^t * x(t)](p)$ . Notăm  $\mathcal{L}[x(t)](p) = X(p)$  și rezultă

$$X(p) = \frac{p}{p^2 + 1} + \mathcal{L}[te^t](p) \cdot X(p) = \frac{p}{p^2 + 1} + \mathcal{L}[t](p-1) \cdot X(p) = \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{1}{(p-1)^2} \cdot X(p),$$

deci  $X(p)(1 - \frac{1}{(p-1)^2}) = \frac{p}{p^2 + 1}$  și prin urmare

$$X(p) = \frac{(p-1)^2}{(p-2)(p^2+1)} = \frac{\frac{1}{5}}{p-2} + \frac{\frac{4}{5}p - \frac{2}{5}}{p^2+1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{p^2+1}$$

Aplicând transformarea Laplace inversă, rezultă  $x(t) = \frac{1}{5}e^{2t} + \frac{4}{5} \cos t - \frac{2}{5} \sin t$ .

**IV.** Utilizând inversa transformării Fourier prin cosinus avem

$$\begin{aligned} \varphi(u) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi}{2} \cos x \cdot \cos(ux) dx = \int_0^\pi \frac{\cos(x+ux) + \cos(x-ux)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(x+ux)}{1+u} \Big|_0^\pi + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(x-ux)}{1-u} \Big|_0^\pi = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(u\pi)}{1+u} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(u\pi)}{1-u} \\ &= \frac{1}{2} \sin(u\pi) \left( \frac{1}{1-u} - \frac{1}{1+u} \right) = \frac{1}{2} \sin(u\pi) \cdot \frac{2u}{1-u^2} = \frac{u}{1-u^2} \sin(u\pi). \end{aligned}$$

*Observație.* Dacă se utilizează definiția transformării Fourier cu  $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$  în fața integralei,  
atunci  $\varphi(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\pi \frac{\pi}{2} \cos x \cdot \cos(ux) dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{u}{1-u^2} \cdot \sin(u\pi)$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza interuniversitară, anul II, profil mecanic, 2006-2007

**I.**  $v(x, y) = \operatorname{arctg}(\frac{y}{x})$ ;  $f(1) = 0$ . Rezolvare identică celei de la faza locală (15.04.2006).

**II.**  $I = \int_{|z|=R} \frac{e^{1/z}}{z(1-z)} dz$ ,  $R > 0$ ,  $R \neq 1$ . Funcția  $g(z) = \frac{e^{1/z}}{z(1-z)}$  are două puncte singulare:  $z = 0$  (punct singular esențial) și  $z = 1$  (pol de ordinul 1). Atunci  $\operatorname{Rez}(g, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{e^{1/z}}{z(1-z)} = -e$ , iar  $\operatorname{Rez}(g, 0) = c_{-1}$  = coeficientul lui  $\frac{1}{z}$  din dezvoltarea în serie Laurent a lui  $g$  în jurul lui  $z = 0$ . Folosind egalitățile

$$\begin{cases} \frac{e^{1/z}}{z} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2 \cdot 1!} + \frac{1}{z^3 \cdot 2!} + \cdots + \frac{1}{z^{n+1} \cdot n!} + \cdots \\ \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots, \quad |z| < 1; \end{cases}$$

rezultă  $g(z) = \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2 \cdot 1!} + \dots\right)(1 + z + z^2 + \dots)$ , deci  $c_{-1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots = e$ . Distingem două cazuri:

- a)  $0 < R < 1 \Rightarrow I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(g, 0) = 2\pi ie$ ;
- b)  $R > 1 \Rightarrow I = 2\pi i(\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, 1)) = 2\pi i(e - e) = 0$ .

**III.**  $y'' - 2y' + y = t$ ,  $y(0) = 1$ ;  $y'(0) = 1$ . Aplicăm ecuației date transformarea Laplace și notăm  $\mathcal{L}[y(t)](p) = Y(p)$ ; rezultă

$$p^2Y(p) - p - 1 - 2pY(p) + 2 + Y(p) = \frac{1}{p^2} \Rightarrow (p^2 - 2p + 1)Y(p) = p - 1 + \frac{1}{p^2},$$

deci

$$Y(p) = \frac{1}{p-1} + \frac{1}{p^2(p-1)^2}. \quad (44)$$

Se observă că  $F(p) = \frac{e^{pt}}{p-1}$  are polul  $p = 1$  de ordinul 1, deci

$$\operatorname{Rez}(F, 1) = \lim_{p \rightarrow 1} (p-1) \frac{e^{pt}}{p-1} = e^t.$$

Funcția  $G(p) = \frac{1}{p^2(p-1)^2} e^{pt}$  are polii  $p = 0$  și  $p = 1$ , ambii de ordinul 2. Atunci

$$\begin{cases} \operatorname{Rez}(G, 0) \lim_{p \rightarrow 0} \left( \frac{e^{pt}}{(p-1)^2} \right)' = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{te^{pt} \cdot (p-1)^2 - e^{pt} \cdot 2(p-1)}{(p-1)^4} = \frac{-t-2}{-1} = t+2 \\ \operatorname{Rez}(G, 1) = \lim_{p \rightarrow 1} \left( \frac{e^{pt}}{p^2} \right)' = \lim_{p \rightarrow 1} \frac{te^{pt} \cdot p^2 - e^{pt} \cdot 2p}{p^4} = \frac{te^t - 2e^t}{1} = e^t(t-2) \end{cases}$$

deci aplicând egalității (44) transformarea Laplace inversă, rezultă

$$y(t) = \operatorname{Rez}(F, 1) + \operatorname{Rez}(G, 0) + \operatorname{Rez}(G, 1),$$

deci  $y(t) = e^t + t + 2 + e^t(t-2) = e^t(t-1) + t + 2$ .

**IV.**  $f(x) = e^{-x^2/2}$ . Aplicând funcției  $f$  transformarea Fourier, rezultă

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} e^{i\xi x} dx = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = e^{-\xi^2/2};$$

se rezolvă identic cu problema 3b) a fazei locale. *Observație.* Considerând altă constantă în fața integralei din definiția transformantei Fourier, rezultatul diferă.

**CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"**  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2007-2008

**I. a)** Avem  $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + e^x \cos y$ . Pentru a arăta că  $u$  este aplicație armonică, verificăm că are loc egalitatea  $\Delta u = 0$ . Obținem succesiv:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2} + e^x \cos y, & \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2} - e^x \sin y, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} + e^x \cos y, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} - e^x \cos y, \end{aligned}$$

deci  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ . În concluzie  $u$  este aplicație armonică.

b) Funcția căutată este de forma  $f(x, y) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ . Notând  $z = x + iy$  și folosind faptul că  $f$  este olomorfă, obținem:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2x}{x^2 + y^2} + e^x \cos y - i \left( \frac{2y}{x^2 + y^2} - e^x \sin y \right).$$

Pentru  $y = 0$ , obținem  $f(x) = \frac{2}{x} + e^x$  deci  $f(x) = 2 \ln x + e^x + C$ . Efectuând substituția  $x \rightarrow z$  rezultă  $f(z) = 2 \ln z + e^z + C$ . Din condiția  $f(1) = e$ , obținem  $e + C = e$  deci  $C = 0$ . Prin urmare funcția olomorfă cerută este  $f(z) = 2 \ln z + e^z$ .

c) Obținem  $I = \int_{|z-\frac{1}{2}|=R} \frac{f(z) - 2 \ln z}{z^2(z-i)} dz = \int_{|z-\frac{1}{2}|=R} \frac{e^z}{z^2(z+i)} dz$ . Se observă că:

$z = 0$  este pol de ordin 2 iar  $z = -i$  este pol de gradul 1. Deoarece  $|\frac{1}{2} - 0| = \frac{1}{2}$ ,  $|\frac{1}{2} - (-i)| = \frac{\sqrt{5}}{2}$ , avem  $R \in (0, +\infty) \setminus \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} \right\}$ . Distingem trei cazuri:  $R < \frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{2} < R < \frac{\sqrt{5}}{2}$ ;  $R > \frac{\sqrt{5}}{2}$ . Notând  $g(z) = \frac{e^z}{z^2(z+i)}$ , obținem

i) Dacă  $R < \frac{1}{2}$ , conform teoremei fundamentale Cauchy, rezultă  $I = 0$ .

ii) Dacă  $\frac{1}{2} < R < \frac{\sqrt{5}}{2}$ , atunci  $I = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 0)$ . Obținem

$$\operatorname{Rez}(g, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \left( z^2 \frac{e^z}{z^2(z+i)} \right)' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z(z+i-i)}{z^2(z+i)^2} = 1 - i \Rightarrow I = 2\pi i(1 - i).$$

iii) Dacă  $R > \frac{\sqrt{5}}{2}$ , atunci  $I = 2\pi i(\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, -i))$ . Avem

$$\operatorname{Rez}(g, 0) = 1 - i, \quad \operatorname{Rez}(g, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} (z+i) \frac{e^z}{z^2(z+i)} = \frac{e^{-i}}{-1} = e^{-i} = -\cos 1 + i \sin 1.$$

Deci  $I = 2\pi i(1 - i - \cos 1 + i \sin 1) = 2\pi i[1 - \cos 1 + i(\sin 1 - 1)]$ .

III.  $I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x \cdot e^{inx}}{(13 - 15 \cos x)^2} dx$ . Pentru  $|z| = 1$ , putem scrie  $z = e^{ix}$ , deci

$$\cos x = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin x = \frac{z^2 - 1}{2z}, \quad dz = z idx.$$

$$\text{Obținem } I = \int_{|z|=1} \frac{\frac{z^2 - 1}{2iz} z^n}{(13 - 15 \cos x)^2} \frac{dz}{iz} = (-2) \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)z^n}{(5z^2 - 26z + 5)^2} dz.$$

Fie  $g(z) = \frac{(z^2 - 1)z^n}{(5z^2 - 26z + 5)^2}$ . Rezultă că  $z_1 = 5$  și  $z_2 = \frac{1}{5}$  sunt singularități pentru  $g$ . Cum doar  $z_2 = \frac{1}{5}$  se află în interiorul drumului, calculăm doar reziduul lui  $g$  în  $z_2 = \frac{1}{5}$  (pol de gradul 2). Avem

$$\begin{aligned} \operatorname{Rez}\left(g, \frac{1}{5}\right) &= \lim_{z \rightarrow 5} \left[ \left( z - \frac{1}{5} \right)^2 \frac{(z^2 - 1)z^n}{25(z - \frac{1}{5})^2(z - 5)^2} \right]' = \\ &= \lim_{z \rightarrow 5} \frac{1}{25} \frac{n z^{n+2} - 5(n+2)z^{n+1} + (2-n)z^n + 5nz^{n-1}}{(z - 5)^3} = \frac{-n}{24 \cdot 5^{n+1}}. \end{aligned}$$

Rezultă  $I = (-2)2\pi i \frac{-n}{24 \cdot 5^{n+1}} = \frac{+n\pi i}{6 \cdot 5^{n+1}}$ .

**III.** Aplicăm transformarea Laplace ecuației diferențiale și obținem

$$p^2 X(p) - 1 - 2pX(p) + X(p) = \frac{1}{p-1} \Rightarrow X(p) = \frac{p}{(p-1)^3}.$$

Fie  $G(p) = \frac{p}{(p-1)^3} e^{pt}$ . Dar  $p = 1$  este pol de gradul 3 pentru  $G$ , deci

$$\text{Rez } (G, 1) = \frac{1}{2!} \lim_{p \rightarrow 1} \left[ (p-1)^3 \frac{p \cdot e^{pt}}{(p-1)^3} \right]'' = \frac{1}{2} e^t (t^2 + 2t).$$

Rezultă  $x(t) = \frac{1}{2} e^t (t^2 + 2t)$ .

**IV. Varianta 1.** i) Polinomul caracteristic  $\det(A - \lambda I_3) = 0$  are ca rădăcini valorile proprii  $\lambda_1 = 2; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = -1$ . Aflăm vectorii proprii:

$$\begin{aligned} \bullet \lambda_1 = 2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b = a \\ c = 2a \\ a \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \\ \bullet \lambda_2 = -2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = -a, a \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; \\ \bullet \lambda_3 = -1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b = a \\ c = -a, a \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

ii) Soluția generală a sistemului diferențial este

$$y(t) = C_1 \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}. \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

$$\text{iii) Impunem condițiile inițiale; obținem } \begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 0 \\ C_1 - C_2 + C_3 = 0 \\ 2C_1 - C_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = \frac{1}{3} \\ C_3 = -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

Soluția sistemului este

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3} (e^{2t} - e^{-t}), \\ y(t) = \frac{1}{3} (e^{2t} - e^{-t}) = x(t), \\ z(t) = \frac{1}{3} (2e^{2t} + e^{-t}). \end{cases} \quad (45)$$

*Varianta 2.* Folosim transformarea Laplace și sistemul devine:

$$\begin{cases} pX(p) = -X(p) + Y(p) + Z(p) \\ pY(p) = X(p) - Y(p) + Z(p) \\ pZ(p) = X(p) + Y(p) + Z(p) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(p) = \frac{1}{p^2 - p - 2} \\ Y(p) = X(p) = \frac{1}{p^2 - p - 2} \\ Z(p) = pX(p) = \frac{p}{p^2 - p - 2}. \end{cases}$$

Avem  $X(p) = \frac{1}{(p+1)(p-2)} = \frac{-1}{3} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{p-2}$ , iar

$$\begin{aligned} x(t) &= \operatorname{Rez}(X(p)e^{tp}, 1) + \operatorname{Rez}(X(p)e^{tp}, 2) = \\ &= \lim_{p \rightarrow -1} (p+1) X(p)e^{tp} + \lim_{p \rightarrow 2} (p+2) X(p)e^{tp} = \\ &= \lim_{p \rightarrow 1} -\frac{1}{3} e^{tp} + \lim_{p \rightarrow 2} \frac{1}{3} e^{tp} = -\frac{e^{-t}}{3} + \frac{e^{2t}}{3} \end{aligned}$$

și deci  $x(t) = -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}$ . Analog se obține  $y(t) = x(t)$ , iar

$$Z(p) = \frac{1}{p^2 - p - 2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-2} \Rightarrow z(t) = \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t},$$

deci se obține aceeași soluție (45).

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profil electric, 2008-2009

**I.** Identic cu subiectul 1) de la profil mecanic.

**II.** a) Dacă  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  este olomorfă și  $D$  este disc deschis în  $\mathbb{C}$ , rezultă  $f$  analitică.

Fie  $z_0$  centrul discului  $D$  și  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$  dezvoltarea lui  $f$  în jurul lui  $z_0$ .

Fie  $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}$ ; cum  $F'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = f(z)$ , rezultă că  $F$  este o primitivă a lui  $f$ . Fie  $F$  și  $G$  două primitive a lui  $f$  pe discul  $D$ , deci  $F'(z) = f(z)$  și  $G'(z) = f(z), \forall z \in D \Rightarrow (F - G)'(z) = 0, \forall z \in D$ . Cum  $D$  este conex, avem  $F - G = \text{constant}$ .

b) Fie  $\gamma : [a, b] \rightarrow D, \gamma(a) = z_1$  și  $\gamma(b) = z_2$  arc simplu orientat în  $D$ . Dacă  $F$  este o primitivă a lui  $f$ , atunci

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} F'(z) dz = \int_a^b F'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \\ &= F(\gamma(t)) \Big|_a^b = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(z_2) - F(z_1). \end{aligned}$$

c) Avem

$$\begin{aligned} a + ib &= -\cos z \Big|_0^{\frac{\pi}{2}+i} = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + i\right) + 1 = -\frac{e^{i(\frac{\pi}{2}+i)} + e^{-i(\frac{\pi}{2}+i)}}{2} + 1 = \\ &= -\frac{e^{-1+i\frac{\pi}{2}} + e^{1-i\frac{\pi}{2}}}{2} + 1 = -\frac{-e^{-1}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) + e^1(\cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2})}{2} + 1 = \\ &= \frac{i(e^1 - e^{-1})}{2} + 1 = 1 + i \operatorname{sh} 1, \text{ de unde } a = 1, b = \operatorname{sh} 1. \end{aligned}$$

**III.** Seria Fourier atașată funcției  $f$  este determinată la profilul mecanic - punctul 2b),  $f(z) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \sum_{n \geq 1} \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} \cos(nx)$ ,  $x \in [-\pi, \pi]$ . Cum

$$\left| \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} \cos(nx) \right| = \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} |\cos(nx)| \leq \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}$$

și  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}$  este convergentă, din criteriul Weierstrass, rezultă că seria Fourier este uniform și absolut convergentă pe  $\mathbb{R}$ . Obținem

$$\begin{aligned} \int_{|z|=3} \frac{dx}{5 - 4 \cos z} &= 2\pi i \left( \operatorname{Re} \left( \frac{1}{5 - 4 \cos z}, i \ln 2 \right) + \operatorname{Re} \left( \frac{1}{5 - 4 \cos z}, -i \ln 2 \right) \right) = \\ &= 2\pi i \left( \frac{1}{4 \sin(i \ln 2)} + \frac{1}{4 \sin(-i \ln 2)} \right) = 0. \end{aligned}$$

*Notă.* Ecuația  $5 - 4 \cos z = 0$  este rezolvată la punctul 2a - profilul mecanic.

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul II, profil mecanic, 2008-2009

**I. a)** Rescriem ecuația sub formă de sistem diferențial de ordinul întâi,

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = z \\ z' + (2a - 1)z + (a^2 + 3)y + (a^2 + 3a)x = 1. \end{cases}$$

Notând  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  și  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -(a^2 + 3a) & -(a^2 + 3) & -(2a - 1) \end{pmatrix}$ , studiem stabilitatea sistemului  $X' = AX$ . Polinomul caracteristic al matricei  $A$  este

$$P_A(\lambda) = -\lambda^3 - \lambda^2(2a - 1) - \lambda(a^2 + 3) - (a^2 + 3a),$$

iar ecuația caracteristică  $P_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 + \lambda^2(2a - 1) + \lambda(a^2 + 3) + a^2 + 3a = 0$ . Observăm că  $\lambda_1 = -a$  este soluție, iar  $\lambda_{2,3}$  sunt soluțiile ecuației

$$\lambda^2 + (a - 1)\lambda + 3 + a = 0.$$

Condiția de stabilitate impune  $-a < 0, a - 1 > 0, 3 + a > 0$ , de unde  $a > 1$ .

b) Dacă  $a = 1$ , ecuația devine  $x''' + x'' + 4x' + 4x = 1$ . Aplicăm transformarea Laplace și obținem  $(p + 1)(p^2 + 4)\mathcal{L}[x] = \frac{1}{p}$ , de unde

$$\mathcal{L}[x] = \frac{1}{p(p + 1)(p^2 + 4)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 1} + \frac{Cp + D}{p^2 + 4}.$$

Aducem la același numitor și identificând coeficienții numărătorilor, rezultă

$$A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{5}, C = -\frac{1}{20}, D = -\frac{1}{5} \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}e^{-t} - \frac{1}{20} \cos(2t) - \frac{1}{10} \sin(2t).$$

**II.** a) Folosind *formulele Euler*, ecuația devine  $\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{5}{4}$ , de unde rezultă  $e^{iz} + e^{-iz} = \frac{5}{2}$ . Notăm  $e^{iz} = t$  și obținem  $2t^2 - 5t + 2 = 0$ , cu soluțiile  $t_1 = 2$  și  $t_2 = \frac{1}{2}$ . Atunci  $e^{iz} = 2 \Leftrightarrow iz = \ln 2 + i \cdot 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , și  $e^{iz} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow iz = -\ln 2 + i \cdot 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , de unde multimea soluțiilor ecuației este  $\{\pm i \ln 2 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ .

b) Funcția  $f$  este periodică, cu perioada principală  $2\pi$ , deci putem considera  $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ . Atunci

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{5 - 4 \cos t} \cdot e^{int} dt \stackrel{e^{it}=z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{i(-2z^2 + 5z - 2)} dz,$$

deci  $a_n + ib_n = -\frac{1}{\pi i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{2z^2 - 5z + 2} dz$ . Fie  $g(z) = \frac{z^n}{2z^2 - 5z + 2}$ . Punctele singulare ale funcției  $g$  sunt  $z_1 = \frac{1}{2}$  și  $z_2 = 2$  (poli de ordinul I). Cum  $|z_2| = 2 > 1$ , rezultă că  $a_n + ib_n \stackrel{T.rez}{=} -\frac{1}{\pi i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Rez}\left(g, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}$ . Atunci  $a_n = \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}$  și  $b_n = 0, n \geq 0$ . Rezultă  $f(t) = \frac{1}{3} + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} \cos(nt)$ ,  $t \in (-\pi, \pi)$ .

c) Folosim *teorema reziduurilor* pentru calculul integralei complexe. Funcția  $g(z) = \frac{1}{5 - 4 \cos z}$  admite ca puncte singulare toate soluțiile ecuației  $\cos z = \frac{5}{4}$ , care au fost determinate la punctul a), și anume  $z = 2k\pi \pm i \ln 2, k \in \mathbb{Z}$  (poli de ordinul I). Vom lua în calcul doar acele puncte singulare aflate în interiorul drumului  $|z - i| = 1$ , și anume  $z = i \ln 2$ . Atunci

$$\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{5 - 4 \cos z} = 2\pi i \cdot \text{Rez}\left(\frac{1}{5 - 4 \cos z}, i \ln 2\right) = 2\pi i \cdot \frac{1}{4 \sin(i \ln 2)} = \frac{\pi i}{2} \cdot \frac{2i}{\frac{1}{2} - 2} = \frac{2\pi}{3}.$$

**III.** a) "⇒" Dacă  $(a, b)$  este punct de echilibru, atunci  $\varphi(t) = (a, b)$  este soluție a sistemului, de unde  $0 = f(a, b)$  și  $0 = g(a, b)$ . "⇐" Dacă  $f(a, b) = 0$  și  $g(a, b) = 0 \Rightarrow (a, b)$  soluție a sistemului, de unde  $(a, b)$  este echilibru.

b) Presupunem că există două orbite  $\varphi_1$  și  $\varphi_2$  cu  $\text{Im } \varphi_1 = \text{Im } \varphi_2$  care nu sunt disjuncte. Rezultă că există  $t_1, t_2$  astfel încât  $\varphi_1(t_1) = \varphi_2(t_2)$ . Fie  $T = t_2 - t_1$ . Atunci  $\varphi(t) = \varphi_2(t + T)$  este o soluție a sistemului și cum  $\varphi(t_1) = \varphi_2(t_2) = \varphi_1(t_1)$ , din *teorema fundamentală*, rezultă  $\varphi \equiv \varphi_1$ . Pe de altă parte,  $\varphi_2(t+T) = \varphi_1(t)$  pentru orice  $t$ , deci cele două orbite  $\varphi_1$  și  $\varphi_2$  coincid.

c) Sistemul este echivalent cu  $x'' + x = 0$ . Polinomul caracteristic asociat  $r^2 + 1 = 0$  are rădăcinile  $r = \pm i$ , deci soluția ecuației este  $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ ,  $C_{1,2} \in \mathbb{R}$ . Dar  $x' = y$ , deci  $y = -C_1 \sin t + C_2 \cos t$ ,  $C_{1,2} \in \mathbb{R}$ .

**IV.** a) Vom calcula  $I_k = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^k} dz$ . Avem

$$\frac{f(z)}{z^k} = \frac{a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n}{z^k} = a_0 \cdot \frac{1}{z^k} + a_1 \cdot \frac{1}{z^{k-1}} + \dots + a_{k-1} \cdot \frac{1}{z} + a_k + \dots + a_n \cdot z^{n-k},$$

de unde, din *teorema reziduurilor*, rezultă

$$I_k = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez} \left( \frac{f(z)}{z^k}, 0 \right) = 2\pi i \cdot a_{k-1}.$$

Calculăm  $J_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-ikt} dt$ ; folosind substituția  $e^{it} = z$ , rezultă

$$J_k = \int_{|z|=1} f(z) \cdot z^{-k} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz = \frac{1}{i} \cdot I_{k+1} = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot a_k = 2\pi a_k.$$

b) Demonstrăm întâi că  $\int_{-1}^1 f(x)^2 dx = -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt$ . Fie  $\gamma : |z| = 1$ ,  $\operatorname{Im} z > 0$ .

Atunci, conform *teoremei fundamentale Cauchy*, avem  $\int_\gamma f(z)^2 dz + \int_{-1}^1 f(x)^2 dx = 0$ , de unde

$$\int_{-1}^1 f(x)^2 dx = - \int_\gamma f(z)^2 dz \stackrel{z=e^{it}}{=} - \int_0^\pi f(e^{it})^2 \cdot ie^{it} dt = -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 \cdot e^{it} dt.$$

Demonstrăm că  $\int_0^1 f(x)^2 dx \leq 2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2$ . Observăm că

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \leq \int_{-1}^1 f(x)^2 dx = -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt.$$

Atunci  $\left| \int_0^1 f(x)^2 dx \right| \leq \left| -i \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt \right|$  și obținem

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \leq \left| \int_0^\pi f(e^{it})^2 e^{it} dt \right| \leq \int_0^\pi |f(e^{it})^2 e^{it}| dt = \int_0^\pi |f(e^{it})^2| dt \leq \int_{-\pi}^\pi |f(e^{it})|^2 dt.$$

Deoarece

$$|f(e^{it})|^2 = f(e^{it}) \cdot \overline{f(e^{it})} = \left( \sum_{k=0}^n a_k e^{ikt} \right) \cdot \overline{\left( \sum_{p=0}^n a_p e^{ipt} \right)} = \sum_{k,p=0}^n a_k a_p e^{it(k-p)},$$

rezultă

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \leq \int_{-\pi}^\pi \left( \sum_{k,p=0}^n a_k a_p e^{it(k-p)} \right) dt = \sum_{k,p=0}^n a_k a_p \int_{-\pi}^\pi e^{it(k-p)} dt.$$

Dacă  $k = p$ , atunci  $\int_{-\pi}^\pi e^{it(k-p)} dt = \int_{-\pi}^\pi 1 dt = 2\pi$ . Dacă  $k \neq p$ , atunci

$$\int_{-\pi}^\pi e^{it(k-p)} dt = \frac{e^{it(k-p)}}{i(k-p)} \Big|_{-\pi}^\pi = \frac{e^{\pi i(k-p)} - e^{-\pi i(k-p)}}{i(k-p)} = \frac{2}{k-p} \cdot \sin(\pi(k-p)) = 0.$$

În concluzie,  $\int_0^1 f(x)^2 dx \leq 2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2009-2010

**I.** a) *Metoda 1.* Înmulțim ecuația diferențială cu  $t$ . Obținem ecuația Bessel  $t^2x''(t) + tx'(t) + t^2x(t) = 0$ , cu  $\nu = 0$ , a cărei soluție este

$$x(t) = C \cdot J_0(t) = C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \frac{t^{2n}}{2^n}.$$

Impunând condiția inițială  $x(0) = 1$ , rezultă  $C = 1$ , de unde soluția unică

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \frac{t^{2n}}{2^n}.$$

*Metoda 2.* Fie  $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$  soluție a ecuației diferențiale. Atunci

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n t^{n-1} \text{ și } x''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) t^{n-2},$$

deci obținem  $\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) t^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^{n+1}$ . Identificând coeficienții seriilor, se obține  $a_1 = 0$ ,  $a_{2n+1} = 0$ ,  $2^2 n^2 a_{2n} = -a_{2n-2}$ , de unde  $a_{2n} = \frac{(-1)^n a_0}{2^{2n}(n!)^2}$ .

Din condiția inițială se obține  $a_0 = 1$ , de unde rezultă  $a_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2}$ . Soluția este

deci  $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{t}{2}\right)^{2n}$ , a cărei rază de convergență este  $\infty$ .

b) Folosim transformarea Laplace. Atunci

$$\begin{cases} p\mathcal{L}[x] = 2\mathcal{L}[x] + \mathcal{L}[y] + 2\mathcal{L}[z] \\ p\mathcal{L}[y] = -\mathcal{L}[x] - 2\mathcal{L}[z] \\ p\mathcal{L}[z] - 1 = \mathcal{L}[x] + \mathcal{L}[y] + 2\mathcal{L}[z] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (p-2)\mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] - 2\mathcal{L}[z] = 0 \\ \mathcal{L}[x] + \mathcal{L}[y] + 2\mathcal{L}[z] = 0 \\ -\mathcal{L}[x] - \mathcal{L}[y] + (p-2)\mathcal{L}[z] = 0, \end{cases}$$

de unde  $\mathcal{L}[x] = -\mathcal{L}[y] = \frac{2}{(p-2)(p-1)}$  și  $\mathcal{L}[z] = \frac{1}{p-2}$ . Rezultă soluția

$$x = 2(e^{2t} - e^t), \quad y = 2(e^t - e^2 t), \quad z = e^{2t}.$$

**II.** Din relația  $u(x, y) + v(x, y) = \varphi(\frac{y}{x})$ , notând  $\frac{y}{x} = t(x, y)$  obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} = \varphi'(t) \left( \frac{-y}{x^2} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = \varphi'(t) \frac{1}{x} \quad (46)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \varphi''(t) \frac{y^2}{x^4} + \varphi'(t) \frac{2y}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \varphi''(t) \frac{1}{x^2}.$$

Cum  $u$  și  $v$  sunt funcții armonice, impunem  $\Delta u + \Delta v = 0 \Rightarrow$

$$\varphi''(t) \frac{1}{x^2} \left( \frac{y^2}{x^2} + 1 \right) + 2 \frac{1}{x^2} \frac{y}{x} \varphi'(t) = 0.$$

Împărținând la  $\frac{1}{x^2}$ , obținem  $(t^2 + 1)\varphi''(t) + 2t\varphi'(t) = 0$ , de unde

$$\varphi(t) = C_1 \operatorname{arctg}(t) + C_2, \quad C_{1,2} \in \mathbb{R}.$$

Înlocuind  $\varphi$  în relațiile (46) și folosind relațiile Cauchy-Riemann, obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = C_1 \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} = C_1 \frac{x}{x^2 + y^2},$$

de unde  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{C_1}{2} \frac{x-y}{x^2+y^2}$  și  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{C_1}{2} \frac{-x-y}{x^2+y^2}$ . Atunci

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{C_1}{2} \frac{x+y}{x^2+y^2} - i \frac{C_1}{2} \frac{x-y}{x^2+y^2}.$$

Pentru  $y = 0$  avem  $f'(x) = \frac{-C_1}{2} \frac{1}{x} - i \frac{C_1}{2} \frac{1}{x} = -\frac{C_1}{2}(1+i)\frac{1}{x}$ , de unde

$$f(x) = -\frac{C_1}{2}(1+i)\ln|x| + C_3, \quad C_3 \in \mathbb{R},$$

deci  $f(z) = -\frac{C_1}{2}(1+i)\ln(z) + C_3$ ,  $C_3 \in \mathbb{C}$ . Impunând condițiile inițiale, obținem  $C_3 = 0$  și  $C_1 = 2i$ . Rezultă  $f(z) = (1-i)\ln(z)$ .

**III.** Aplicăm transformarea Laplace ecuației integrale; obținem

$$p\mathcal{L}[x] - 2\mathcal{L}[x]\mathcal{L}[\cos t] = \mathcal{L}[t]\mathcal{L}[\sin t],$$

de unde  $\mathcal{L}[x] = \frac{1}{p^3(p^2-1)}$ . Considerăm funcția  $G(p) = \frac{e^{-pt}}{p^3(p^2-1)}$ . Pentru  $G$ ,  $p = 0$  este pol triplu, iar  $p = \pm 1$  sunt poli simpli. Atunci

$$x = \operatorname{Rez}(G, 0) + \operatorname{Rez}(G, 1) + \operatorname{Rez}(G, -1) = \operatorname{ch} t - \frac{t^2 + 2}{2}.$$

**IV.** Funcția  $f$  este periodică, deci este suficient să considerăm  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ . Seria Fourier trigonometrică a lui  $f$  este

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)].$$

Calculăm  $a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{5 + 4 \sin x} \cdot e^{inx} dx$ . Folosind schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$ , obținem  $a_n + ib_n = \frac{1}{4\pi} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^2 \cdot z^{n-2}}{2z^2 + 5iz - 2} dz..$

Cazul I. Dacă  $n \geq 2$ , atunci funcția  $g(z) = \frac{(z^2+1)^2 \cdot z^{n-2}}{2z^2+5iz-2}$  admite două puncte singulare:  $z_1 = \frac{-i}{2}$  și  $z_2 = -2i$ . Cum  $|z_2| = 2 > 1$ , rezultă că

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}\left(g, \frac{-i}{2}\right) = \frac{i}{2} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{(-i)^{n-2}}{i \cdot 2^{n-2}} = \\ &= \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^{n-2} = \\ &= \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \left(\cos \frac{(n-2)\pi}{2} + i \sin \frac{(n-2)\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

de unde, pentru  $n \geq 2$ , avem

$$a_n = \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \cos \frac{(n-2)\pi}{2}, \quad b_n = \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \sin \frac{(n-2)\pi}{2}.$$

Cazul II. Pentru  $n = 1$ , avem funcția  $g(z) = \frac{(z^2+1)^2}{z(2z^2+5iz-2)}$ , iar  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = \frac{-i}{2}$ ,  $z_3 = -2i$  sunt poli simpli ai functiei  $g$ . Cum  $z_3$  nu este în interiorul drumului  $|z| = 1$ , rezultă că

$$a_1 + ib_1 = \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi i \left( \operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}\left(g, \frac{-i}{2}\right) \right) = \frac{i}{2} \left( \frac{-1}{2} + \frac{3}{8} \right) = \frac{i}{2} \cdot \frac{-1}{8} = \frac{-i}{16},$$

de unde  $a_1 = 0$  și  $b_1 = \frac{-1}{16}$ .

Cazul III. Pentru  $n = 0$  avem  $g(z) = \frac{(z^2+1)^2}{z^2(2z^2+5iz-2)}$ , pentru care  $z_1 = 0$  este pol dublu, iar  $z_2 = \frac{-i}{2}$ ,  $z_3 = -2i$  sunt poli simpli. Atunci

$$\begin{aligned} a_0 + ib_0 &= \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi i \left( \operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}\left(g, \frac{-i}{2}\right) \right) \\ &= \frac{i}{2} \left( \frac{-5i}{4} + \frac{3i}{4} \right) = \frac{i}{2} \cdot \frac{-i}{2} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

de unde  $a_0 = \frac{1}{4}$ . Rezultă că seria Fourier trigonometrică cerută este

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{8} + \left( \frac{-1}{16} \right) \cdot \sin x + \sum_{n \geq 2} \left[ \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \cos \frac{(n-2)\pi}{2} \cdot \cos(nx) \right. \\ &\quad \left. + \frac{(-1)^{n-2} \cdot 3}{2^{n+3}} \cdot \sin \frac{(n-2)\pi}{2} \cdot \sin(nx) \right]. \end{aligned}$$

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2010-2011

**I. a)** Impunem condiția ca  $u$  să fie armonică, deci  $\Delta u = 0$ . Cum  $u$  nu depinde de  $\theta$ , rezultă  $\frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$ . Notăm  $t = \operatorname{tg}(\theta)$ . Deoarece  $\frac{\partial u}{\partial \theta} = \varphi(t) \frac{1}{\cos^2 \theta}$  și  $\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \varphi'' \frac{1}{\cos^4 \theta} + \varphi'(t) \cdot \frac{2 \sin \theta}{\cos^2 \theta}$ , de unde condiția de armonicitate se reduce la  $\varphi''(t) + 2\varphi'(t) \cdot \sin \theta \cos \theta = 0$ . Cum însă  $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta = \frac{2 \operatorname{tg} \theta}{1 + \operatorname{tg}^2 \theta} = \frac{2t}{1+t^2}$ , rezultă  $\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -\frac{2t}{1+t^2}$  și integrând, rezultă  $\varphi'(t) = \frac{C_1}{1+t^2}$ ,  $C_1 \in \mathbb{R}$  și deci  $\varphi(t) = C_1 \operatorname{arctg}(t) + C_2$ ,  $C_2 \in \mathbb{R}$ . Deci

$$u(\rho, 0) = C_1 \theta + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Folosind sistemul Cauchy-Riemann în coordonate polare, rezultă imediat că

$$v(\rho, \theta) = -C_1 \ln \rho + C_3, \quad C_1, C_3 \in \mathbb{R}.$$

Atunci  $f(z) = C_1 \theta + C_2 + i(-C_1 \ln \rho + C_3)$ ,  $z = \rho e^{i\theta}$ .

**b)** Cazul I. Dacă  $a \neq 0$ , atunci distingem următoarele cazuri: I.1) dacă  $r < a$ , avem  $I = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(f, 0)$ . Cum  $z = 0$  este pol de ordinul întâi, rezultă  $\operatorname{Rez}(f, 0) = e^{-1/a} \cdot \frac{1}{a^2}$ ; I.2) dacă  $r > a$ , atunci  $I = 2\pi i \cdot (\operatorname{Rez}(f, 0) + \operatorname{Rez}(f, a))$ . Dar  $z = a$  este punct singular esențial și  $\operatorname{Rez}(f, a) = c_{-1}$ . Avem

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{z-a}} &= 1 + \frac{1}{1!(z-a)} + \frac{1}{2!(z-a)^2} + \dots + \frac{1}{n!(z-a)^n} + \dots \\ \frac{1}{z} &= \frac{1}{(z-a)+a} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-a}{a}} = \frac{1}{a} \left( 1 - \frac{z-a}{a} + \left( \frac{z-a}{a} \right)^2 - \dots \right) \end{aligned}$$

și deci

$$\begin{aligned} f(z) = & \frac{1}{a} \left( 1 - \frac{z-a}{a} + \left( \frac{z-a}{a} \right)^2 - \dots \right) \cdot \\ & \cdot \left( \frac{1}{(z-a)^2} + \frac{1}{1!(z-a)^3} + \dots + \frac{1}{n!(z-a)^{n+2}} + \dots \right), \end{aligned}$$

de unde  $c_{-1} = \frac{1}{a} \left( -\frac{1}{a} + \frac{1}{1!a^2} - \frac{1}{2!a^3} + \dots \right) = -\frac{1}{a^2} e^{-1/a}$ . Rezultă  $I = 0$ .

Cazul II. Dacă  $a = 0$ , atunci  $I = \int_{|z|=r} \frac{e^{1/z}}{z^3} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(f, 0)$ . Dar  $z = 0$  este punct singular esențial și  $c_{-1} = 0$ , de unde  $I = 0$ .

**II.** Avem  $\int_0^t 4e^{4(t-u)} \varphi'(u) du = 4e^{4t} * \varphi'(t)$ . Aplicând transformarea Laplace și proprietățile acesteia, obținem

$$p^2 \mathcal{L}[\varphi(t)] + 4 \cdot \frac{1}{p-4} \cdot p \mathcal{L}[\varphi(t)] = \frac{5}{p^2 + 25} \Rightarrow \frac{p(p^2 - 4p + 4)}{p-4} \cdot \mathcal{L}[\varphi(t)] = \frac{5}{p^2 + 25},$$

deci  $\mathcal{L}[\varphi(t)] = \frac{(p-4)5}{p(p-2)^2(p^2+25)}$ . Fie  $G(p) = \frac{(p-4)5}{p(p-2)^2(p^2+25)} \cdot e^{pt}$ . Pentru  $G$ ,  $p = 0$  și  $p = \pm 5i$  sunt poli de ordinul întâi, iar  $p = 2$  este pol de ordinul doi. Atunci  $\varphi(t) = \operatorname{Rez}(G, 0) + \operatorname{Rez}(G, 5i) + \operatorname{Rez}(G, -5i) + \operatorname{Rez}(G, 2)$ .

**III.** Folosind inversa transformatei Fourier prin sinus, obținem

$$\varphi(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \underbrace{\frac{u}{(u^2 + a^2)^2} \cdot \sin(ut)}_{\text{funcție pară}} du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{u \sin(ut)}{(u^2 + a^2)^2} du.$$

Fie  $J = \int_{-\infty}^\infty \underbrace{\frac{ue^{iut}}{(u^2 + a^2)^2}}_{f(u)} du = 2\pi i \cdot \operatorname{Rez}(f, ai)$ . Cum  $u = ai$  este pol de ordinul doi,

rezultă Avem  $\operatorname{Rez}(f, ai) = \frac{te^{-at}}{4a}$ , de unde  $J = \frac{\pi it e^{-at}}{2a}$ , iar  $\varphi(t) = \frac{te^{-at}}{2a}$ .

**IV. a)** Calculăm

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x) e^{inx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \frac{1}{2 \operatorname{sh} \pi} \cdot e^{x+inx} dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2 \operatorname{sh} \pi} \cdot \frac{e^{x+inx}}{1+in} \Big|_{-\pi}^\pi \\ &= \frac{1}{\pi \cdot 2 \operatorname{sh} \pi} \cdot \frac{1}{1+in} (e^\pi (-1)^n - e^{-\pi} (-1)^n) \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2 \operatorname{sh} \pi} \cdot \frac{1}{1+in} \cdot (-1)^n \cdot 2 \operatorname{sh} \pi = \frac{(-1)^n (1-in)}{\pi (1+n^2)}, \end{aligned}$$

de unde  $a_n = \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)}$  și  $b_n = \frac{n(-1)^{n+1}}{\pi(1+n^2)}$ ,  $n \geq 1$ .

Calculăm  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{1}{\pi \cdot 2 \operatorname{sh} \pi} \cdot 2 \operatorname{sh} \pi = \frac{1}{\pi}$  și rezultă

$$f(z) = \frac{1}{\pi} + \sum_{n \geq 1} \left[ \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \cdot \cos(nx) + \frac{n(-1)^{n+1}}{\pi(1+n^2)} \cdot \sin(nx) \right], \quad x \in (-\pi, \pi).$$

b) Pentru obținerea primei sume  $S_1$ , luăm  $x = 0$  în dezvoltarea în serie de la punctul a). Obținem

$$f(0) = \frac{1}{\pi} + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \Leftrightarrow \frac{1}{2 \operatorname{sh} \pi} = \frac{1}{\pi}(1 + S_1)$$

și deci  $S_1 = \frac{\pi}{2 \operatorname{sh} \pi} - 1$ . Pentru obținerea celei de-a doua sume  $S_2$ , folosim relația lui Parseval,

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx.$$

În cazul nostru, avem  $a_n^2 + b_n^2 = \frac{1+n^2}{\pi^2(1+n^2)^2} = \frac{1}{\pi^2}$ , deci relația devine

$$\frac{1}{2\pi^2} + S_2 \cdot \frac{1}{\pi^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2 \operatorname{sh} \pi} \cdot e^{2x} dx,$$

de unde rezultă  $S_2 = \pi \operatorname{ch} \pi - \frac{1}{2}$ .

CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"  
Faza națională, anul II, profilele electric și mecanic, 2011-2012

**I.** Integrala poate fi scrisă ca  $I_1 + I_2$ , unde

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2012x}{3 + 2 \cos x} dx, \quad I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin 2012x}{3 + 2 \cos x} dx.$$

Calculăm  $I_1 + iI_2 = \int_0^{2\pi} \frac{e^{i \cdot 2012x}}{3 + 2 \cos x} dx$ . Schimbând  $e^{ix} = z$ , obținem

$$I_1 + iI_2 = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^{2012}}{z^2 + 3z + 1} dz = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \left( \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{2012},$$

de unde  $I_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \left( \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \right)^{2012}$ , iar  $I_2 = 0$ .

**II.**  $z = 0$  este punct singular esențial și  $\operatorname{Rez}(f, 0)$  este coeficientul lui  $\frac{1}{z}$  din dezvoltarea în serie Laurent a funcției în jurul lui 0. Cum însă

$$z^{2012} \sin\left(\frac{1}{z}\right) = z^{2012} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{z^{2n+1}(2n+1)!},$$

rezultă  $c_{-1} = \frac{1}{2013!}$  și  $I = \frac{2\pi i}{2013!}$ .

**III.** a)  $f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty e^{-a\omega} \sin(\omega t) d\omega = \frac{2t}{\pi(a^2 + t^2)}$ ,  $t > 0$ .

b) Cum  $f(t) = \hat{g}_s(\omega)$ , rezultă că  $g(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(t) \sin(\omega t) dt = \frac{2}{\pi} e^{-a\omega}$ .

**IV.**  $f(t) = \eta(t)$ .

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"

Faza națională, anul II, profil inginerie, 2012-2013

**I.** a) Se verifică faptul ca funcția dată este armonică și se obține  $f(z) = ze^{nz}$ .

b) Notând  $\operatorname{Im} g = t(x, y)$ , condiția  $\Delta(\operatorname{Re} f) = 0$  implică

$$\varphi''(t) \left[ \left( \frac{\partial t}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial t}{\partial y} \right)^2 \right] + \varphi'(t) \Delta t = 0.$$

Dar  $g$  este olomorfă, deci  $\operatorname{Im} g$  este armonică. Prin urmare, avem  $\varphi''(t) = 0$ , de unde  $\varphi(t) = at + b$ .

c) Înlocuind  $f$  în integrală, aceasta devine  $\int_{|z|=R} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{z^2(z+2i)} dz$ . Notăm  $g(z)$  funcția de sub integrală. Aceasta are două puncte singulare:  $z = 0$  punct esențial și  $z = -2i$  pol de ordinul 1. Obținem  $\operatorname{Rez}(g, -2i) = -\frac{e^{-\frac{1}{2i}}}{4}$ , iar cum

$$\frac{e^{1/z}}{z^2} \frac{1}{z+2i} = \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3 1!} + \frac{1}{z^4 2!} + \dots \right) \left( 1 - \frac{z}{2i} + \frac{z^2}{(2i)^2} - \dots \right),$$

avem  $\operatorname{Rez}(g, 0) = \frac{1}{2i} \left( -\frac{1}{2i} + \frac{1}{1!(2i)^2} - \frac{1}{2!(2i)^3} + \dots \right) = \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{1}{2i} + \frac{1}{2!(2i)^2} - \dots \right) = \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2i}}$ .

Dacă  $R < 2$ , atunci  $I = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 0) = \frac{\pi i}{2} e^{-\frac{1}{2i}}$ .

Dacă  $R = 2$ , atunci  $I = 2\pi i \operatorname{Rez}(g, 0) + \pi i \operatorname{Rez}(g, -2i) = \frac{\pi i}{4} e^{-\frac{1}{2i}}$ .

Dacă  $R > 2$ , atunci  $I = 2\pi i (\operatorname{Rez}(g, 0) + \operatorname{Rez}(g, -2i)) = 0$ .

**II.** Aplicăm transformarea Laplace. Obținem  $(p+1)^2 \mathcal{L}[x(t)] = 1 + \mathcal{L}\left[\frac{e^{-t}}{t+1}\right]$ , de unde rezultă

$$\mathcal{L}[x(t)] = \frac{1}{(p+1)^2} + \frac{1}{(p+1)^2} \mathcal{L}\left[\frac{e^{-t}}{t+1}\right] = \mathcal{L}[te^{-t}] + \mathcal{L}[te^{-t}] \mathcal{L}\left[\frac{e^{-t}}{t+1}\right].$$

Atunci

$$\begin{aligned} x &= te^{-t} + te^{-t} * \frac{e^{-t}}{t+1} = te^{-t} + \int_0^t (t-x)e^{-t+x} \frac{e^{-x}}{x+1} dx \\ &= te^{-t} + e^{-t} \int_0^t (t-x) \frac{1}{x+1} dx = e^{-t}(t+1) \ln(t+1). \end{aligned}$$

**III.** a) Calculăm  $a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{inx}}{5 - 4 \sin x} dx$ . Cu schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$ , obținem

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{-2z^2 + 5iz + 2} dz = \frac{1}{\pi} 2\pi i \operatorname{Rez} \left( f, \frac{i}{2} \right) \\ &= \frac{2}{3} \frac{i^n}{2^n} = \frac{2}{3} \frac{(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})^n}{2^n} = \frac{2}{3} \frac{(\cos \frac{n\pi}{2} + i \sin \frac{n\pi}{2})}{2^n}, \end{aligned}$$

de unde  $a_n = \frac{\cos \frac{n\pi}{2}}{3 \cdot 2^{n-1}}$ ,  $a_0 = \frac{2}{3}$ ,  $b_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{3 \cdot 2^{n-1}}$  și rezultă seria Fourier trigonometrică

$$\frac{1}{3} + \sum_{n \geq 1} \frac{\cos \frac{n\pi}{2}}{3 \cdot 2^{n-1}} \cos nx + \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{3 \cdot 2^{n-1}} \sin nx.$$

b) Integrala cerută este  $a_{2n+1} = 0$ .

**IV.** a) Obținem

$$\hat{f}_k(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} x^k e^{i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^0 x^k e^{i\lambda x+x} dx + \int_0^{\infty} x^k e^{i\lambda x-x} dx.$$

Notăm prima integrală cu  $I_k$  și cea de-a două cu  $J_k$ . Integrând prin părți, obținem  $I_k = -\frac{k}{1+i\lambda} I_{k-1}$ , de unde  $I_k = (-1)^k \frac{k!}{(1+i\lambda)^k} I_0 = \frac{(-1)^k \cdot k!}{(1+i\lambda)^{k+1}}$ . Analog, avem  $J_k = \frac{k!}{(1-i\lambda)^{k+1}}$ .

b) Avem  $\hat{g}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} e^{i\lambda x} dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k)!} \hat{f}_{2k}(\lambda)$ . Cum  $\hat{f}_k(\lambda)$  a fost calculat la punctul a), rezultă  $\hat{g}(\lambda) = \sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{(1+i\lambda)^{2k}} + \frac{1}{(1-i\lambda)^{2k}} \right)$ , de unde

$$\hat{g}(1) = \sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{(1+i)^{2k}} + \frac{1}{(1-i)^{2k}} \right) = \sum_{k=0}^n \left[ \left( \frac{1}{2i} \right)^k + \left( \frac{-1}{2i} \right)^k \right] = \frac{1 - (\frac{1}{2i})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2i}} + \frac{1 - (\frac{-1}{2i})^{n+1}}{1 + \frac{1}{2i}}.$$

### CONCURSUL DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU" Faza națională, anul II, profil inginerie, 2013-2014

**I.** Soluția propusă se obține folosind transformarea Laplace. Cum

$$\mathcal{L}[ty](p) = -\mathcal{L}'[y](p), \quad \mathcal{L}[ty''](p) = -2p\mathcal{L}[y](p) - p^2\mathcal{L}'[y](p), \quad \mathcal{L}[\operatorname{ch} t](p) = \frac{p}{p^2 - 1},$$

se obține ecuația diferențială

$$(1 - p^2)\mathcal{L}'[y](p) - 2p\mathcal{L}[y](p) = \frac{-2p}{p^2 - 1}$$

sau, echivalent,  $((1-p^2)^2 \mathcal{L}[y](p))' = 2p$ . Integrând, rezultă  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2 + C}{(p^2 - 1)^2}$ , unde  $C$  este o constantă reală arbitrară. Funcția  $G(p) = \mathcal{L}[y](p)e^{pt}$  are polii dubli  $p = \pm 1$ . Reziduurile corespunzătoare sunt

$$\operatorname{Rez}(G, 1) = \frac{(1-C)e^t + (1+C)te^t}{4}, \quad \operatorname{Rez}(G, -1) = \frac{-(1-C)e^{-t} + (1+C)te^{-t}}{4},$$

deci soluția este  $k_1 t \operatorname{ch} t + k_2 \operatorname{sh} t$ , unde  $k_1 = \frac{1+C}{2}$ , iar  $k_2 = \frac{1-C}{2}$ .

**II.** Calculăm  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ . Avem

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos x} \cos(\sin x) e^{inx} dx, \quad n \geq 0.$$

Folosind schimbarea de variabilă  $e^{ix} = z$ , rezultă

$$a_n + ib_n = \frac{1}{\pi} \int_{|z|=1} e^{\frac{z^2+1}{2z}} \cos\left(\frac{z^2-1}{2iz}\right) \frac{z^n}{iz} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} (e^z + e^{\frac{1}{z}}) z^{n-1} dz.$$

Pentru  $n = 0$ , obținem  $a_0 = 2$ , iar pentru  $n \geq 1$ ,  $a_n = \frac{1}{n!}$  și  $b_n = 0$ .

**III.** Se observă că  $\bar{z} = \frac{1}{z}$ . Pentru  $n = 0$ , integrala de calculat este  $2\pi i \operatorname{Rez}(f, 0)$ .

Folosind dezvoltarea în serie Laurent a funcției  $\sin \frac{2}{z}$  în jurul lui 0, integrala devine  $\frac{-4\pi}{a+1}$ . Pentru  $n \geq 1$ , calculăm separat integralele

$$I_1 = \int_{|z|=1} \frac{z \sin z}{z^{2n} + a} dz, \quad I_2 = \int_{|z|=1} \frac{\sin \frac{2}{z}}{z^{2n} + a} dz.$$

Pentru calculul lui  $I_1$ , avem  $2n$  poli de ordinul întâi situați în interiorul drumului, astfel că este de preferat calculul reziduuului în punctul de la infinit. Obținem  $I_1 = 0$ . Analog se obține și  $I_2 = 0$ .

**IV.** Membrul stâng este o transformată Fourier prin cosinus și folosind formula de inversiune obținem  $f(x) = \frac{1}{2|a|^3} e^{-|a|x} (|a|x + 1)$ .

# Index

- aditivitate, 175, 179
- antisimetrie, 188
- aplicație
  - armonică, 276
  - liniară, 110
- aplicație liniară, 20
- aproximare, 33, 90
- aria
  - interiorului unei elipse, 45
  - triunghiului, 5, 10, 105, 124
- armonicitate, 221, 225, 226, 230, 235, 238, 242, 244, 284
- automorfism, 192
- axa de simetrie a parabolei, 163, 164
- axiomele produsului scalar, 175
- bază, 3, 4, 9, 19, 31, 92, 93, 116, 168, 169, 208
  - diagonalizatoare, 97, 118, 192, 240
  - jordanizatoare, 123, 151, 193
  - ortogonală, 31, 97, 175
  - ortonormată, 4, 6, 9, 27, 107, 108, 116, 161
  - otonormată, 18
  - pozitiv orientată, 108
- bijectivitate, 41, 131, 192
- binomul lui Newton, 198
- celulă Jordan, 151
- centrul
  - cercului, 33, 180
  - de greutate, 32
  - de simetrie, 44, 98, 204
  - discului, 278
  - elipsei, 36, 44
  - sferei, 36, 143, 180
- cerc, 33, 35, 180, 219, 238
- cilindru eliptic, 98, 102
- circumferință, 35, 184
  - coliniaritate, 5, 105, 191, 197
  - combinație liniaă, 116
  - complexificata unei transformări, 99
  - condițiile Cauchy, 242
  - conică, 163, 164
    - cu centru, 36
    - fără centru, 163, 164
- continuitate, 1, 5, 7, 8, 19, 24, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 85, 86, 94, 103, 104, 106, 110, 114, 149, 163, 172, 185, 189
- convergență
  - unei serii, 10, 18, 19, 28, 32, 79
  - unui sir, 150
- convergență, 2, 20, 40, 75, 114
  - absolută, 8, 114, 129, 165
  - simplă, 8, 13, 24
  - uniformă, 7, 10, 11, 13, 15, 25, 28, 34, 35, 37, 40, 110, 129, 133, 149, 152, 164, 165, 178, 184, 194
- coordonate polare, 80, 284
- coordonatele unui vector, 31
- coplanaritate, 46, 208
- coroană, 77, 273
- criteriul
  - Cauchy, 121, 149, 152
  - cleștelui, 177, 199
  - comparației, 113, 189
  - de comparație, 87, 150
  - de necesitate, 86, 182
  - Leibniz, 86, 94, 114, 152, 154, 189
  - logaritmic, 182
  - Raabe-Duhamel, 113, 196
  - raportului, 182, 194
  - Stolz-Cesàro, 196
  - Sylvester, 143, 155
- cuadică, 2, 4, 33, 98, 105
  - fără centru de simetrie, 98

- cuadrică nedegenerată, 200
- curbură, 102
- curbă, 3, 91, 102
  - dedublare, 179
  - defect, 197
  - derivabilitate, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 30, 85, 93, 104, 121, 127, 133, 137, 144, 150, 151, 163, 185, 206
  - Fréchet, 12, 13, 15, 17, 85, 93, 104, 127, 133, 137, 144, 151, 163, 185, 206
  - derivabilitate Fréchet, 20
  - derivate parțiale, 1, 6, 12, 25, 28, 31, 35, 38, 181
    - de ordin 2, 40
  - determinant, 35
    - Vandermonde, 118
  - dezvoltare
    - în serie Taylor, 2, 3, 5, 12, 39, 89, 118, 187, 242
    - în serie de puteri, 25
  - diagonalizare, 1, 12, 31, 40, 123, 148, 151
  - diferențabilitate, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 32, 40, 85, 93, 104, 127, 133, 137, 144, 151, 163, 181, 185, 206
    - Fréchet, 1, 3, 6, 20, 35, 85, 93, 104, 106, 127, 133, 137, 144, 151, 163, 172, 185, 206
  - dimensiune, 11, 14, 38, 125, 131, 135, 136, 192, 196
  - direcție normală, 208
  - disc
    - închis, 32
    - deschis, 278
  - discontinuitate, 33, 110, 178
  - discriminant, 91, 248
  - divizori, 9, 118
  - domeniu
    - închis, 12, 15, 32, 44
    - conex, 278
    - de convergență, 1, 7, 11, 19, 25, 40, 86, 94, 112, 113, 121, 133, 189, 194
  - dreaptă, 40, 91, 109, 143
    - parametrizată, 91
  - drum
  - închis, 221, 268
  - parametrizat, 91
  - dublă incluziune, 131, 151, 167
  - ecuația
    - carteziană a unei suprafete, 105
    - redusă a unei cuadrice, 91
  - ecuație
    - Bessel, 282
    - caracteristică, 190, 228, 236
    - diferențială, 64, 246
    - diferențială de tip Euler, 228, 246
    - diferențială liniară, 228, 237
    - diferențială omogenă, 64
    - integrală, 59, 75, 77, 80, 81, 283
    - integrală Fourier, 58
    - omogenă, 249
  - ecuație caracteristică, 148
  - ecuații parametrice ale unei suprafete, 105
  - elementele Frenet, 102
  - elipsoid de rotație, 91
  - elipsă, 36, 102, 215, 248
  - endomorfism, 8, 131
    - jordanizabil, 192
  - extrem local, 21
  - familie
    - liniar dependentă, 3, 116
    - liniar independentă, 93, 117, 134
  - forma canonica Jordan, 123, 151, 192, 193
  - formula
    - Euler, 242, 248
    - lui Parseval, 73, 205, 220, 256, 267, 286
    - Taylor, 2, 3, 5, 12, 39, 89, 118, 187, 242
  - formulele
    - Euler, 62, 63, 280
    - Frenet, 102
  - formă
    - biliniară, 43, 142, 200
    - biliniară simetrică, 33
    - liniară, 30
    - pătratică, 26, 27, 30, 33, 95
      - pozitiv definită, 26, 27
  - fracții simple, 232, 259, 273
  - frontieră, 12, 15, 21, 59, 127, 137, 152, 202

- funcția
  - $B$ , 158, 173, 181
  - $\Gamma$ , 36, 158, 173, 181, 186, 190
  - original, 58, 218, 219
- funcție
  - armonică, 60, 62, 63, 68, 76, 77, 209, 211, 212, 221, 225, 229, 230, 235, 247, 252, 282, 284
  - complexă multiformă, 254
  - concavă, 37
  - continuă, 37, 43, 193
  - de clasă  $C^k$ , 10, 11, 29, 32, 44, 60, 79, 82, 204
  - diferențiabilă, 80, 193
  - impară, 120, 205, 264, 265, 273
  - olomorfă, 56–63, 65, 68, 69, 74–78, 80, 82, 209, 226, 276
  - pară, 232, 243, 260, 264, 266, 285
  - periodică, 7, 58, 110
- generatoare ale unui cilindru, 98
- hiperboloid cu o pânză, 34
- hiperbolă, 6, 203
- imagine, 1, 7, 11, 12, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 92, 131, 167, 176, 184, 188, 200
- imaginea unei aplicații liniare, 20
- imaginea unei funcții, 46
- independentă liniară, 38, 189
- inducție, 150, 168, 183
- inegalitatea
  - Cauchy-Schwartz, 116, 117
  - triunghiului, 116
- injectivitate, 106, 131, 160, 204
- integrală, 39
  - convergentă, 38, 154
  - cu parametru, 29, 39, 46, 190
  - definită, 223, 258
  - impropriă, 123, 153, 258
- integrare
  - prin părți, 118, 120, 123, 195
  - termen cu termen, 11
- interval
  - conex, 129
  - deschis, 204
- intervalul de convergență, 1, 11, 25, 40, 86, 94, 112, 113, 121, 133, 189, 194
- invariante, 164
- inversa transformării Fourier, 268
  - prin cosinus, 220, 274
  - prin sinus, 225
- închidere topologică, 32
- jordanizare, 123, 151, 192, 193
- lagrangian, 142, 159, 202
- lema lui Jordan, 221, 259, 268, 272
- limite laterale, 133
- limită, 40, 113, 119, 120, 150, 163, 196, 224, 254, 268, 272
- liniar
  - dependentă, 91
  - independentă, 45, 116, 234, 237
- liniaritate, 109, 115
- loc geometric, 36
- lungimea arcului de curbă, 3, 91
- matrice
  - antisimetrică, 16, 30, 184
  - autoadjunctă, 99
  - de schimbare a bazei, 12, 104, 151
  - diagonalizabilă, 6, 10, 21, 105, 123, 124
  - diagonalizatoare, 118, 123, 163
  - diagonală, 4, 7, 18, 97, 104
  - inversabilă, 7, 25, 36, 111, 150
  - jordanizatoare, 193
  - modală, 97, 104
  - nesingulară, 192
  - nilpotentă, 123
  - ortogonală, 4, 6, 108
  - simetrică, 29, 96, 109
- matricea
  - exponențială, 218
  - hessiană, 95, 104, 159
  - unei transformări liniare, 26, 27, 29, 31, 110, 168, 190
  - unui endomorfism, 4, 12, 192
- metoda
  - contracției, 89
  - Gauss, 172
  - valorilor proprii, 98, 160, 250

- variației constantelor, 240, 241, 249
- minorii Jacobi, 159, 161
- monotonie, 34, 142, 150
- multiplicitate, 123, 192
  - algebrică, 192, 196
  - geometrică, 109, 192, 196
- multime
  - închisă, 12, 15, 32, 44, 115, 141
  - de convergență, 1, 11, 25, 40, 86, 94, 112, 113, 121, 133, 189, 194
  - deshisă, 1, 32, 78, 204, 278
- multimea de convergență
  - a unei serii de funcții, 38
  - a unei serii de puteri, 10
- mărginire, 150, 183, 272
- natura unei serii, 34, 114, 150
  - numerice, 31
- normare, 97, 161
- normă, 33
- nucleu, 1, 3, 7, 8, 11, 12, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 87, 92, 109, 115, 131, 160, 167, 176, 184, 188
- nucleul unei aplicații liniare, 20
- omogenitate, 175, 179
- operator
  - autoadjunct, 4, 99
  - liniar, 4, 25, 200
- operatorul lui Laplace, 80
- ordinul unei celule Jordan, 151
- orientare pozitivă, 6, 108
- originalul transformației Laplace, 222
- ortogonalitate, 34, 97, 141, 175, 188, 195
- ortogonalizare, 31, 97, 161, 175
- paraboloid eliptic, 50
- paraboloid hiperbolic, 105, 200
- parabolă, 163
- parallelipiped, 46, 208
- parametrizarea
  - elipsei, 102
  - unei drepte, 91
  - unui drum, 91
  - unui segment, 137, 224
- parte
  - întreagă, 32, 110
  - fracționară, 7
- patrulater inscriptibil, 184
- perimetru unui triunghi, 10
- plan, 40, 91, 102, 109, 141, 191, 193
  - tangent, 2, 107, 143
- plane, 39
  - concurante, 191, 193
  - ortogonale, 191
- poli, 215, 217, 218, 221, 223, 225–227, 232, 233, 235, 239, 244, 248, 249, 256, 258, 259, 269, 272, 274, 276, 280, 283–285, 289
- polinoame relativ prime, 7, 111
- polinom
  - caracteristic, 4, 7, 88, 96–98, 101, 105, 111, 115, 151, 156, 161, 162, 192, 217, 279, 280
  - Taylor, 17, 18, 144
- polinom caracteristic, 148
- pozitiv
  - definire, 4, 26, 27, 100, 155, 161
  - semidefinire, 197
- pozitivitate, 175, 179
- prelungire prin continuitate, 271
- primitivă, 78, 278
- problema Cauchy, 61, 63–65, 68, 72, 74, 80, 211
- procedeul Gram-Schmidt, 31, 97, 161, 175
- produs
  - de conoluție, 287
  - mixt, 188
  - scalar, 1, 12, 18, 27, 29–31, 33, 39, 41, 97, 175, 179, 188
  - vectorial, 105, 187, 188
- programare liniară, 142
- progresie aritmetică, 42, 198
- proiecție, 40, 109, 110
  - ortogonală, 6
- punct
  - critic, 10, 11, 94–96, 104, 106, 114, 158, 165, 166
  - de discontinuitate, 110
  - de echilibru, 79, 280
  - de extrem, 6, 12, 28, 95, 96, 104, 159
  - de extrem condiționate, 26
  - de extrem global, 10, 11, 45, 198
  - de extrem local, 3, 10, 15, 19, 26, 42, 44–46, 159, 202, 204, 205

- de minim, 28
- singular, 217, 219, 223, 224, 235, 244, 247–249, 258, 272, 276, 280, 283
- singular esențial, 219, 222, 223, 226, 231, 238, 244, 263, 266, 274, 285
- staționar, 3, 19, 28, 96
- quasipolinom, 217, 228, 241
- ramura principală a logaritmului, 248
- rang, 42, 45, 88, 115, 134, 193, 196, 197, 200
- raza
  - cercului, 33, 180, 258
  - de convergență, 1, 9, 26, 35, 86, 94, 112, 118, 157, 194, 282
  - sferei, 36, 143, 180
- recurență, 9, 14, 41, 119, 120, 136, 150, 187, 196
- regula l'Hospital, 151
- relație de recurență, 9, 14, 119, 120, 136, 150, 187, 196
- relațiile
  - Cauchy-Riemann, 283
  - lui Viète, 101, 171
- reperul Frenet, 5, 102
- restul Lagrange, 118
- reziduuri, 59, 62, 63, 65, 69, 76, 214, 215, 235, 249, 270, 276, 283, 289
- rotație de reper, 98, 105, 164
- schimbare de variabilă, 186, 210, 239, 283
- serie
  - absolut convergentă, 129, 182
  - convergentă, 8, 24, 110, 150, 172, 182, 183
  - de puteri, 1, 6, 10, 11, 25, 40, 119
  - de puteri convergentă, 80
  - divergentă, 8, 34, 120, 182
  - Fourier, 57, 58, 73–76, 79, 81, 92, 219, 256, 258, 266, 272, 273, 279
  - Fourier complexă, 263
  - Fourier de sinusuri, 75
  - Fourier trigonometrică, 77, 80, 205, 214, 283
  - Laurent, 56, 57, 65, 77, 219, 235, 244, 252, 257, 263, 266, 273, 274
  - Maclaurin, 121
- numericală, 81, 120
- Taylor, 2, 3, 5, 12, 39, 89, 118, 187, 242
- uniform convergentă, 13, 110, 129, 133, 152, 165, 178, 184, 194
- sferă, 33, 36, 143, 180, 186
- signatură, 172
- simbolul lui Kronecker, 179
- simetrie, 175, 179
- sistem
  - caracteristic, 97, 99, 101, 234, 237
  - Cauchy-Riemann, 80, 284
  - de coordonate, 164
  - de ecuații diferențiale, 62, 68
  - diferențial, 58, 59, 64, 245, 277, 279
  - diferențial omogen, 229
  - liniar, 218, 228, 241
- sistem diferențial, 69
- spațiu vectorial, 20
- stabilitate, 56, 279
- subspații suplementare, 160
- subspațiu
  - ortogonal, 27
  - propriu, 8, 25, 38, 93, 99, 101, 118, 150, 176, 245
  - vectorial, 3, 19, 29, 30, 36, 115
- suma
  - a două subspații vectoriale, 169
  - seriei, 6, 7, 9, 19, 25, 26, 35, 120, 154
  - unei serii, 20
- sumă directă, 20, 131
- suprafață, 6, 43, 44, 105, 200
- surjectivitate, 131
- șir
  - Cauchy, 119
  - de funcții, 7, 37, 40, 110
  - definit recurrent, 9, 14, 41, 119, 120, 150
  - uniform convergent, 7, 34, 37, 164
- șirul
  - lui Rolle, 88
  - sumelor parțiale, 119
- tangentă, 36
- teorema
  - Cayley-Hamilton, 1, 88, 105, 186
  - dimensiunii, 125, 131, 135, 136

- funcțiilor implicate, 2, 17, 19, 20, 28, 89, 166
- fundamentală Cauchy, 210, 230, 232, 236, 243, 263, 276, 281
- Grassmann, 169
- lui Fermat, 124
- lui Pitagora, 180
- lui Ptolemeu, 184
- rangului, 200
- reziduurilor, 57, 58, 60–62, 64, 65, 72, 77, 210, 221, 226, 243, 245, 247, 248, 268, 280, 281
- semireziduurilor, 243
- tetraedru, 6, 107
- torsiune, 102
- transformare
  - conformă, 188
  - liniară, 4, 7, 11, 26, 27, 29, 31, 35–39, 92, 109, 188
- transformarea
  - Fourier, 227, 274, 275, 285
  - prin sinus, 225, 265
- Laplace, 56–60, 74, 75, 77–79, 81, 82, 210, 213, 218, 220, 222, 225, 227, 232–234, 240, 245, 249, 250, 253, 259, 262, 264, 269, 274, 275, 277, 279, 282, 283, 285, 287, 288
- Laplace inversă, 227, 233, 269, 274, 275
- transformata
  - Fourier, 60, 76, 77, 82, 271
  - prin cosinus, 72, 74, 76, 255, 271
  - prin sinus, 74–76, 225, 271
- Laplace, 75, 77, 211, 218, 222, 253, 287
- translație de reper, 91, 98, 105, 164
- triedrul Frenet, 5, 102
- unghi, 3, 31, 37, 38, 188
- urma unei matrice pătratice, 10, 32
- valori proprii, 1, 3, 4, 7–10, 12, 19, 21, 25–27, 30, 38, 40, 92, 96, 97, 99, 109, 111, 115, 118, 123, 148, 150, 156, 160, 161, 176, 189, 190, 208, 228, 234, 236, 245, 250
- vectori
  - liberi, 46, 132, 208
- principali, 123, 193
- proprii, 3, 4, 6, 8, 18, 25, 26, 38, 40, 92, 97, 99, 105, 107, 108, 111, 115, 123, 150, 162, 193, 208, 228, 234, 245, 277
- vesor, 102, 117, 141, 188
- viteza unui drum parametrizat, 91
- volumul
  - unui paralelipiped, 46, 208
  - unui tetraedru, 6, 107
- vârful unei parabole, 164